


Я. И. ПЕРЕЛЬМАН

Занимательная ФИЗИКА



Я.И. ПЕРЕЛЬМАН

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА

В двух книгах

**МОСКВА, 1994
АО "СТОЛЕТИЕ"**

Перельман Я.И.

П 27 Занимательная физика. В двух книгах. — М.;
АО “СТОЛЕТИЕ”, 1994. — 512 с.

Книга содержит парадоксы, задачи и опыты, замысловатые вопросы и рассказы из области физики, относящиеся к кругу повседневных явлений или взятые из общеизвестных произведений фантастики. Задача книги не только сообщить читателю новые знания, сколько помочь оживить уже имеющиеся.

Вторая книга “Занимательной физики” не является прямым продолжением первой — это самостоятельный сборник. Для оживления интереса к физическим расчётам в эту книгу введён вычислительный материал, и сборник в общем рассчитан на более подготовленного читателя, хотя обе книги можно читать в любой последовательности независимо одна от другой.

Книга предназначена для тех, кто изучает физику за партой, а также для всех, кто любит и изучает физику.

Книга печатается с 21 исправленного и дополненного издания
под редакцией А.В. Митрофанова (М.; Наука 1982 г.)

П $\frac{4809000000-03}{41A (03) — 94}$ Без обьема

ISBN 5-7459-0003-2 © Состав Оформление АО “СТОЛЕТИЕ”, 1994

ОГЛАВЛЕНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

Предисловие редактора	11
Предисловие автора к тринадцатому изданию	14
<i>ГЛАВА ПЕРВАЯ. СКОРОСТЬ. СЛОЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ</i>	16
Как быстро мы движемся? (16), В погоне за временем (17), Тысячная доля секунды (18), Лупа времени (21), Когда мы движемся вокруг Солнца быстрее — днем или ночью? (21), Загадка тележного колеса (23), Самая медленная часть колеса (25), Задача не шутка (25), Откуда плыла лодка? (26)	
<i>ГЛАВА ВТОРАЯ. ТЯЖЕСТЬ И ВЕС. РЫЧАГ. ДАВЛЕНИЕ</i>	29
Встаньте! (29), Ходьба и бег (31), Как надо прыгать из движу- щегося вагона? (34), Поймать боевую пулю руками (36), Арбуз-бомба (36), На платформе весов (39), Где вещи тяже- лее? (39), Сколько весит тело, когда оно падает? (41), Из пушки на Луну (43), Как Жюль Верн описал путешествие на Луну и как оно должно было бы происходить (45), Верно взвесить на неверных весах (47), Сильнее самого себя (48), Почему заостренные предметы колючи? (49), Наподобие Левифана (51)	
<i>ГЛАВА ТРЕТЬЯ. СОПРОТИВЛЕНИЕ СРЕДЫ</i>	53
Пуля и воздух (53), Сверхдальняя стрельба (54), Почему взле- тает бумажный змей? (56), Живые планеры (57), Безмотор- ный полет семян растений (58), Затяжной прыжок пара- шютиста (59), Бумеранг (60)	
<i>ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ВРАЩЕНИЕ. ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ</i>	63
Как отличить вареное яйцо от сырого? (63), “Колесо смеха” (64), Чернильные вихри (65), Обманутое растение (67), Веч- ные двигатели (68), “Зацепочка” (71), “Главная сила — в шарах” (72), Аккумулятор Уфимцева (73), “Чудо, которое не является чудом” (73), Еще “вечные двигатели” (75), “Вечный двигатель” времен Петра I (76)	

ГЛАВА ПЯТАЯ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ.....81

Задача о двух кофейниках (81), Чего не знали древние (81), Жидкости давят .. вверх! (82), Что тяжелее? (84), Естественная форма жидкости (85), Почему дробь круглая? (87), “Бездонный” бокал (88), Копейка, которая в воде не тонет (90), Вода в решете (91), Пена на службе техники (92), Мнимый вечный двигатель (93), Мыльные пузыри (95), Что тоньше всего? (99), Сухим из воды (100), Как мы пьем? (101), Улучшенная воронка (101), Тонна дерева и тонна железа (102), Человек, который ничего не весил (103), “Вечные часы” (106),

ГЛАВА ШЕСТАЯ ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ .. 109

Когда Октябрьская железная дорога длиннее — летом или зимой? (109), Безнаказанное хищение (110), Высота Эйфелевой башни (111), От чайного стакана к водомерной трубке (112), Легенда о сапоге в бане (114), Как устраивались чудеса (115), Часы без завода (116), Поучительная папироса (118), Лед, не тающий в кипятке (119), На лед или под лед? (120), Почему дует от закрытого окна? (121), Таинственная вертушка (121), Греет ли шуба? (122), Какое время года у нас под ногами? (123), Бумажная кастрюля (124), Почему лед скользкий? (126), Задача о ледяных сосульках (128)

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ЛУЧИ СВЕТА..... 130

Пойманные тени (130), Цыпленок в яйце (132), Карикатурные фотографии (133), Задача о солнечном восходе (135), По океану Вселенной (136)

ГЛАВА ВОСЬМАЯ ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕЛОМЛЕНИЕ СВЕТА 138

Видеть сквозь стены (138), Говорящая “отрубленная” голова (140), Впереди или сзади? (141), Можно ли видеть зеркало? (141), Животные у зеркала (142), Кого мы видим, глядя в зеркало? (143), Рисование перед зеркалом (144), Расчетливая поспешность (145), Задача о горящем стоге (146), Новое и старое о калейдоскопе (148), Дворцы иллюзий и миражей (150), Почему и как преломляется свет? (152), Когда длинный путь проходится быстрее, чем короткий? (154), Новые робинзоны (157), Как добыть огонь с помощью льда? (159), С помощью солнечных лучей (161), Старое и новое о миражах (162), Зеленый луч (166)

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ЗРЕНИЕ ОДНИМ И ДВУМЯ ГЛАЗАМИ	170
Когда не было фотографии (170), Чего многие не умеют? (171), Искусство рассматривать фотографии (172), На каком расстоянии надо держать фотографию? (173), Странное действие увеличительного стекла (174), Увеличение фотографий (175), Лучшее место в кинотеатре (176), Совет читателям иллюстрированных журналов (177), Рассматривание картин (178), Что такое стереоскоп? (179), Наш естественный стереоскоп (180), Одним и двумя глазами (184), Простой способ разоблачать подделки (184), Зрение великанов (186), Вселенная в стереоскопе (188), Зрение тремя глазами (189); Что такое блеск? (190), Зрение при быстром движении (192), Сквозь цветные очки (193), “Чудеса теней” (194), Неожиданные превращения окраски (195), Высота книги (196), Размеры башенных часов (197), Белое и черное (198), Какая буква чернее? (200), “Живые” портреты (201), “Воткнутые линии” и другие обманы зрения (202), Как видят близорукие (206)	
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ЗВУК И СЛУХ	208
Как разыскивать эхо? (208), Звук вместо мерной ленты (210), Звуковые зеркала (211), Звуки в театральном зале (213), Эхо со дна моря (214), Жужжание насекомых (216), Слуховые обманы (216), Где стрекочет кузнечик? (217)	
СТО ВОПРОСОВ К ПЕРВОЙ КНИГЕ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА»	219
ДОПОЛНЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА	224

КНИГА ВТОРАЯ

Предисловие автора к тринадцатому изданию.....	238
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ	240
Самый дешевый способ путешествовать (240), “Земля, остановись!” (242), Письмо с самолета (243), Бомбометание (245), Безостановочная железная дорога (246), “Предупреждение катастроф” (248), Движущиеся тротуары (248), Трудный закон (249), Отчего погиб Святогор-богатырь? (251), Можно ли двигаться без опоры? (252), Почему взлетает ракета? (252), Как движется каракатица? (255), К звездам на ракете ⁸ (256)	

ГЛАВА ВТОРАЯ. СИЛА. РАБОТА. ТРЕНИЕ	258
Задача о лебеде, раке и щуке (258), Вопреки Крылову (260), Легко ли сломать яичную скорлупу? (261), Под парусами против ветра (263), Мог ли Архимед поднять Землю? (265), Жюль-верновский силач и формула Эйлера (267), От чего зависит крепость узлов? (269), Если бы не было трения (270), Физическая причина катастрофы “Челюскина” (272), Самоуравновешивающаяся палка (274)	
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ	277
Почему не падает вращающийся волчок? (277), Искусство жонглеров (278), Новое решение колумбовой задачи (280), “Уничтоженная” тяжесть (281), Вы в роли Галилея (283), Мой спор с вами (285), Финал нашего спора (286), В “заколдованном” шаре (286), Жидкий телескоп (290), “Чертова петля” (291), Математика в цирке (292), Нехватка в весе (294),	
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ВСЕМИРНОЕ ТЯГОТЕНИЕ.....	296
Велика ли сила притяжения? (296), Стальной канат от Земли до Солнца (298), Можно ли укрыться от силы тяготения? (299), Как полетели на Луну герои Уэллса (300), Полчаса на Луне (301), Стрельба на Луне (302), В бездонном колодеце (304), Сказочная дорога (306), Как роют туннели? (308),	
ГЛАВА ПЯТАЯ. ПУТЕШЕСТВИЕ В ПУШЕЧНОМ СНАРЯДЕ	309
Ньютонова гора (309), Фантастическая пушка (311), Тяжелая шляпа (311), Как ослабить сотрясение? (313), Для друзей математики (314)	
ГЛАВА ШЕСТАЯ. СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ	316
Море, в котором нельзя утонуть (316), Как работает ледокол? (319), Где находятся затонувшие суда? (320), Как осуществились мечты Жюль Верна и Уэллса (322), Как был поднят “Садко”? (325), Водяной “вечный” двигатель (326), Кто придумал слова “газ” и “атмосфера”? (328), Как будто простая задача (329), Задача о бассейне (330), Удивительный сосуд (332), Поклажа из воздуха (333), Новые героновы фонтаны (336), Обманчивые сосуды (338), Сколько весит вода в опрокинутом стакане? (339), Отчего притягиваются корабли? (339), Принцип Бернулли и его следствия (342), Назначение рыбьего пузыря (345), Волны и вихри (347), Путешествие в	

недра Земли (351), Фантазия и математика (352). В глубокой шахте (355), Ввысь со стратостатами (356)

ГЛАВА СЕДЬМАЯ ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 359

Веер (359), Отчего при ветре холоднее? (359), Горячее дыхание пустыни (361), Греет ли вуаль? (361), Охлаждающие кувшины (362), “Ледник” без льда (363), Какую жару способны мы переносить? (363), Термометр или барометр? (365), Для чего служит ламповое стекло? (366), Почему пламя не гаснет само собой? (367), Недостоящая глава в романе Жюль Верна (367), Завтрак в невесомой кухне² (368), Почему вода гасит огонь? (371), Как тушат огонь с помощью огня? (372), Можно ли воду вскипятить кипятком? (374), Можно ли вскипятить воду снегом? (375), “Суп из барометра” (376) Всегда ли кипяток горяч? (378), Горячий лед (380), Холод из угля (380)

ГЛАВА ВОСЬМАЯ МАГНЕТИЗМ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 382

“Любящий камень” (382), Задача о компасе (383), Линии магнитных сил (384), Как намагничивается сталь? (385), Исполинские электромагниты (386), Магнитные фокусы (388), Магнит для тренировок спортсменов (389), Магнит в земледелии (389), Магнитная летательная машина (390), Наподобие “магометова гроба” (391), Электромагнитный транспорт (393), Сражение марсиан с жителями Земли (395), Часы и магнетизм (396), Магнитный “вечный” двигатель (397), Музейная задача (399), Еще воображаемый вечный двигатель (399), Почти вечный двигатель (400), Птицы на проводах (402), При свете молнии (403), Сколько стоит молния? (404) Грозовой ливень в комнате (405)

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕЛОМЛЕНИЕ СВЕТА.

ЗРЕНИЕ 407

Пятикратный снимок (407), Солнечные двигатели и нагреватели (408), Мечта о шапке-невидимке (410), Невидимый человек (411), Могущество невидимого (414), Прозрачные препараты (414), Может ли невидимый видеть? (416), Охранительная окраска (417), Защитный цвет (418), Человеческий глаз под водой (419), Как видят водолазы? (421), Стекланные чечевицы под водой (421), Неопытные ку- пальщики (422), Невидимая булавка (424), Мир из-под воды (426), Цвета в глубине вод (431), Слепое пятно нашего глаза

(432), Какой величины нам кажется Луна? (434), Видимые размеры светил (436), “Сфинкс” (439), Почему микроскоп увеличивает? (441), Зрительные самообманы (444), Иллюзия, полезная для портных (445), Что больше? (445), Сила воображения (446), Еще иллюзии зрения (447), Что это? (449), Необыкновенные колеса (450), “Микроскоп времени” в технике (453), Диск Нипкова (455), Почему заяц косой? (456), Почему в темноте все кошки серы? (457), Существуют ли лучи холода? (458)

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ЗВУК. ВОЛНООБРАЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ 460

Звук и радиоволны (460), Звук и пуля (460), Мнимый взрыв (461), Если бы скорость звука уменьшилась... (462), Самый медленный разговор (463), Скорейшим путем (464), Барабанный телеграф (465), Звуковые облака и воздушное эхо (466), Беззвучные звуки (467), Ультразвуки на службе техники (468), Голоса лилипутов и Гулливера (470), Для кого ежедневная газета выходит дважды в день? (470), Задача о паровозных свистках (471), Явление Доплера (473), История одного штрафа (474), Со скоростью звука (476), Курьезы слуха (477)

СТО ВОПРОСОВ КО ВТОРОЙ КНИГЕ

“ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА” 478

ДОПОЛНЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА 483

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ФИЗИКУ 502

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА

КНИГА

1

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

“Занимательная физика” Якова Исидоровича Перельмана — одна из самых старых и самых популярных книг по физике, которую читало и изучало с интересом не одно поколение молодых людей в нашей стране. Впервые эта книга появилась на прилавках книжных магазинов в 1913 г. и с тех пор пользовалась у читателей неизменным спросом. В течение многих лет автор работал над книгой, совершенствуя и дополняя текст; изменялось и художественное оформление книги. Последний раз при жизни автора “Занимательная физика” вышла в свет в 1936 г. тринадцатым изданием (Я. И. Перельман умер в блокадном Ленинграде в 1942 г.). Четырнадцатое и пятнадцатое издания (1947 и 1949 гг.) были выпущены под редакцией А. Б. Млодзеевского. В подготовке шестнадцатого издания (1959–1960 гг.) принял участие В. А. Угаров. В последующие годы книга переиздавалась без изменений.

Предлагаемое двадцать первое издание “Занимательной физики” подготовлено к столетнему юбилею Я.И. Перельмана.

Яков Исидорович Перельман родился в 1882 г. в Белостоке. Окончив (в 1909 г.) Петербургский лесной институт и получив диплом лесоведа, Я. И. Перельман занялся педагогической, научной и литературной деятельностью. Он стал автором ряда учебников и многочисленных научно-популярных книг и статей, был редактором журнала “Природа и люди”, “В мастерской природы”, сотрудничал в таких известных современному читателю журналах, как “Знание — сила”, “Техника молодежи”.

После “Занимательной физики” Я. И. Перельман написал целую серию увлекательных книг по физике, астрономии и математике, в которых в полной мере раскрылся его замечательный дар популяризатора науки. Его “Занимательная арифметика”, “Занимательная астрономия”,

“Живая математика”, “Математические рассказы и головоломки”, “Занимательная геометрия”, “Занимательная алгебра” сравнительно хорошо известны нашим молодым читателям. Другие книги Я.И. Перельмана (изданные только при жизни автора) ныне стали библиографической редкостью. Среди них: “Знаете ли вы физику?”, “Занимательная механика”, “Алгебра на клетчатой бумаге”, “Арифметические ребусы”, “Веселые задачи. 101 головоломка для юных математиков”, “Дважды два — пять! Математические софизмы”, “Квадратура круга”, “Ящик загадок и фокусов”.

Некоторые из книг Я.И. Перельман посвятил проблемам межпланетных путешествий (“Межпланетные путешествия”, “К звездам на ракете”, “Мировые дали” и др.). К.Э. Циолковский, большой ценитель таланта и творчества Я.И. Перельмана, так писал о нем в предисловии к книге “Межпланетные путешествия”: “Автор давно известен своими популярными, остроумными и вполне научными трудами по физике, астрономии и математике, написанными к тому же чудесным языком и легко воспринимаемыми читателями”. Эти слова в полной мере относятся и к “Занимательной физике” — “первенцу в многочисленной книжной семье ее автора” и в какой-то степени раскрывают секрет успеха книг Я.И. Перельмана у современников писателя.

Но не устарели ли безнадежно книги Перельмана сейчас, в том числе и “Занимательная физика”? Ведь жизнь не стоит на месте. Давно уже на скоростных железных дорогах лежит бесстыковое железнодорожное полотно (см. с. 103), давно уже домохозяйки пользуются в быту отлитыми из пластмассы воронками, изготовленными как будто бы по рецепту Перельмана (см. с. 96), и не всякий школьник, особенно городской, знает, как выглядит обыкновенная керосиновая лампа (см. рис. 82). В наши дни стали реальными полеты человека в космос. Наука и техника сделали стремительный шаг вперед. Многие факты из “Занимательной физики” и удачные когда-то технические решения, известные современникам Перельмана, теперь уже отнюдь не новинки, а скорее любопытные примеры из истории науки и техники.

И все же “Занимательная физика” Я.И. Перельмана не утратила своей привлекательности и познавательной ценности для молодого читателя, прежде всего для школьников средних и старших классов, точно так же, как не утратили своего значения работы ученых XVIII-XIX веков, классиков

естествознания, изучаемые в курсах физики студентами вузов. Я.И.Перельман так подобрал основное содержание “Занимательной физики”, что оно, иллюстрируя и углубляя основные сведения из физики, не устарело и сейчас. Поэтому при подготовке двадцать первого издания редакция не ставила своей целью коренную переработку текста. Более того, отчасти было решено вернуться к старым, прижизненным изданиям автора. Так, были “восстановлены” некоторые из статей Я. И. Перельмана, опущенные в предыдущих изданиях.

В новом издании дополнения и примечания редактора помещены в конце книги. Там же отмечены некоторые неточности и устаревшие утверждения, опубликованные до этого в прежних изданиях “Занимательной физики”. Отдельные исправления были выполнены по письмам читателей, которые до сих пор приносит редакционная почта, иногда на имя... Перельмана.

Несмотря на популярный характер изложения, в “Занимательной физике” Я. И. Перельмана рассматривается довольно много сложных физических явлений. Иллюстрацией некоторых из них служат сравнительно простые физические опыты. Советуем вам проделать их самостоятельно. Ведь, как сказал однажды Л. Д. Ландау, “верховным судьей всякой физической теории является опыт”. “Работа руками” сделает вашу встречу с “Занимательной физикой” еще более интересной и позволит вам ближе познакомиться с физикой — одной из самых красивых экспериментальных наук. И не будет, видимо, ошибкой сказать, что знакомство с физикой на уровне этой книги окажется полезным не только для будущих физиков, но и для любого молодого человека, в какой бы области народного хозяйства ему не пришлось в дальнейшем работать.

1982 г.

А. В. Митрофанов
редактор 21 издания
М. “Наука”, 1982 г.

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ АВТОРА К ТРИНАДЦАТОМУ ИЗДАНИЮ

В этой книге автор стремился не столько сообщить читателю новые знания, сколько помочь ему “узнать то, что он знает”, т.е. углубить и оживить уже имеющиеся у него основные сведения из физики, научить сознательно ими распоряжаться и побудить к разностороннему их применению. Достигается это рассмотрением пестрого ряда головоломок, замысловатых вопросов, занимательных рассказов, забавных задач, парадоксов и неожиданных сопоставлений из области физики, относящихся к кругу повседневных явлений или черпаемых из общеизвестных произведений научно-фантастической беллетристики. Материалом последнего рода составитель пользовался особенно широко, считая его наиболее соответствующим целям сборника: приведены отрывки из произведений Жюль Верна, Уэллса, Марка Твена и др.

Составитель старался, насколько мог, придавать изложению внешне интересную форму, сообщать привлекательность предмету. Он руководствовался той психологической аксиомой, что *интерес* к предмету повышает *внимание*, облегчает *понимание* и, следовательно, способствует более сознательному и прочному *усвоению*.

Вопреки обычаю, установившемуся для подобного рода сборников, в “Занимательной физике” весьма мало места отводится описанию забавных и эффектных физических *опытов*. Эта книга имеет иное назначение, нежели сборники, предлагающие материал для экспериментирования. Главная цель “Занимательной физики” — возбудить деятельность *научного воображения*, приучить читателя *мыслить* в духе физической науки и создать в его памяти многочисленные ассоциации физических знаний с самыми разнородными явлениями жизни, со всем тем, с чем он обычно входит в соприкосновение. Установка, которой составитель старался

придерживаться при работе над книгой, была дана В. И. Лениным в следующих словах: “Популярный писатель подводит читателя к глубокой мысли, к глубокому учению, исходя из самых простых и общеизвестных данных, указывая при помощи несложных рассуждений или удачно выбранных примеров главные *выводы* из этих данных, наталкивая думающего читателя на дальнейшие и дальнейшие вопросы. Популярный писатель не предполагает не думающего, не желающего или не умеющего думать читателя, — напротив, он предполагает в неразвитом читателе серьезное намерение работать головой и *помогает* ему делать эту серьезную и трудную работу, ведет его, помогая ему делать первые шаги и *уча* идти дальше самостоятельно”^{*}.

“Занимательной физике” посчастливилось проникнуть — как свидетельствуют письма читателей — в самые глухие уголки Союза. Значительное распространение книги, свидетельствующее о живом интересе широких кругов к физическим знаниям, налагает на автора серьезную ответственность за качество ее материала. Сознанием этой ответственности объясняются многочисленные изменения и дополнения в тексте “Занимательной физики” при повторных изданиях.

К автору поступали от иных читателей просьбы воздерживаться от переработки текста, чтобы не вынуждать их “из-за десятка новых страниц приобретать каждое повторное издание”. Едва ли подобные соображения могут освободить автора от обязанности всемерно улучшать свой труд. “Занимательная физика” не художественное произведение, а сочинение научное, хотя и популярное. Ее предмет — физика — даже в начальных своих основаниях непрестанно обогащается свежим материалом, и книга должна периодически включать его в свой текст.

С другой стороны, приходится нередко слышать упреки в том, что “Занимательная физика” не уделяет места таким темам, как новейшие успехи радиотехники, расщепление атомного ядра, современные физические теории и т. п. Упреки такого рода — плод недоразумения. “Занимательная физика” имеет вполне определенную целевую установку; рассмотрение же этих вопросов — задача иных сочинений.

1936 г.

Я. Перельман

^{*} . В. И. Ленин. Полн. собр. соч. — 5-е изд., т. 5, с. 358.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

СКОРОСТЬ. СЛОЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ

Как быстро мы движемся?

От природы человек наделен способностью развивать довольно скромную скорость передвижения: пешеход в среднем проходит в секунду около 1,5 м. Это немного быстрее, чем движение воды в большей части равнинных рек, но медленнее, чем движение воздуха при умеренном ветре (5 м в секунду). По сравнению с улиткой, переползающей всего 1,5 мм в секунду, человек является, конечно, скороходом: ведь он в 1000 раз проворнее ее! Но если он вступит в состязание с другими живыми существами, то останется позади: даже муха при спокойном полете движется втрое быстрее, чем пешеход¹.

Однако уже такое сравнительно простое механическое приспособление, как коньки, дает человеку преимущество над его “соперниками” из мира животных. Опытный конькобежец бежит со скоростью, превышающей 10 м в секунду, и лишь немногие животные могут его догнать. Всадник на скакуне развивает скорость в пределах 15–20 м в секунду и буквально перегоняет ветер, потому что при сильном ветре скорость движения воздуха редко превышает 20 м в секунду. Мы видим, следовательно, что выражение наших народных сказок и былин “конь быстрый, как буйный ветер” не является вовсе преувеличением. Хорошая гончая собака мчится даже быстрее ветра (25 м в секунду). Еще больше скорость полета некоторых птиц.

Машины, изобретенные человеком, делают его самым быстрым существом на Земле. Еще в 1896 г. на автомобильных гонках Париж — Брест была достигнута скорость 20 км в час, т.е. около 6 м в секунду. Это считалось тогда для автомобилей великим триумфом. Но уже через год скорость автомобилей удвоилась, а в 1909 г. на гонках Париж — Мадрид автомобили развили скорость, впятеро

большую; — 108 км в час, или 30 м в секунду ².

На автомобиле, скоростном поезде, а тем более на самолете человек может легко обогнать и лошадь, и собаку, и орла и успешно соперничать по скорости с ураганным ветром, при котором воздух движется быстрее 30 м в секунду. Чтобы яснее представить себе величину скорости ветра при урагане, заметим, что камень, брошенный изо всех сил, пролетит в первую секунду со скоростью, примерно в два раза меньшей, т.е. со скоростью около 15 м в секунду.

В погоне за временем

Можно ли в 8 часов утра вылететь из Владивостока и в 8 часов утра того же дня прилететь в Москву? Вопрос этот вовсе не лишен смысла. Да, можно. Чтобы понять этот ответ, нужно только вспомнить, что разница между поясным временем Владивостока и Москвы составляет семь часов. И если самолет сможет пройти расстояние между Владивостоком и Москвой за это время, то он прибудет в Москву в час своего вылета из Владивостока.

Расстояние Владивосток — Москва составляет примерно 9000 км. Значит, скорость самолета должна быть равна $9000 : 7 \approx 1300$ км в час. Это чуть больше скорости звука в воздухе (1200 км в час) ³.

Чтобы “перегнать Солнце” (или, точнее, Землю) в полярных широтах, нужна значительно меньшая скорость. На 75-й параллели (Новая Земля) самолет, обладающий скоростью около 450 км в час, пролетает столько же, сколько успевает за тот же промежуток времени пройти точка земной поверхности при вращении Земли вокруг оси. Для пилота или пассажира такого самолета Солнце остановится и будет неподвижно висеть на небе, не приближаясь к закату (при этом, конечно, самолет должен двигаться в подходящем направлении).

Еще легче “перегнать Луну” в ее собственном обращении вокруг Земли. Луна движется вокруг Земли в 29 раз медленнее, чем Земля вокруг своей оси (сравниваются, конечно, так называемые “угловые”, а не линейные скорости). Поэтому обыкновенный пароход, делающий 25—30 км в час, может уже в средних широтах “перегнать Луну”.

О таком явлении упоминает Марк Твен в своих очерках “Простакки за границей”:

“Во время переезда по Атлантическому океану от Нью-Йорка к Азорским островам стояла прекрасная летняя погода, а ночи были даже лучше дней. Мы наблюдали странное явление: Луну, появляющуюся каждый вечер в тот же час в той же точке неба. Причина этого оригинального поведения Луны сначала оставалась для нас загадочной, но потом мы сообразили, в чем дело: мы подвигались каждый час на 20 минут долготы к востоку, т. е. именно с такой скоростью, чтобы не отставать от Луны!”

Тысячная доля секунды

Для нас, привыкших мерить время на свою человеческую мерку, тысячная доля секунды равнозначна нулю. Такие промежутки времени лишь недавно стали встречаться в нашей практике. Когда время определяли по высоте Солнца




Рис.1. Определение времени дня по положению Солнца на небе (слева) и по длине тени (справа).

или длине тени, то не могло быть речи о точности даже до минуты (рис. 1); люди считали минуту слишком ничтожной величиной, чтобы стоило ее измерять. Древний человек жил такой неторопливой жизнью, что на его часах — солнечных, водяных, песочных — не было особых делений для минут (рис. 2 и 3). Только с начала XVIII века стала появляться на циферблате минутная стрелка. А с начала XIX века появилась и секундная стрелка.

Что же может совершиться в тысячную долю секунды? Очень многое! Поезд, правда, может переместиться за этот промежуток времени всего на 3 см, звук — уже на 33 см, земной шар пройдет в своем движении вокруг Солнца за такую долю секунды 30 м, а свет — 300 км.

Мелкие существа, окружающие нас, если бы они умели рассуждать, вероятно, не считали бы тысячную долю секунды за ничтожный промежуток времени. Для насекомых, например, величина эта вполне ощутима. Комар в течение одной секунды делает 500—600 полных взмахов крылышками⁴; значит, в тысячную долю секунды он успевает поднять их или опустить.




Рис. 2. Водяные часы, употреблявшиеся в древнем мире




Рис. 3. Старинные карманные часы.

Человек не способен перемещать свои члены так быстро, как насекомое. Самое быстрое наше движение — мигание глаз, “мгновение ока”, или “миг”, в первоначальном смысле этих слов. Оно совершается так быстро, что мы не замечаем даже временного затмения поля нашего зрения. Немногие, однако, знают, что это движение — синоним невообразимой быстроты — протекает, в сущности, довольно медленно, если измерять его тысячными долями секунды. Полное “мгновение ока” длится, как обнаружили точные измерения, в среднем $\frac{2}{5}$ секунды, т.е. 400 тысячных долей ее. Оно распадается на следующие фазы: опускание века (75—90 тысячных секунды), состояние неподвижности опущенного века (130—170 тысячных) и поднятие его (около

170 тысячных). Как видите, “один миг” в буквальном смысле этого слова — промежуток довольно значительный, в течение которого глазное веко успевает даже немного отдохнуть. И если бы мы могли раздельно воспринимать впечатления, длящиеся тысячную долю секунды, мы уловили бы “в один миг” два плавных движения глазного века, разделенных промежуток покоя.

При таком устройстве нашей нервной системы мы увидели бы окружающий нас мир преобразенным до неузнаваемости. Описание тех странных картин, какие представились бы тогда нашим глазам, дал английский писатель Уэллс в рассказе “Новейший ускоритель”. Герои рассказа выпили фантастическую микстуру, которая действует на нервную систему так, что делает органы чувств способными к раздельному восприятию быстрых явлений.

Вот несколько примеров из рассказа:

— “Видали ли вы до сих пор, чтобы занавеска прикреплялась к окну таким манером?”

Я посмотрел на занавеску и увидел, что она словно застыла и что угол у нее как загнулся от ветра, так и остался.

— Не видал никогда, — сказал я. — Что за странность!

— А это? — сказал он и растопырил пальцы, державшие стакан.

Я ожидал, что стакан разобьется, но он даже не шевельнулся; он повис в воздухе неподвижно.

— Вы, конечно, знаете, — сказал Гибберн, — что падающий предмет опускается в первую секунду на 5 м. И стакан пробегает теперь эти 5 м, — но, вы понимаете, не прошло еще и сотой доли секунды* Это может вам дать понятие о силе моего “ускорителя”.

Стакан медленно опускался. Гибберн провел рукой вокруг стакана, над ним и под ним...

Я глянул в окно. Какой-то велосипедист, застывший на одном месте, с застывшим облаком пыли позади, догонял какую-то бречку, которая также не двигалась ни на один дюйм.

...Наше внимание было привлечено омнибусом, совершенно окаменевшим. Верхушка колес, лошадиные ноги, конец кнута и нижняя челюсть кучера (он только что начал зевать) — все это, хотя и медленно, но двигалось; остальное же в этом неуклюжем экипаже совершенно застыло. Сидящие там люди были как статуи.

* Надо иметь в виду к тому же, что в первую сотую долю первой секунды своего падения тело проходит не сотую часть от 5 м, а 10 000-ю (по формуле $S = gt^2/2$), т. е. 0,5 мм, а в первую тысячную долю секунды — всего 0,005 мм. — Я. П.

...Какой-то человек застыл как раз в тот момент, когда он делал нечеловеческие усилия сложить на ветру газету. Но для нас этого ветра не существовало.

...Все, что было сказано, подумано, сделано мной с той поры, как “ускоритель” проник в мой организм, было лишь мгновением ока для всех прочих людей и для всей Вселенной”.

Вероятно, читателям интересно будет узнать, каков наименьший промежуток времени, измеримый техническими средствами. Еще в начале этого века он равнялся 10 000-й доле секунды; теперь же физик в своей лаборатории способен измерить 10 000 000 000-ю долю секунды⁵. Этот промежуток примерно во столько же раз меньше целой секунды, во сколько раз секунда меньше 300 лет!

Лупа времени

Когда Уэллс писал свой “Новейший ускоритель”, он едва ли думал, что нечто подобное когда-нибудь осуществится в действительности. Ему довелось, однако, дожить до этого: он мог собственными глазами увидеть — правда, только на экране — те картины, которые создало некогда его воображение. Так называемая “лупа времени” показывает нам на экране в замедленном темпе многие явления, протекающие обычно очень быстро.

“Лупа времени” — это кинематографический фотоаппарат, делающий в секунду не 24 снимка, как обычные киноаппараты, а во много раз больше. Если заснятое так явление проецировать на экран, пуская ленту с обычной скоростью 24 кадра в секунду, то зрители увидят явление растянутым — совершающимся в соответствующее число раз медленнее нормального. Читателю случалось, вероятно, видеть на экране такие неестественно плавные прыжки и другие замедленные явления. С помощью более сложных аппаратов того же рода достигается замедление еще более значительное, почти воспроизводящее то, что описано в рассказе Уэллса.

Когда мы движемся вокруг Солнца быстрее — днем или ночью?

В парижских газетах появилось однажды объявление, обещавшее каждому за 25 сантимов указать способ путешествовать дешево и притом без малейшего утомления.

Нашлись легковверные, которые прислали требуемые 25 сантимов. В ответ каждый из них получил по почте письмо следующего содержания:

“Оставайтесь, гражданин, спокойно в своей кровати и помните, что Земля наша вертится. На параллели Парижа — 49-й — вы пробегаете каждые сутки более 25 000 км. А если вы любите живописные виды, откиньте оконную занавеску и восхищайтесь картиной звездного неба”.

Привлеченный к суду за мошенничество, виновник этой затеи выслушал приговор, уплатил наложенный на него штраф и, говорят, став в театральную позу, торжественно повторил знаменитое восклицание Галилея:

— А все-таки она вертится!

В известном смысле шутник был прав, потому что каждый обитатель земного шара не только “путешествует”, вращаясь вокруг земной оси, но с еще большей скоростью переносится Землей при ее обращении вокруг Солнца. Ежесекундно планета наша со всеми своими обитателями перемещается в пространстве на 30 км, вращаясь одновременно и вокруг оси.




Рис. 4. На ночной половине земного шара люди движутся вокруг Солнца быстрее, чем на дневной.

По этому поводу можно задать интересный вопрос: когда мы движемся вокруг Солнца быстрее — днем или ночью?

Вопрос способен вызвать недоумение: ведь всегда на одной стороне Земли день, на другой — ночь; какой же смысл имеет наш вопрос? По-видимому, никакого.

Однако это не так. Спрашивается ведь не о том, когда вся Земля перемещается скорее, а о том, когда мы, ее обитатели, движемся скорее среди звезд. А это же вовсе не бессмысленный вопрос. В Солнечной системе мы совершаем два движения: вращаемся вокруг Солнца и в то же время обращаемся вокруг земной оси. Оба движения складываются, но результат получается различный, смотря по тому, находимся ли мы на дневной или ночной половине Земли. Взгляните на рис. 4, и вы поймете, что в полночь скорость вращения *прибавляется* к поступательной скорости Земли, а в полдень, наоборот, *отнимается* от нее. Значит, *в полночь мы движемся в Солнечной системе быстрее, нежели в полдень*.

Так как точки экватора пробегают в секунду около полукилометра, то для экваториальной полосы разница между полуденной и полуночной скоростями достигает целого километра в секунду. Знакомые с геометрией легко могут вычислить, что для Ленинграда (который находится на 60-й параллели) эта разница вдвое меньше: в полночь ленинградцы каждую секунду пробегают в Солнечной системе на полкилометра больше, нежели в полдень⁶.

Загадка тележного колеса

Прикрепите сбоку к ободу тележного колеса (или к шине велосипедного) белую или цветную бумажку и наблюдайте за ней во время движения телеги (или велосипеда). Вы заметите странное явление: пока бумажка находится в нижней части катящегося колеса, она видна довольно отчетливо; в верхней же части она мелькает так быстро, что вы не успеваете ее разглядеть.

Выходит как будто, что верхняя часть колеса движется быстрее, чем нижняя. То же наблюдение можно сделать, если сравнить между собой верхние и нижние спицы катящегося колеса какого-нибудь экипажа. Будет заметно, что верхние спицы сливаются в одно сплошное целое, нижние же видимы раздельно. Дело опять-таки происходит так, словно верхняя часть колеса движется быстрее, чем нижняя

В чем же разгадка этого странного явления? Да просто в том, что верхняя часть катящегося колеса *действительно движется быстрее, чем нижняя*. Факт представляется с первого взгляда невероятным, а между тем простое рассуждение




Рис. 5. Как убедиться, что верхняя часть колеса движется быстрее нижней. Сравните расстояния точек *A* и *B* откатившегося колеса (справа) от неподвижной палки.

убедит нас в этом. Ведь каждая точка катящегося колеса совершает сразу *два* движения: обращается вокруг оси и в то же время подвигается вперед вместе с этой осью. Происходит — как в случае земного шара — сложение двух движений, и результат для верхней и нижней частей колеса получается разный. Вверху вращательная скорость движения колеса *прибавляется* к поступательной, так как оба движения направлены в одну и ту же сторону. Внизу же вращательная скорость движения направлена в обратную сторону и, следовательно, *отнимается* от поступательной. Вот почему верхние части колеса перемещаются относительно неподвижного наблюдателя быстрее, чем нижние.

То, что это действительно так, легко понять на простом опыте, который можно проделать при удобном случае. Воткните в землю палку рядом с колесом стоящей телеги так, чтобы палка приходилась против оси (рис. 5). На ободе колеса, в самой верхней и в самой нижней его частях, сделайте пометки мелом или углем; пометки придутся, следовательно, как раз против палки. Теперь откатите телегу немного вправо, чтобы ось отошла от палки на 20—30 см, и заметьте, как переместились ваши пометки. Окажется, что верхняя пометка *A* переместилась заметно больше, нежели нижняя *B*, которая только едва отступила от палки.

Самая медленная часть колеса

Итак, не все точки движущегося колеса телеги перемещаются одинаково быстро. Какая же часть катящегося колеса движется всего медленнее?

Нетрудно сообразить, что *медленнее всех движутся те точки колеса, которые в данный момент соприкасаются с землей*. Строго говоря, в момент соприкосновения с почвой эти точки колеса совершенно неподвижны.

Все сказанное справедливо только для колеса *катящегося*, а не для такого, которое вращается на неподвижной оси. В маховом колесе, например, верхние и нижние точки обода движутся с одинаковой скоростью.

Задача не шутка

Вот еще одна не менее любопытная задача: в поезде, идущем, скажем, из Ленинграда в Москву, существуют ли точки, которые по отношению к полотну дороги движутся обратно — от Москвы к Ленинграду?

Оказывается, что в каждый момент на каждом колесе существуют такие точки. Где же они находятся?




Рис. 6. Когда колесо откатывается налево, точки *B, C, D* выступающей части спички отодвигаются в обратную сторону.




Рис. 7. Когда железнодорожное колесо катится налево, нижние точки его выступающего края движутся направо.

Вы знаете, конечно, что железнодорожные колеса имеют на ободе выступающий край (реборду). И вот оказывается, что нижние точки этого края⁷ при движении поезда перемещаются вовсе не вперед, а назад!




Рис. 8. Кривая линия (циклоида), которую описывает каждая точка обода катящегося колеса телеги (вверху) и каждая точка выступающего края железнодорожного колеса (внизу)

В этом легко удостовериться, проделав такой опыт. К небольшому кружку, например к монете или пуговице, прилепите воском спичку так, чтобы она прилегала к кружку по радиусу и далеко выступала за край. Если теперь упереть кружок (рис. 6) в край линейки в точке *A* и начать катить кружок справа налево, то точки *B*, *C* и *D* выступающей части отодвинутся не вперед, а назад. Чем дальше точка от края кружка, тем заметнее подастся она назад при качении кружка (точка *D* перейдет в *D'*).

Точки реборды железнодорожного колеса движутся так же, как и выступающая часть спички в нашем опыте (рис. 7 и 8).

Вас не должно удивлять теперь, что в поезде существуют точки, которые движутся *не вперед*, а *назад*. Правда, это движение длится лишь ничтожную долю секунды; но, как бы то ни было, обратное перемещение в движущемся поезде все же существует наперекор нашим обычным представлениям

Откуда плыла лодка?

Вообразите, что весельная лодка плывет по озеру, и пусть стрелка *a* на рис. 9 изображает скорость ее движения. Наперерез идет парусная лодка; стрелка *b* изображает ее скорость. Если вас, читатель, спросят, откуда эта лодка отчалила, вы, конечно, сразу укажете пункт *M* на берегу. Но

если с тем же вопросом обратиться к пассажирам весельной лодки, они указали бы совершенно другую точку. Почему?




Рис. 9. Парусная лодка идет наперерез весельной. Что увидят гребцы?

Происходит это оттого, что пассажиры видят лодку движущейся вовсе не под прямым углом к пути своей лодки. Они ведь не чувствуют собственного движения: им кажется, что сами они стоят на месте, а все кругом движется с их собственной скоростью, но в обратном направлении. Поэтому для них парусная лодка движется не только по направлению стрелки b , но и по направлению пунктирной стрелки a , обратно движению весельной лодки (рис. 10). Оба движения парусной лодки — действительное и кажущееся — складываются по правилу параллелограмма. В резуль-




Рис. 10. Гребцам кажется, что парусная лодка идет не наперерз им, а косо — от точки N , а не от точки M .

тате пассажирам шлюпки кажется, будто парусная лодка движется по диагонали параллелограмма, построенного на b и a . Вот почему пассажирам представляется, что парусная лодка отчалила от берега вовсе не в точке M , а в некоторой точке N , далеко впереди по движению весельной лодки (рис. 10).

Двигаясь вместе с Землей по ее орбите и встречая лучи звезд, мы судим о положении источников этих лучей так же неправильно, как пассажиры весельной лодки ошибочно определяют место отплытия парусной. Поэтому звезды представляются нам немного смещенными вперед по пути движения Земли. Конечно, скорость движения Земли ничтожна по сравнению со скоростью света (в 10 000 раз меньше); поэтому кажущееся смещение звезд незначительно. Но оно может быть обнаружено с помощью астрономических приборов. Явление это носит название аберрации света.

Если подобные вопросы заинтересовали вас, попробуйте, не изменяя условий нашей задачи о лодке, сказать: 1) по какому направлению движется весельная лодка для пассажиров парусной; 2) куда направляется весельная лодка, по мнению пассажиров парусной?

Чтобы ответить на эти вопросы, вам нужно на стрелке a (рис. 10) построить параллелограмм скоростей; диагональ его покажет, что пассажирам парусной лодки весельная кажется плывущей в косом направлении (наперерез парусной лодке с одновременным смещением в сторону берега, где расположены точки M и N).

ГЛАВА ВТОРАЯ

ТЯЖЕСТЬ И ВЕС. РЫЧАГ. ДАВЛЕНИЕ

Встаньте!

Если я скажу вам: “Сейчас вы сядете на стул так, что не сможете встать, хотя и не будете привязаны”, вы примете это, конечно, за шутку.

Хорошо. Сядьте же так, как сидит человек, изображенный на рис. 11, т.е. держа туловище отвесно и *не пододвигая ног под стул*. А теперь попробуйте встать, не меняя положения ног и не нагибая корпуса вперед.

Что, не удастся? Никаким усилием мускулов не удастся вам встать со стула, пока вы не пододвинете ног под сиденье или не подадитесь корпусом вперед.

Чтобы понять, почему это так, нам придется побеседовать немного о равновесии тел вообще и человеческого в частности. Стоящий предмет не опрокидывается только тогда, когда отвесная линия, проведенная из центра тяжести, проходит внутри основания предмета. Поэтому наклонный цилиндр, изображенный на рис. 12, должен непременно опрокинуться; но если бы он был настолько широк, что отвесная линия, проведенная из его центра тяжести, проходила бы в пределах его основания, цилиндр не опрокинулся бы. Так называемые “падающие башни” — в Пизе, в Болонье или хотя бы “падающая колокольня” в Архангельске (рис. 13) — не




Рис. 11. В таком положении невозможно подняться со стула.

падают, несмотря на свой наклон, потому, что отвесная линия из их центра тяжести не выходит за пределы основания. (Другая, второстепенная, причина, конечно, та, что они углублены в землю своими фундаментами.)

Стоящий человек не падает только до тех пор, пока отвесная линия из центра тяжести находится внутри площадки, ограниченной краями его




Рис. 12. Такой цилиндр должен опрокинуться, потому что отвесная линия, проведенная из центра тяжести, проходит вне основания.




Рис. 13. “Падающая колокольня” в Архангельске (со старинной фотографии).

ступней (рис. 14). Поэтому так трудно стоять на одной ноге; еще труднее стоять на канате: основание очень мало, и отвесная линия легко может выйти за его пределы. Замечали ли вы, какой странной походкой отличаются “морские волки”? Проводя всю жизнь на качающемся судне, где отвесная линия из центра тяжести их тела ежесекундно может выйти за пределы пространства, занятого ступнями, моряки вырабатывают привычку ступать так, чтобы основание их тела (т.е. широко расставленные ноги) захватывало возможно большую площадь. Это придает морякам необходимую устойчивость на колеблющейся палубе; естественно, что та же привычка сохраняется при ходьбе по земле.

Можно привести и обратный пример, когда необходимость поддерживать равновесие обуславливает красоту позы. Обращали вы внимание на то, какой стройный вид имеет человек, несущий на голове груз? Всем известны изящные изваяния женских фигур с кувшином на голове. Неся на голове груз, по необходимости приходится держать голову и туловище прямо: малейшее уклонение грозит вы-

вести отвесную линию из центра тяжести (приподнятого в случае тела с грузом выше обычного положения) из контура основания, и тогда равновесие фигуры будет нарушено. Теперь вернемся к опыту с вставанием сидящего человека. Центр тяжести туловища сидящего человека находится внутри тела, близ позвоночника, сантиметров на 20 выше уровня пупка. Проведите отвесную линию из этой точки вниз: она пройдет под стулом позади ступней. А чтобы человек мог стоять, линия эта должна проходить *между ступнями*.




Рис. 14. Когда человек стоит, отвесная линия, проведенная из центра тяжести, проходит внутри площадки, ограниченной ступнями.

Значит, вставая, мы должны либо податься грудью вперед, перемещая этим центр тяжести, либо же пододвинуть ноги назад, чтобы подвести опору под центр тяжести. Обычно мы так и делаем, когда встаем со стула. Но если нам не разрешают делать ни того, ни другого, то встать мудрено, в чем вы можете убедиться сами.

Ходьба и бег

То, что вы делаете тысячи раз в день в течение всей жизни, должно быть вам прекрасно известно. Так принято думать, но это далеко не всегда верно. Лучший пример — ходьба и бег. Есть ли что-нибудь более нам знакомое, чем эти движения? А много ли найдется людей, которые ясно представляют себе, как, собственно, передвигаем мы свое тело при ходьбе и беге и в чем разнятся эти два рода движений? Послушаем же, что говорят о ходьбе и беге физиологи*. Для большинства, я уверен, это описание будет совершенно ново.

“Предположим, что человек стоит на одной ноге, например на правой. Вообразим себе, что он приподнимает пятку, наклоняя в то же время туловище вперед**. При таком положении перпендикуляр из

* Текст отрывка заимствован из «Лекций по зоологии» Поля Бера.

** При этом идущий человек, отталкиваясь от опоры, действует на нее с добавочной к весу силой давления — около 20 кгс. Отсюда, между прочим, следует, что идущий человек сильнее давит на землю, чем стоящий. — Я. П.

центра тяжести, понятно, выйдет из площади основания опоры, и человек должен упасть вперед. Но едва начинается это падение, как левая нога его, оставшаяся в воздухе, быстро подвигается вперед и становится на землю впереди перпендикуляра из центра тяжести, так что перпендикуляр попадает в площадь, образуемую линиями, которыми соединяются точки опоры обеих ног. Равновесие таким образом восстанавливается; человек ступил, сделал шаг.

Он может и остановиться в этом довольно утомительном положении. Но если хочет идти дальше, то наклоняет свое тело еще более вперед, переносит перпендикуляр из центра тяжести за пределы площади опоры и в момент угрозы падения снова выдвигает вперед ногу, но уже не левую, а правую — новый шаг, и т.д. Ходьба поэтому есть не что иное, как *ряд падений вперед*, предупреждаемых вовремя поставленной опорой ноги, оставшейся до того позади.




Рис. 15. Как человек ходит. Последовательные положения тела при ходьбе.




Рис. 16. Графическое изображение движения ног при ходьбе. Линия *A* относится к одной ноге, *B* — к другой. Прямые участки отвечают моментам опоры о землю; дуги — моментам движения ног без опоры. Из графика видно, что в течение промежутка времени *a* обе ноги опираются о землю; в течение *b* — нога *A* в воздухе, *B* продолжает опираться; в течение *c* — вновь обе ноги опираются о землю. Чем быстрее ходьба, тем короче становятся промежутки *a*, *c* (ср. с рис. 18).

Рассмотрим дело несколько ближе. Предположим, что первый шаг сделан (рис. 15 и 16). В этот момент правая нога еще касается земли, а левая уже ступает на землю. Если шаг не очень короток, правая пятка должна была приподняться, так как именно это-то приподнимание пятки позволяет телу наклониться вперед и нарушить равновесие. Левая нога ступает на землю прежде всего пяткой. Когда вслед за тем вся подошва ее становится на землю, правая нога поднимается в воздух. В то же время левая нога, несколько согнутая в колене,

выпрямляется сокращением трехглавой бедренной мышцы и становится на мгновение вертикальной. Это позволяет полусогнутой правой ноге продвинуться вперед, не касаясь земли, и, следуя за движением тела поставить на землю свою пятку как раз вовремя для следующего шага.

Подобный же ряд движений начинается затем для левой ноги, которая в это время опирается о землю только пальцами и вскоре должна подняться в воздух.

Бег отличается от ходьбы тем (рис. 17 и 18), что нога, стоящая на земле, внезапным сокращением ее мышц энергично вытягивается и отбрасывает тело вперед, так что последнее *на одно мгновение совсем отделяется от земли*. Затем оно снова падает на землю на другую ногу, которая, пока тело было в воздухе, быстро передвинулась вперед. Таким образом, бег состоит из *ряда скачков с одной ноги на другую*".




Рис. 17. Как человек бежит. Последовательные положения тела при беге.




Рис. 18. Графическое изображение движения ног в беге. Из графика видно, что для бегущего человека существуют моменты (*d, e*), когда обе ноги не касаются земли. Этим и отличается бег от ходьбы (ср. с рис. 16).

Что касается энергии, затрачиваемой человеком при ходьбе по горизонтальной дороге, то она не равна нулю, как иные думают; центр тяжести тела пешехода при каждом шаге поднимается на несколько сантиметров. Можно

рассчитать, что работа при ходьбе по горизонтальному пути составляет около одной пятнадцатой доли работы поднятия тела пешехода на высоту, равную пройденному пути*.

Как надо прыгать из движущегося вагона?

Задав кому-нибудь этот вопрос, вы, конечно, получите ответ: “Вперед, по движению, согласно закону инерции”. Попросите, однако, объяснить подробнее, причем тут закон инерции. Можно предсказать, что при этом произойдет: ваш собеседник начнет уверенно доказывать свою мысль; но если не перебивать его, он скоро сам остановится в недоумении: выйдет, что именно вследствие инерции надо прыгать как раз наоборот — назад, против движения!

И в самом деле, закон инерции играет здесь роль второстепенную, — главная причина совсем другая. И если эту главную причину забыть, то мы действительно придем к выводу, что надо прыгать назад, а никак не вперед.

Пусть вам необходимо выпрыгнуть на ходу. Что произойдет при этом?

Когда мы прыгаем из движущегося вагона, то тело наше, отделившись от вагона, обладает скоростью вагона (оно движется по инерции) и стремится двигаться вперед. Делая прыжок вперед, мы, конечно, не только не уничтожаем эту скорость, но, наоборот, еще увеличиваем ее.

Отсюда следует, что надо было бы прыгать *назад*, а вовсе не вперед, по направлению движения вагона. Ведь при прыжке назад скорость, сообщаемая прыжком, *отнимается* от скорости, с которой наше тело движется по инерции; вследствие этого, коснувшись земли, тело наше с меньшей силой будет стремиться опрокинуться.

Однако если уж и приходится прыгать из движущегося вагона, то все прыгают вперед, по движению¹. Это действительно лучший способ и настолько проверенный, что мы настойчиво предостерегаем читателей от попыток проверить неудобство прыгания назад из движущегося вагона.

Так в чем же дело?

* Расчет можно найти в брошюре Горячкин В. П. Работа живых двигателей, 1914.

В неверности объяснения, в его недоговоренности. Будем ли прыгать вперед, будем ли прыгать назад, — в том и другом случае нам грозит опасность упасть, так как верхняя часть туловища будет еще двигаться, когда ноги, коснувшись земли, остановятся*. Скорость этого движения при прыжке вперед даже больше, чем при прыжке назад. Но существенно важно то, что вперед падать гораздо *безопаснее*, чем падать назад. В первом случае мы привычным движением выставляем ногу вперед (а при большой скорости вагона — пробегаем несколько шагов) и тем предупреждаем падение. Это движение *привычно*, так как мы всю жизнь совершаем его при ходьбе: ведь с точки зрения механики, как мы узнали из предыдущей статьи, ходьба есть не что иное, как как *ряд падений нашего тела вперед, предупреждаемых выставлением ноги*. При падении же назад нет этого спасительного движения ног, и оттого здесь опасность гораздо большая. Наконец, важно и то, что когда мы даже в самом деле упадем вперед, то, выставив руки, расшибемся не так, как при падении на спину.

Итак, причина того, что безопаснее прыгать из вагона вперед, кроется не столько в законе инерции, сколько в нас самих. Ясно, что для предметов *неживых* правило это неприменимо: бутылка, брошенная из вагона вперед, скорее может разбиться при падении, нежели брошенная в обратном направлении. Поэтому, если вам придется почему-либо прыгать из вагона, выбросив предварительно свой багаж, следует кидать багаж *назад*, самим же прыгать *вперед*.

Люди опытные часто поступают так: прыгают *назад*, *обратившись спиной по направлению прыжка*. Этим достигается двоякая выгода: уменьшается скорость, приобретенная нашим телом по инерции, и, кроме того, предупреждается опасность падения на спину, так как прыгающий обращен передней стороной тела по направлению возможного падения.

* Можно объяснить падение в этом случае и с иной точки зрения (см. статью «Когда горизонтальная линия не горизонтальна?» в моей «Занимательной механике»).

Поймать боевую пулю руками

Во время первой мировой войны, как сообщали газеты, с французским летчиком произошел совершенно необыкновенный случай. Летая на высоте двух километров, летчик заметил, что близ его лица движется какой-то мелкий предмет. Думая, что это насекомое, летчик проворно схватил его рукой. Представьте изумление летчика, когда оказалось, что он поймал... немецкую боевую пулю!

Не правда ли, это напоминает рассказы легендарного барона Мюнхгаузена, будто бы ловившего пушечные ядра руками?

А между тем в сообщении о летчике, поймавшем пулю, нет ничего невозможного.

Пуля ведь не все время движется со своей нормальной скоростью 800–900 м в секунду. Из-за сопротивления воздуха она постепенно замедляет свой полет и к концу пути — на излете — делает всего несколько десятков метров в секунду. А такую скорость развивает и самолет. Значит, легко может случиться, что пуля и самолет будут иметь одинаковую скорость: по отношению к летчику пуля будет неподвижна или будет двигаться едва заметно. Ничего не будет стоить тогда схватить ее рукой, — особенно в перчатке, потому что пуля, движущаяся в воздухе, сильно разогревается.

Арбуз-бомба

Если при известных условиях пуля может стать безвредной, то возможен и обратный случай: “мирное тело”, брошенное с незначительной скоростью, произведет разрушительное действие. Во время автомобильного пробега Ленинград — Тифлис (в 1924 г.) крестьяне кавказских селений приветствовали проносящиеся мимо них автомобили, кидая пассажирам арбузы, дыни, яблоки. Действие этих невинных подарков оказывалось вовсе не приятным: арбузы и дыни вдавливали, сминали и ломали кузов машины, а яблоки, попав в пассажира, причиняли серьезные увечья (рис. 19). Причина понятна: собственная скорость автомобиля складывалась со скоростью брошенного арбуза или яблока и превращала их в опасные, разрушительные снаряды. Нетрудно рассчитать, что пуля массой 10 г обладает такой же энергией движения, как арбуз в 4 кг,

брошенный в автомобиль, который мчится со скоростью 120 км в час². Пробивное действие арбуза при таких условиях не может, однако, сравниться с действием пули, так как арбуз не обладает ее твердостью.




Рис. 19. Арбуз, брошенный навстречу быстро мчащемуся автомобилю, превращается в “бомбу”.

Когда разовьется скоростная авиация в верхних слоях атмосферы (в стратосфере) и самолеты будут иметь скорость около 3000 км в час, т.е. скорость пуль, летчикам придется иметь дело с явлениями, напоминающими рассмотренное сейчас. А именно, каждый предмет, попадающий на пути такого самолета, превратится для него в разрушительный снаряд³. Наткнуться на горсть пуль, просто уроненных с другого самолета, даже не летящего навстречу, будет все равно что подвергнуться обстрелу из пулемета: падающие пули ударятся о самолет с такой же силой, с какой вонзились бы в эту машину пули из пулемета. Так как относительные скорости в обоих случаях одинаковы (самолет и пуля сближаются со скоростью около 800 м в секунду), то разрушительные последствия столкновений будут одинаковы.


Наоборот, если пуля летит вслед самолету, несущемуся с равной скоростью, то для летчика она, как мы уже знаем, безвредна.

Тем, что тела, движущиеся с почти одинаковой скоростью в одном направлении, приходят в соприкосновение без удара, искусно воспользовался в 1935 г. машинист Борщов, приняв движущийся состав из 36 вагонов на свой поезд без удара в тем предотвратив железнодорожную катастрофу. Произошло это на Южной дороге, на перегоне Ельники — Ольшанка, при следующих обстоятельствах. Впереди поезда, который вел Борщев, шел другой. За недостатком паров

передний поезд остановился; его машинист с паровозом и несколькими вагонами отправился вперед, на станцию, оставив остальные 36 вагонов на пути. Вагоны, под которые не было подложено башмаков, покатались под уклон назад со скоростью 15 км в час, гроза налететь на поезд Борщева. Заметив опасность, находчивый машинист остановил свой поезд и повел его назад, постепенно развив скорость также 15 км в час. Благодаря такому маневру ему удалось весь 36-вагонный состав принять на свой поезд без малейшего повреждения.

Наконец, на том же принципе основан прибор, с помощью которого удобно писать в движущемся поезде. Писать в вагоне на ходу поезда трудно потому, что толчки на стыках рельсов передаются бумаге и кончику карандаша не одновременно. Если устроить так, чтобы бумага и карандаш получали сотрясение в одно и то же время, они друг относительно друга будут в покое и письмо на ходу поезда не составит никакого затруднения.

Рис. 20.
Приспособление,
позволяющее удобно
писать в движущемся
поезде.



Это и достигается благодаря прибору, изображенному на рис. 20. Рука с карандашом пристегивается к дощечке *a*, могущей передвигаться в пазах по планке *b*; последняя в свою очередь может перемещаться в пазах дощечки, лежащей на столике в вагоне. Рука, как видим, достаточно подвижна, чтобы писать букву за буквой, строку за строкой; вместе с тем каждый толчок, получаемый бумагой на дощечке, в тот же самый момент и с такой же силой передается руке, держащей карандаш. При таких условиях письмо на ходу поезда становится столь же удобным, как и в неподвижном вагоне; мешает лишь то, что взгляд скользит по

бумаге рывками, так как голова и рука получают толчки не одновременно.

На платформе весов

Весы только в том случае верно показывают вес вашего тела, когда вы стоите на их платформе совершенно неподвижно. Вы нагибаетесь — и весы в момент сгибания показывают уменьшенный вес, потому что мускулы, пригибающие верхнюю часть туловища, подтягивают в то же время нижнюю часть тела вверх, уменьшая тем самым давление на опору. Напротив, в тот момент, когда вы прекращаете нагибание туловища усилием мышц, расталкивающих обе части тела врозь, весы показывают заметно увеличенный вес из-за возросшего давления нижней части тела на платформу.

Даже поднятие руки должно вызвать колебание чувствительных весов, соответствующее небольшому увеличению веса вашего тела. Мускулы, поднимающие руку вверх, опираются на плечо и, следовательно, отталкивают его вместе с туловищем вниз: давление на платформу возрастает. Остановив подняемую руку, мы приводим в действие мышцы, которые подтягивают плечо вверх, стремясь сблизить его с концом руки, — и вес тела, его давление на опору, уменьшается.

Наоборот, опуская руку вниз, мы во время этого движения вызываем уменьшение веса своего тела, а в момент остановки руки — увеличение веса. Словом, действием внутренних сил мы можем увеличивать или уменьшать вес нашего тела, разумея под весом давление на опору⁴.

Где вещи тяжелее?

Сила, с которой тела притягиваются земным шаром, убывает по мере возвышения над земной поверхностью. Если бы мы подняли 1000-граммовую гирю на высоту 6400 км, т.е. удалили бы ее от центра земного шара на два его радиуса, то сила притяжения ослабела бы в 2^2 , т.е. в 4 раза, и гиря на пружинных весах вытянула бы всего 250 гс вместо 1000 гс. Согласно закону тяготения земной шар притягивает внешние тела так, как если бы вся его масса сосредоточена

была в центре, а сила этого притяжения убывает обратно квадрату расстояния. В нашем случае расстояние гири от центра Земли удвоилось, и оттого притяжение ослабело вчетверо. Удалив гирю на 12 800 км от земной поверхности, т.е. на тройное расстояние от центра Земли, мы ослабили бы притяжение в 3^2 , т.е. в 9 раз; 1000-граммовая гиря весила бы тогда всего 111 гс и т.д.

Естественно рождается мысль, что, углубляясь с гирей в недра Земли, т.е. приближая тело к центру нашей планеты, мы должны наблюдать усиление притяжения: гиря в глубине Земли должна весить больше. Эта догадка неверна: с углублением в Землю тела не увеличиваются в весе, а, напротив, уменьшаются. Объясняется это тем, что в таком случае притягивающие частицы Земли расположены уже не по одну сторону тела, а по разные его стороны. Взгляните на рис. 21. Вы видите, что гиря, помещенная в глубине Земли, притягивается вниз частицами, расположенными ниже гири, но в то же время притягивается вверх теми частицами, которые лежат выше нее. Можно доказать, что в конечном итоге имеет значение притягивающее действие только шара, радиус которого равен расстоянию от центра Земли до




Рис. 21. Почему с углублением в Землю сила тяжести ослабевает.

местонахождения тела. Поэтому вес тела по мере углубления в Землю должен быстро уменьшаться. Достигнув центра Земли, тело совсем утратит вес, сделается невесомым, так как окружающие частицы притягивают его там со всех сторон с одинаковой силой.

Итак, всего больше тело весит на самой поверхности Земли; с удалением от нее ввысь или вглубь вес тела уменьшается*.

Сколько весит тело, когда оно падает?

Замечали ли вы, какое странное ощущение испытываете вы в тот момент, когда начинаете опускаться в лифте? Ненормальная легкость, вроде той, какую испытывает человек, летящий в пропасть... Это — не что иное, как *ощущение невесомости*: в первый момент движения, когда пол под вашими ногами уже опускается, а вы сами не успели еще приобрести той же скорости, тело ваше почти не давит на пол и, следовательно, весьма мало *весит*. Проходит мгновение, и странное отпущение прекращается; ваше тело, стремясь падать быстрее, чем равномерно движущийся лифт, давит на его пол и, значит, снова приобретает свой полный вес.

Подвесьте гирию к крючку пружинных весов и следите, куда двинется указатель, если весы с гирей быстро опустить вниз. Вы убедитесь, что во время падения указатель показывает не полный вес гири, а гораздо меньший! Если бы весы падали свободно и вы имели возможность во время падения следить за их указателем, вы заметили бы, что гиря при падении вовсе ничего не весит: указатель находится у нуля.

Самое тяжелое тело становится совершенно невесомым в течение всего того времени, пока оно падает. Легко понять, почему это так. “Весом” тела мы называем силу, с которой тело тянет точку подвеса или давит на свою опору. Но *падающее* тело не производит никакого натяжения пружины весов, так как пружина опускается вместе с ним. Пока тело

* Так происходило бы, если бы земной шар был вполне однородным по плотности; в действительности плотность Земли возрастает с приближением к центру; поэтому сила тяжести при углублении в Землю сначала, на некотором расстоянии, растет и лишь затем начинает ослабевать.

падает, оно ничего не натягивает и ни на что не давит. Следовательно, спрашивать о том, сколько весит тело, когда оно падает, — все равно что спрашивать: сколько тело весит, когда оно не весит?

Еще основатель механики Галилей в XVII веке писал*:

“Мы ощущаем груз на наших плечах, когда стараемся мешать его падению. Но если станем двигаться вниз с такой же скоростью, как и груз, лежащий на нашей спине, то как же может он давить и обременять нас? Это подобно тому, как если бы мы захотели поразить копьем (не выпуская его из рук. — *Я. П.*) кого-либо, кто бежит впереди нас с такой же скоростью, с какой движемся и мы”.

Следующий легко исполнимый опыт наглядно подтверждает правильность этих рассуждений.

На одну чашку весов положите щипцы для раскалывания орехов так, чтобы одно колено их покоилось на чашке; другое же колено привяжите за конец ниткой к крючку коромысла (рис. 22). На другую чашку поместите столько груза, чтобы весы были в равновесии. Поднесите к нитке зажженную спичку; нитка перегорит, и верхнее колено щипцов упадет на чашку.




Рис. 22. Опыт, иллюстрирующий невесомость падающего тела.

Что же произойдет в этот момент с весами? Опустится ли чашка с щипцами в то время, пока колено еще падает, поднимется она или останется в равновесии?

Теперь, когда вы знаете уже, что падающее тело не имеет веса, вы можете заранее дать правильный ответ на этот вопрос: чашка должна подниматься на мгновение *вверх*.

В самом деле: верхнее колено щипцов,

* В “Математических доказательствах, касающихся двух отраслей новой науки”. В 1934 г. вышел полный русский перевод этого замечательного сочинения.

падая, хотя и остается в соединении с нижним, все же давит на него меньше, чем в неподвижном состоянии. Вес щипцов на мгновение уменьшается, и чашка, естественно, поднимается вверх.

Из пушки на Луну

В 1865 г. во Франции появился фантастический роман Жюль Верна “Из пушки на Луну”, в котором высказана необычайная мысль: послать на Луну исполинский пушечный снаряд-вагон с живыми людьми! Жюль Верн представил свой проект в столь правдоподобном виде, что у большинства читателей, наверное, возникал вопрос: нельзя ли в самом деле осуществить эту мысль? Об этом интересно побеседовать⁵.

Сначала рассмотрим, можно ли — хотя бы теоретически — выстрелить из пушки так, чтобы снаряд никогда не упал назад, на Землю. Теория допускает такую возможность. В самом деле, почему снаряд, горизонтально выброшенный пушкой, в конце концов падает на Землю? Потому что Земля, притягивая снаряд, искривляет его путь: он летит не по прямой линии, а по кривой, направленной к Земле, и поэтому рано или поздно встречается с поверхностью. Земная поверхность, правда, тоже искривлена, но путь снаряда изгибается гораздо круче. Если же кривизну пути снаряда ослабить и сделать ее одинаковой с искривлением поверхности земного шара, то такой снаряд никогда не сможет упасть на Землю! Он будет двигаться по кривой, концентрической с окружностью земного шара; другими словами, сделается его спутником, как бы второй Луной.

Но как добиться, чтобы снаряд, выброшенный пушкой, шел по пути, менее искривленному, чем земная поверхность? Для этого необходимо только сообщить ему достаточную скорость. Обратите




Рис. 23.
Вычисление скорости снаряда, который должен навсегда покинуть Землю.

внимание на рис. 23, изображающий разрез части земного шара. На горе, высотой которой будем пренебрегать, в точке A стоит пушка. Снаряд, горизонтально выброшенный ею, был бы через секунду в точке B , если бы не существовало притяжения Земли. Но притяжение меняет дело, и под действием этой силы снаряд через секунду окажется не в точке B , а на 5 м ниже, в точке C . Пять метров — это путь, проходимый (в вакууме) каждым свободно падающим телом в первую секунду под действием силы тяжести близ поверхности Земли. Если, опустившись на эти 5 м, снаряд наш окажется над уровнем Земли ровно настолько же, насколько был он в точке A , то, значит, он движется по кривой, concentрической с окружностью земного шара.

Остается вычислить отрезок AB (рис. 23), т.е. тот путь, который проходит снаряд в секунду по горизонтальному направлению; мы узнаем тогда, с какой скоростью нужно для нашей цели выбросить снаряд из жерла пушки. Вычислить это нетрудно из треугольника AOB , в котором OA — радиус земного шара (около 6 370 000 м), $OC = OA$, $BC = 5$ м; следовательно, $OB = 6\,370\,005$ м. Отсюда по теореме Пифагора имеем

$$(AB)^2 = (6\,370\,005)^2 - (6\,370\,000)^2.$$

Сделав вычисление, находим, что путь AB равен примерно 8 км.




Рис. 24. Траектория пушечного снаряда, выпущенного горизонтально с начальной скоростью 8 км/с и более.

Итак, если бы не было воздуха, который сильно мешает быстрому движению, снаряд, выброшенный горизонтально из пушки со скоростью 8 км/с, *никогда не упал бы на Землю*,

а вечно кружился бы вокруг нее, подобно спутнику.

А если выбросить снаряд из пушки с еще большей скоростью, — куда полетит он? В небесной механике доказывается, что при скоростях 8, 9, даже 10 км/с снаряд, вылетев из жерла пушки, должен описывать вокруг земного шара эллипс, тем более вытянутый, чем больше начальная скорость. При скорости же снаряда 11,2 км/с он вместо эллипса опишет уже незамкнутую кривую — ветвь параболы, навсегда удаляясь от Земли (рис. 24).

Мы видим, следовательно, что *теоретически* мыслимо полететь на Луну внутри снаряда, выброшенного с достаточно большой скоростью*.

(Предыдущие рассуждения верны в отсутствие атмосферы, препятствующей движению снаряда. В реальных условиях наличие атмосферы чрезвычайно затруднило бы получение таких высоких скоростей, а быть может, сделало бы их совершенно недостижимыми⁶.)

Как Жюль Верн описал путешествие на Луну и как оно должно было бы происходить

Кто читал упомянутый роман Жюль Верна, тому памятен интересный момент путешествия, когда снаряд пролетел через точку, где притяжения Земли и Луны одинаковы. Здесь произошло нечто поистине сказочное: все предметы внутри снаряда утратили свой вес, а сами путешественники, подпрыгнув, повисли в воздухе без опоры.

Описание это совершенно верно, но романист упустил из виду, что то же самое должно было наблюдаться также и до и после перелета через точку равного притяжения. Легко показать, что путешественники и все предметы внутри снаряда должны стать невесомыми *с первого же момента свободного полета*. Это кажется невероятным, но, я уверен, вы сейчас будете удивляться тому, что сами не заметили ранее столь крупного упущения.

Возьмем пример из романа Жюль Верна. Без сомнения, вы не забыли, как пассажиры выбросили наружу труп собаки и как они с изумлением заметили, что он вовсе не

* Тут могут представиться, однако, затруднения совсем особого рода. Подробнее вопрос этот рассматривается во второй книге “Занимательная физика”, а также в другой моей книге — “Межпланетные путешествия”.

падает на Землю, а продолжает нестись вперед вместе со снарядом. Романист правильно описал это явление и дал ему верное объяснение. Действительно, в вакууме, как известно, все тела (при одинаковой начальной скорости) падают с одинаковой скоростью: притяжение Земли сообщает всем телам одинаковое ускорение. В данном случае и снаряд, и труп собаки должны были под действием земного притяжения приобрести одинаковую скорость падения; вернее, та скорость, которая сообщена была им при вылете из пушки, должна была под действием силы тяжести уменьшаться одинаково. Следовательно, скорости снаряда и трупа во всех точках пути должны оставаться равными, поэтому труп собаки, выброшенный из снаряда, продолжал следовать за ним, нисколько не отставая.

Но вот о чем не подумал романист: если труп собаки не падает к Земле, находясь *вне* снаряда, то почему будет он падать, находясь *внутри* него? Ведь и там и тут действуют одинаковые силы! Тело собаки, помещенное без опоры внутри снаряда, должно оставаться висящим в пространстве: оно имеет совершенно ту же скорость, что и снаряд, и, значит, *по отношению к нему* остается в покое.

Что верно для трупа собаки, то верно и для тел пассажиров и вообще для всех предметов внутри снаряда: в каждой точке пути они имеют такую же скорость, как и сам снаряд, и, следовательно, не должны падать, даже если остаются без опоры. Стул, стоящий на полу летящего снаряда, можно поместить вверх ножками у потолка, и он не упадет “вниз”, потому что будет продолжать нестись вперед вместе с потолком. Пассажир может усесться вниз головой на этот стул и оставаться на нем, не испытывая ни малейшего стремления падать на пол снаряда. Какая сила может заставить его упасть? Ведь если бы он упал, т.е. приблизился к полу, то это значило бы, собственно говоря, что снаряд мчится в пространстве с большей скоростью, чем пассажир (иначе стул не приблизился бы к полу). А между тем это невозможно: мы знаем, что все предметы внутри снаряда имеют то же ускорение, что и сам снаряд.

Этого романист не заметил: он думал, что предметы внутри свободно несущегося снаряда, находящегося под действием одних лишь сил притяжения, будут продолжать давить на свои опоры, как давили тогда, когда снаряд был неподвижен. Жюль Верн упустил из виду, что если и тело, и опора движутся в пространстве с одинаковым ускорением, сообщаемым действием сил притяжения (другие внешние

силы — сила тяги, сила сопротивления воздуха — отсутствуют), то давить друг на друга они не могут.

Итак, с того момента путешествия, когда на снаряд перестали действовать газы, пассажиры не имели никакого веса и могли свободно витать в воздухе внутри снаряда; точно так же и все предметы в нем должны были казаться совершенно невесомыми. По этому признаку пассажиры легко могли определить, мчатся ли они в пространстве или продолжают неподвижно оставаться в пушке. Между тем романист рассказывает, как в первые полчаса своего небесного путешествия пассажиры тщетно ломали голову над вопросом: летят ли они или нет?

— “Николь, движемся ли мы?”

Николь и Ардан переглянулись: они не чувствовали колебаний снаряда.

— Действительно! Движемся ли мы? — повторил Ардан.

— Или спокойно лежим на почве Флориды? — спросил Николь.

— Или на дне Мексиканского залива? — прибавил Мишель”.

Такие сомнения возможны у пассажиров парохода, но немыслимы у пассажиров свободно несущегося снаряда: первые сохраняют свой вес, вторые же не могут не заметить, что сделались совершенно невесомыми.

Странное явление должен был бы представлять собой этот фантастический вагон-снаряд! Крошечный мир, где тела лишены веса, где, выпущенные из рук, они спокойно остаются на месте, где вода сама не выливается из опрокинутой бутылки... Все это упустил из виду автор “Путешествия на Луну”, а между тем какой простор могли бы дать фантазии романиста эти изумительные возможности!⁷

Верно взвесить на неверных весах

Что важнее для правильного взвешивания: весы или гири?

Вы ошибаетесь, если думаете, что одинаково важно и то, и другое: можно правильно взвесить и не имея верных весов, когда под рукой есть верные гири. Существует несколько способов верно взвешивать на неверных весах. Рассмотрим два из них.

Первый способ предложен нашим великим химиком Д.И. Менделеевым. Взвешивание начинают с того, что на одну из чашек кладут какой-нибудь груз, — безразлично какой, лишь бы он был тяжелее тела, подлежащего

взвешиванию. Груз этот уравнивают гирями на другой чашке. После этого на чашку с гирями кладут взвешиваемое тело и снимают с нее столько гирь, сколько требуется, чтобы восстановить нарушенное равновесие. Вес снятых гирь, очевидно, равен весу тела; оно заменяет их теперь на одной и той же чашке и, значит, имеет одинаковый с ними вес.

Способ Менделеева, который иногда называют “способом постоянной нагрузки”, особенно удобен, когда приходится взвешивать одно за другим несколько тел: первоначальная нагрузка остается, и ею пользуются для всех взвешиваний.

Другой прием, названный по имени предложившего его ученого “способом Борда”, выполняется так. Поместите тело, подлежащее взвешиванию, на одну чашку весов, а на другую насыпайте песок или дробь до тех пор, пока весы не придут в равновесие. Затем, сняв с чашки взвешиваемое тело (песок не трогайте), кладите на нее гири до тех пор, пока весы снова не уравниваются. Ясно, что теперь вес гирь равен весу замененного ими тела. Отсюда другое название способа — “взвешивание заменой”.

Для пружинных весов, имеющих только одну чашку, также применим этот простой прием, если у вас, кроме того, есть верные гири. Здесь нет надобности запастись песком или дробью. Положите взвешиваемое тело на чашку и заметьте, у какого деления остановился указатель. Затем, сняв тело, поставьте на чашку столько гирь, сколько нужно, чтобы указатель остановился у прежнего деления. Вес этих гирь, очевидно, должен равняться весу замененного ими тела.

Сильнее самого себя

Какого веса груз вы можете поднять рукой? Положим, что 10 кгс. Вы думаете, что эти 10 кгс определяют силу мышц вашей руки? Ошибаетесь: мышцы гораздо сильнее! Проследите за действием, например, так называемой двуглавой мышцы вашей руки (рис. 25)*. Она прикреплена близ точки опоры рычага, каким является кость предплечья, а груз действует на другой конец этого живого рычага. Расстояние

* Рисунок взят из старинного сочинения Борелли, флорентийского ученого XVII века, “О движении животных”, где законы механики впервые прилагаются к физиологии.

BO от груза до точки опоры, т.е. до сустава, почти в 8 раз больше, чем расстояние IO от конца мышцы до опоры. Значит, если вес груза составляет 10 кгс, то мускул тянет с силой, в 8 раз большей. Развивая силу в 8 раз большую, чем ваша рука, мускул может непосредственно поднять груз весом не 10 кгс, а 80 кгс.

Мы вправе без преувеличения сказать, что каждый человек гораздо сильнее самого себя, т.е. что наши мускулы развивают силу, значительно большую той, которая проявляется в наших действиях.

Целесообразно ли такое устройство?

На первый взгляд как будто нет, — мы видим здесь потерю силы, ничем не вознаграждаемую. Однако вспомним старинное «золотое правило» механики: что теряется в силе, выигрывается в перемещении. Тут и происходит выигрыш в скорости: наши руки движутся в 8 раз быстрее, чем управляющие ими мышцы. Тот способ прикрепления мускулов, который мы видим у животных, обеспечивает конечностям проворство движений, более важное в борьбе за существование, нежели сила. Мы были бы крайне медлительными существами, если бы наши руки и ноги не были устроены по этому принципу.




Рис. 25. Предплечье C человека — рычаг второго рода.

Действующая сила приложена к точке I ; опора рычага находится в точке O сочленения; преодолеваемое же сопротивление (груз R) приложено в точке B .

Почему заостренные предметы колючи?

Задумывались ли вы над вопросом: отчего игла так легко пронизывает предмет насквозь? Отчего сукно или картон легко проткнуть тонкой иглой и трудно пробить тупым гвоздем? В обоих случаях действует, казалось бы, одинаковая сила.

Сила одинаковая, но *давление* все же не одинаково. В первом случае вся сила сосредоточивается на острие иглы; во втором — та же сила распределяется на большую площадь конца гвоздя; следовательно, давление иглы гораздо

больше, нежели давление тупого стержня при одном и том же усилии наших рук.

Каждый скажет, что борона с 20 зубьями глубже разрыхлит землю, чем борона того же веса, но с 60 зубьями. Почему? Потому что *нагрузка на каждый зуб* в первом случае больше, чем во втором.

Когда речь идет о давлении, всегда необходимо, кроме силы, принимать во внимание также и площадь, на которую эта сила действует. Когда нам говорят, что кто-либо получает 1000 рублей зарплаты, то мы не знаем еще, много это или мало: нужно знать — в год или в месяц? Точно так же и действие силы зависит от того, распределяется ли она на квадратный сантиметр или сосредоточивается на сотой доле квадратного миллиметра.

Человек на лыжах ходит по рыхлому снегу, а без лыж проваливается. Почему? Потому что в первом случае сила давления его тела распределяется на гораздо большую поверхность, чем во втором. Если поверхность лыж, например, в 20 раз больше поверхности наших подошв, то на лыжах мы давим на снег в 20 раз слабее, чем стоя на снегу прямо ногами. Рыхлый снег выдерживает первое давление, но не выдерживает второго.

По той же причине лошадям, работающим на болоте, подвязывают особые “башмаки” к копытам, чтобы увеличить площадь опоры ног и тем уменьшить давление на болотистую почву: ноги лошадей при этом не увязают в болоте. Так же поступают и люди в некоторых болотистых местностях.

По тонкому льду люди передвигаются ползком, чтобы распределить вес своего тела на большую площадь.

Наконец, характерная особенность танков и гусеничных тракторов не увязать в рыхлом грунте, несмотря на свой значительный вес, объясняется опять-таки распределением веса на большую поверхность опоры. Гусеничная машина весом 8 тс и более оказывает на 1 кв. см грунта давление не более 600 гс. С этой точки зрения интересен вездеход на гусеничном ходу для перевозки грузов на болотах. Такая машина, везущая груз весом 2 тс, оказывает на грунт давление всего 160 гс на 1 кв. см; благодаря этому она хорошо ходит на торфяном болоте и по топким или песчаным местностям. В этом случае большая площадь опоры так же выгодна технически, как малая площадь в случае иглы.

Из сказанного ясно, что острое прокалывает лишь благодаря незначительности площади, по которой распределяет-

ся действие силы. Совершенно по той же причине острый нож лучше режет, нежели тупой: сила сосредоточивается на меньшей площади.

Итак, заостренные предметы оттого хорошо колют и режут, что на их остриях и лезвиях сосредоточивается большое давление.

Наподобие Левиафана

Почему на простом табурете сидеть жестко, в то время как на стуле, тоже деревянном, несколько не жестко? Почему мягко лежать в веревочном гамаке, который сплетен из довольно твердых шнурков? Почему не жестко лежать на проволочной сетке, устраиваемой в кроватях взамен пружинных матрасов?

Нетрудно догадаться. Сиденье простого табурета плоско; наше тело соприкасается с ним лишь по небольшой поверхности, на которой и сосредоточивается вес туловища. У стула же сиденье вогнутое, оно соприкасается с телом по большей поверхности, по этой поверхности и распределяется вес туловища: на единицу поверхности приходится меньший груз, меньшее давление.

Итак, все дело здесь в более равномерном распределении давления. Когда мы нежимся на мягкой постели, в ней образуются углубления, соответствующие неровностям нашего тела. Сила давления распределяется здесь по нижней поверхности тела довольно равномерно, так что на каждый квадратный сантиметр приходится малое давление. Неудивительно, что в этих условиях мы чувствуем себя хорошо.

Легко выразить это различие и в числах. Поверхность тела взрослого человека составляет около 2 кв. м, или 20 000 кв. см. Допустим, что, когда мы лежим в постели, с ней соприкасается, опираясь на нее, приблизительно 1/4 всей поверхности нашего тела, т.е. 0,5 кв. м, или 5000 кв. см. Вес же нашего тела — около 60 кгс, или 60 000 гс. Значит, на каждый квадратный сантиметр приходится давление всего 12 гс. Когда же мы лежим на голых досках, то соприкасаемся с опорной плоскостью лишь в немногих маленьких участках, общей площадью в какую-нибудь сотню квадратных сантиметров. На каждый квадратный сантиметр приходится, следовательно, давление 500 гс, а не 12 гс. Разница заметная, и мы сразу ощущаем ее на своем теле, говоря, что нам “очень жестко”.

Но даже на самом твердом ложе нам может быть вовсе не жестко, если давление распределяется равномерно на большую поверхность. Вообразите, что вы легли на мягкую глину и в ней отпечатались формы вашего тела. Покинув глину, оставьте ее сохнуть (высыхая, глина “садится” на 5–10%, но предположим, что этого не происходит). Когда она делается твердой как камень, сохранив оставленные вашим телом вдавленности, лягте на нее опять, заполнив собой эту каменную форму. Вы почувствуете себя, как на нежном пуховике, хотя лежите буквально на камне. Вы уподобитесь легендарному Левиафану, о котором читаем в стихотворении Ломоносова:

На острых камнях возлегает
И твердость оных презирает
Для крепости великих сил,
Считая их за мягкий ил.

Но причина нашей нечувствительности к жесткости ложа будет не “крепость великих сил”, а распределение веса тела на весьма большую опорную поверхность.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СОПРОТИВЛЕНИЕ СРЕДЫ

Пуля и воздух

Что воздух мешает свободному полету пули, знают все, но лишь немногие представляют себе ясно, насколько велико это тормозящее действие воздуха. Большинство людей склонно думать, что такая нежная среда, как воздух, которого мы обычно даже и не чувствуем, не может сколько-нибудь заметно мешать стремительному полету ружейной пули.




Рис. 26. Большая дуга изображает путь, какой описала бы пуля, если бы не существовало атмосферы. Маленькая дуга — действительный путь пули в воздухе.

Но взгляните на рис. 26, и вы поймете, что воздух является для пули препятствием чрезвычайно серьезным. Большая дуга на этом чертеже изображает путь, который пролетела бы пуля, если бы не существовало атмосферы. Покинув ствол ружья (под углом 47° , с начальной скоростью 620 м/с), пуля описала бы огромную дугу в 10 км высотой; дальность полета пули составила бы почти 40 км. В действительности же пуля при указанных условиях описывает сравнительно небольшую дугу и дальность ее полета составляет 4 км. На том же чертеже эта дуга почти незаметна рядом с первой; таков результат противодействия воздуха! Не будь воздуха, из винтовки можно было бы обстреливать неприятеля с расстояния 40 км, взметая свинцовый дождь на высоту 10 км!

Сверхдальняя стрельба

Обстреливать противника с расстояния в сотню и более километров впервые начала немецкая артиллерия к концу первой мировой войны (1918 г.), когда успехи французской и английской авиации положили конец воздушным налетам немцев. Немецкий штаб избрал другой, артиллерийский, способ поражать столицу Франции, удаленную от фронта не менее чем на 110 км.




Рис. 27. Как изменяется дальность полета снаряда с изменением угла наклона сверхдальнобойного орудия: при угле 1 снаряд падает в P_1 , при угле 2 — в P_2 , при угле же 3 дальность стрельбы сразу возрастает во много раз, так как снаряд залетает в слои разреженной атмосферы.

Способ этот был совершенно новый, никем еще не испытанный. Наткнулись на него немецкие артиллеристы случайно. При стрельбе из крупнокалиберной пушки под большим углом возвышения неожиданно обнаружилось, что вместо дальности 20 км достигается дальность 40 км. Оказалось, что снаряд, посланный круто вверх с большой начальной скоростью, достигает тех высоких разреженных слоев атмосферы, где сопротивление воздуха весьма незначительно; в такой слабо сопротивляющейся среде снаряд пролетает значительную часть своего пути и затем круто опускается на землю. Рис. 27 наглядно показывает, как велико различие в путях снарядов при изменении угла возвышения.

Это наблюдение и положено было немцами в основу проекта сверхдальнобойной пушки для обстрела Парижа с расстояния более 100 км. В обстановке особой секретности было изготовлено несколько пушек 203-го калибра, которые выпустили по Парижу с марта по июль 1918 г. свыше 300 снарядов¹.

Вот что стало известно об одной из таких пушек (рис. 28) впоследствии.

Это была огромная стальная труба в 34 м длиной и в 1 м толщиной; толщина стенок в казенной части 40 см. Масса орудия составляла 750 т. Его 120-килограммовые снаряды имели 1 м в длину и 21 см в толщину. Для заряда употреблялось 150 кг пороха; развигалось давление 5000 атм, которое и выбрасывало снаряд с начальной скоростью 2000 м/с. Стрельба велась под углом возвышения 52° ; снаряд описывал огромную дугу, высшая точка которой лежала на




Рис. 28. Немецкая пушка “Колоссаль”.

уровне 40 км над землей, т. е. далеко в стратосфере. Свой путь от позиции до Парижа — 115 км снаряд проделывал за 3,5 мин, из которых 2 мин он летел в стратосфере.

Такова была одна из первых сверхдальнобойных пушек, прародительница современной сверхдальнобойной артиллерии.

Чем больше начальная скорость пули (или снаряда), тем сопротивление воздуха значительнее: оно возрастает не пропорционально скорости, а быстрее, пропорционально второй и более высокой степени скорости, в зависимости от величины этой скорости.

Почему взлетает бумажный змей?

Пытались ли вы объяснить себе, почему бумажный змей взлетает *вверх*, когда его тянут за шнур *вперед*?

Если вы сможете ответить на этот вопрос, вы поймете также, почему летит самолет, почему носятся по воздуху семена клена, и даже отчасти уясните себе причины странных движений бумеранга. Все это — явления одного порядка. Тот самый воздух, который составляет столь серьезное препятствие для полета пуль и снарядов, обуславливает полет не только легкого плода клена или бумажного змея, но и тяжелого самолета с десятками пассажиров.




Рис. 29. Какие силы действуют на бумажный змей.

Чтобы объяснить поднятие бумажного змея, придется прибегнуть к упрощенному чертежу. Пусть MN на рис. 29 изображает разрез змея. Когда, запуская змея, мы тянем его за шнур, он движется из-за тяжести хвоста в наклонном положении. Пусть это движение совершается справа налево. Обозначим угол наклона плоскости змея к горизонту через α . Рассмотрим, какие силы действуют на змея при этом движении. Это прежде всего сила тяжести змея (с хвостом) OG и сила натяжения шнура OF . Воздух, конечно, должен мешать движению змея, оказывать на него некоторое давление. Эта сила давления изображена на рис. 29 в виде

стрелки OC ; так как воздух давит всегда перпендикулярно к плоскости, то линия OC начерчена под прямым углом к MN ². Силу OC можно разложить на две, построив так называемый параллелограмм сил; получим вместо силы OC две силы, OD и OP . Сила OD толкает наш змей назад и, следовательно, уменьшает первоначальную его скорость. Сила же OP увлекает змей вверх; она уменьшает его вес и, если достаточно велика, может преодолеть силу тяжести змея и поднять его. Вот почему змей поднимается вверх, когда мы тянем его за шнур вперед.

Самолет — тот же змей, только движущая сила нашей руки заменена в нем движущей силой пропеллера или реактивного двигателя, которая сообщает аппарату движение вперед и, следовательно, подобно змею, заставляет его подниматься вверх. Здесь дана лишь грубая схема явления; есть другие обстоятельства, обуславливающие подъем самолета; о них будет речь в другом месте*.

Живые планеры

Вы видите, что самолеты устроены вовсе не наподобие птицы, как обыкновенно думают, а скорее наподобие белок-летяг, шерстокрылов или летучих рыб. Впрочем, названные животные пользуются своими летательными перепонками не для того, чтобы подниматься вверх, а лишь для того, чтобы совершать большие прыжки — “планирующие спуски”, как выразился бы летчик. У них сила OP (рис. 29) недостаточна для того, чтобы вполне уравновесить силу тяжести их



Рис. 30. Белки-летяги делают с высоты прыжки на расстояние в 20—30 м.

* См. статью “Волны и вихри” во второй книге “Занимательная физика”.

тела; она лишь уменьшает ее и тем помогает совершать огромные прыжки (рис. 30). Белки-летяги перепрыгивают расстояния в 20—30 м с верхушки одного дерева к нижним ветвям другого. В Индо-Малайской области водится гораздо более крупный вид летучей белки — тагуан — величиной с нашу кошку; когда он разворачивает свой “планер”, его ширина достигает полуметра. Такие крупные размеры летательной перепонки позволяют животному совершать, несмотря на сравнительно большой вес, перелеты метров в 50³. А шерстокрыл, который водится на Зондских и Филиппинских островах, делает прыжки длиной даже до 70 м.

Безмоторный полет семян растений

Растения также нередко прибегают к услугам планеров — именно для распространения своих плодов и семян. Многие плоды и семена снабжены либо пучками волосков (тополиный пух, хохолки одуванчика, козлобородника, хлопчатника), которые действуют наподобие парашюта, либо же поддерживающими плоскостями в форме отростков, выступов и т. п. Такие растительные планеры можно наблюдать у хвойных, кленов, вязов, березы, граба, липы, многих зонтичных и т.д.

В известной книге Кернера фон Марилауна “Жизнь растений” читаем об этом следующее:




Рис. 31. Плод козлобородника.

“При безветрии в солнечные дни множество плодов и семян поднимается вертикальным воздушным течением на значительную высоту, но после захода солнца обыкновенно снова опускается неподалеку. Такие полеты важны не столько для распространения растений виришь, сколько для поселения на карнизах и в трещинах крутых склонов и отвесных скал, куда семена не могли бы попасть иным путем. Горизонтально же текущие воздушные массы способны переносить реюющие в воздухе плоды и семена на весьма большие расстояния.

У некоторых растений крылья и парашюты остаются в соединении с семенами только на время полета.

Семянки татарника спокойно плывут по воздуху, но, как только встретят препятствие, семя отделяется от парашюта и падает на землю. Этим объясняется столь частое произрастание татарника вдоль стен и заборов. В других случаях семя остается все время соединенным с парашютом".

На рис. 31 и 32 изображены некоторые плоды и семена, снабженные планерами.




Рис. 32. Легучие семена растений:
а) клена, б) сосны, в) карагача, г) березы.

Растительные планеры во многих отношениях даже совершеннее изобретенных человеком. Они поднимают сравнительно со своей собственной массой гораздо больший груз. Кроме того, этот растительный планер отличается автоматической устойчивостью: если семечко индийского жасмина перевернуть, оно само повернется обратно выпуклой стороной вниз; если при полете семя встречает преграду, оно не теряет равновесия, не падает, а плавно опускается вниз.

Затяжной прыжок парашютиста

Здесь приходят на память героические прыжки наших мастеров парашютного спорта, выбрасывавшихся с огромной высоты (из стратосферы), не раскрывая парашюта⁴. Лишь пролетев значительную часть пути, они дергали за кольцо парашюта и последние сотни метров опускались, паря на своих зонтах.

Многие думают, что, падая "камнем", не раскрывая парашюта, человек летит вниз, как в пустом пространстве. Если

бы было так, если бы человеческое тело падало в воздухе, как в вакууме, затыжной прыжок длился бы гораздо меньше, чем в действительности, а развиваемая к концу скорость была бы огромна.

Однако сопротивление воздуха препятствует нарастанию скорости. Скорость тела парашютиста во время затыжного прыжка растет только в течение первого десятка секунд, на протяжении первых сотен метров. Сопротивление воздуха возрастает с увеличением скорости так значительно, что довольно скоро наступает момент, когда скорость больше не изменяется⁵. Движение из ускоренного становится равномерным.

Можно путем вычислений набросать в общих чертах картину затыжного прыжка с точки зрения механики. *Ускоренное* падение парашютиста длится только в первый период (порядка 10 секунд). За этот период парашютист успевает опуститься метров на 400—500 и приобрести скорость около 50 м в секунду. Весь остальной путь до раскрытия парашюта спортсмен движется приблизительно равномерно с той же скоростью.

Примерно так же падают и капли дождя. Разница лишь в том, что первый период падения, когда скорость еще растет, продолжается для дождевой капли всего около 1 секунды и даже меньше. Окончательная скорость капли дождя поэтому не столь велика, как при затыжном прыжке парашютиста: она колеблется от 2 до 7 м в секунду в зависимости от размера капли*.

Бумеранг

Это оригинальное оружие — самое совершенное произведение техники первобытного человека — долгое время вызывало изумление ученых. Действительно, странные, запутанные фигуры, описываемые бумерангом в воздухе (рис. 33), способны озадачить каждого.

В настоящее время теория полета бумеранга разработана весьма подробно и чудеса перестали быть чудесами. Вда-

* О скорости дождевых капель подробнее рассказано в моей “Занимательной механике”, о затыжном прыжке — в книге “Знаете ли вы физику?”

ваться в эти интересные подробности мы не станем. Скажем лишь, что необычайные пути полета бумеранга являются результатом взаимодействия трех обстоятельств: 1) первоначальной броска, 2) вращения бумеранга и 3) сопротивления воздуха. Австралиец инстинктивно умеет сочетать эти три фактора; он искусно изменяет угол наклона бумеранга, силу и направление броска, чтобы получить желаемый результат.

Впрочем, некоторую сноровку в этом искусстве может приобрести каждый.




Рис. 33. Как австралийцы пользуются бумерангом на охоте, чтобы поражать жертву из-за прикрытия. Путь полета бумеранга (в случае промаха) показан пунктирной линией⁶.

Для упражнения в комнате приходится довольствоваться бумажным бумерангом, который можно вырезать хотя бы




Рис. 34. Бумажный бумеранг и способ его метания.




Рис. 35. Другая форма бумажного бумеранга.

из почтовой открытки в форме, указанной на рис. 34. Размеры каждой ветви — около 5 см в длину и немного меньше 1 см в ширину. Зажмите такой бумеранг под ногтем большого пальца и щелкните по его кончику так, чтобы удар был направлен вперед и немного вверх. Бумеранг полетит метров на пять, плавно опишет кривую, иногда довольно затейливую, и если не заденет какого-нибудь предмета в комнате, то упадет у ваших ног.

Еще лучше удастся опыт, если придать бумерангу форму, показанную на рис. 55. Полезно слегка изогнуть ветви бумеранга винтообразно (рис. 35, внизу). Такой бумеранг можно, при некотором навыке, заставить описывать в воздухе сложные кривые и возвращаться в место его вылета.




Рис. 36. Древнеегипетское изображение воина, мечущего бумеранг.

В заключение заметим, что бумеранг вовсе не составляет, как обычно думают, исключительной особенности вооружения обитателей Австралии. Он употребляется в различных местах Индии и, судя по остаткам стеной живописи, был некогда обычным вооружением ассирийских воинов. В Древнем Египте и Нубии бумеранг также был известен (рис. 36). Единственное, что свойственно исключительно Австралии, — это слегка винтообразный изгиб, придаваемый бумерангу. Вот почему австралийские бумеранги описывают замысловатые кривые и — в случае промаха — возвращаются обратно к ногам мечущего.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ВРАЩЕНИЕ. ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Как отличить вареное яйцо от сырого?

Как быть, если нужно, не разбивая скорлупы, определить, сварено яйцо или же оно сырое? Знание механики поможет вам с успехом выйти из этого маленького затруднения.

Дело в том, что яйца вареные и сырые вращаются не одинаковым образом. Этим и можно воспользоваться для разрешения нашей задачи. Испытуемое яйцо кладут на плоскую тарелку и двумя пальцами сообщают ему вращательное движение (рис. 37). Сваренное (особенно вкрутую) яйцо вращается при этом *замедленно и дольше* сырого.




Рис. 37. Как закрутить яйцо.




Рис. 38. Как отличить вареное яйцо от сырого.

Последнее трудно даже заставить вращаться; между тем круто сваренное яйцо вертится так быстро, что очертания его сливаются для глаз в белый сплюснутый эллипсоид¹.

Причина этих явлений кроется в том, что круто сваренное яйцо вращается как сплошное целое; в сыром же яйце жидкое его содержимое, не сразу получая вращательное движение, задерживает вследствие своей инерции движение

твердой оболочки; оно играет роль тормоза.

Вареные и сырые яйца по-разному ведут себя и при остановке вращения. Если к вращающемуся вареному яйцу прикоснуться на мгновение пальцем, оно останавливается сразу. Сырое же яйцо, остановившись на мгновение, будет после отнятия руки еще немного вращаться. Происходит это опять-таки вследствие инерции: внутренняя жидкая масса в сыром яйце еще продолжает двигаться после того, как твердая оболочка пришла в покой; содержимое же вареного яйца останавливается одновременно с остановкой наружной скорлупы.

Подобные испытания можно производить и иным образом. Обтяните сырое и вареное яйца резиновыми колечками “по меридиану”² и подвесьте на двух одинаковых бечевках (рис. 38). Закрутите обе бечевки одинаковое число раз и отпустите. Сразу обнаружится различие между вареным и сырым яйцом. Вареное, придя в начальное положение, начнет по инерции закручивать бечевку в обратную сторону, затем снова раскрутит ее, — и так несколько раз, постепенно уменьшая число оборотов. Сырое же яйцо повернется раз, другой и остановится задолго до того, как успокоится крутое яйцо: движение тормозится жидким содержимым.

“Колесо смеха”

Раскройте зонтик, уприте его конном в пол и вращайте за ручку; вам нетрудно будет придать ему довольно быстрое движение. Теперь бросьте внутрь зонтика мяч или скомканную бумагу; брошенный предмет не останется в зонтике, а будет выкинут из него тем, что принято неправильно называть “центробежной силой” и что в действительности есть лишь проявление инерции. Мяч выбрасывается не по направлению радиуса, а по касательной к пути кругового движения.

На этом эффекте вращательного движения основано устройство своеобразного развлечения — “колеса смеха” (рис. 39), которое можно видеть, например, в парках культуры и отдыха. Посетители имеют здесь случай на самих себе испытать действие инерции. Публика размещается на круглой площадке — стоя, сидя, лежа, — кто как желает. Скрытый под площадкой мотор плавно вращает ее около вертикальной оси, сначала медленно, потом все быстрее, постепенно увеличивая скорость. И тогда под действием

инерции все находящиеся на площадке начинают сползать к ее краям. Сначала это движение едва заметно, но по мере того, как “пассажиры” удаляются от центра и попадают на окружности все большего и большего радиуса, скорость, а следовательно, и инерция движения сказываются все заметнее. Никакие усилия удержаться на месте не приводят ни к чему, и люди сбрасываются с “колеса смеха”.




Рис. 39. “Колесо смеха”. Люди на вращающемся круге отбрасываются за его края.

Земной шар есть, в сущности, такое же “колесо смеха”, только гигантских размеров. Земля, конечно, не сбрасывает нас с себя, но она все же уменьшает наш вес. И на экваторе, где скорость вращения наибольшая, уменьшение веса *по этой причине* доходит до $1/300$ доли. А вместе с другой причиной (сжатие Земли) вес каждого тела на экваторе уменьшается, в общем, на полпроцента (т.е. на $1/200$), так что вес взрослого человека на экваторе будет примерно на 300 гс меньше, чем на полюсе.

Чернильные вихри

Кружок из гладкого белого картона проткните в центре заостренной спичкой; у вас получится вертушка, изобраа-

женная на рис. 40, слева. Чтобы заставить ее вертеться на заостренном конце спички, не требуется особой ловкости; достаточно закрутить спичку между пальцами и быстро уронить вертушку на гладкое место.




Рис. 40. Как растекаются чернильные капли на вертящемся бумажном кружке.

С такой вертушкой можно проделать очень показательный опыт. Прежде чем ее закружить, нанесите на верхнюю сторону кружка несколько мелких чернильных капель. Не давая им засохнуть, заставьте вертушку вертеться. Когда она остановится, посмотрите, что сделалось с каплями: каждая из них растеклась в спиральную линию, а все эти завитки вместе создают подобие вихря.

Сходство с вихрем не случайно. О чем говорят чернильные завитки на картонном кружке? Это следы движения чернильных капель. Капля претерпевает то же, что испытывает человек на вращающемся диске “колеса смеха”. Уносясь от центра действием центробежного эффекта, она попадает в места диска, обладающие большей круговой скоростью, чем скорость самой капли. В этих местах кружок выскальзывает из-под капли, опережает ее. Дело происходит так, как если бы капля отставала от кружка, отступала назад от радиуса. Путь ее поэтому искривляется, и мы видим на кружке след криволинейного движения.

То же самое претерпевают воздушные потоки, расходящиеся от места высокого давления атмосферы (в

“антициклонах”) или сходящиеся к месту низкого давления (в “циклонах”). Чернильные завитки — уменьшенное подобие этих исполинских воздушных вихрей.

Обманутое растение

При быстром вращении центробежный эффект может достигать такой величины, что превосходит действие силы тяжести. Вот интересный опыт, показывающий, какая значительная “отбрасывающая” сила развивается при вращении обыкновенного колеса. Мы знаем, что молодое растение всегда направляет стебель в сторону, противоположную силе тяжести, т.е., проще говоря, растет вверх. Но заставьте семена прорастать на ободе быстро вращающегося колеса, как это сделал впервые английский ботаник Нит в прошлом столетии. Вы увидите изумительную вещь: корешки ростков будут направлены наружу, а стебельки — внутрь, вдоль радиусов колеса (рис. 41)³.




Рис. 41. Бобовые семена, проросшие на ободе вращающегося колеса.

Мы словно обманули растение: добавили к силе тяжести другую силу, действие которой направлено от центра колеса наружу и превосходит влияние естественной силы тяжести. А так как росток тянется всегда в сторону, противоположную силе тяжести, то в этом случае он вытянулся по радиусу внутрь колеса. Искусственная тяжесть оказалась сильнее естественной*, и молодое растение выросло под ее действием⁴.

* Современная теория о природе тяготения (теория Эйнштейна) не усматривает здесь, впрочем, принципиальной разницы.

Вечные двигатели

О “вечном двигателе”, “вечном движении” часто говорят и в прямом и в переносном смысле слова, но не все отдают себе отчет, что, собственно, надо подразумевать под этим выражением. Вечный двигатель — это такой воображаемый механизм, который безостановочно движет сам себя и, кроме того, совершает еще какую-нибудь полезную работу (например, поднимает груз). Такого механизма никто построить не смог, хотя попытки изобрести его делались уже давно⁵.

На рис. 42 изображен мнимый самодвижущийся механизм — один из древнейших проектов вечного двигателя, иногда и теперь возрождаемый неудачливыми фанатиками этой идеи. К краям колеса прикреплены откидные палочки с грузами на концах. При всяком положении колеса грузы на правой стороне будут откинуты дальше от центра, нежели на левой; эта половина, следовательно, должна всегда перетягивать левую и тем самым заставлять колесо вращаться. Значит, колесо должно вращаться вечно, по крайней мере до тех пор, пока не перетрется его ось. Так думал изобретатель. Между тем, если смастерить такой двигатель, он вращаться не будет. Почему же расчет изобретателя не оправдывается?

Вот почему: хотя грузы на правой стороне всегда дальше от центра, но неизбежно такое положение, когда число этих грузов меньше, чем на левой. Взгляните на рис. 42: справа всего 4 груза, слева же — 8. Оказывается, что вся система уравновешивается; естественно, что колесо вращаться не станет, а, сделав несколько качаний, остановится*.

Теперь доказано непреложно, что нельзя построить механизм, который вечно двигался бы сам собой, выполняя еще при этом какую-нибудь работу. Совершенно безнадежно трудиться над такой задачей. В прежнее время, особенно в средние века, люди безуспешно ломали головы над ее разрешением и потратили на изобретение вечного двигателя (по-латыни — *perpetuum mobile***) много времени и труда. Обладание таким двигателем представлялось даже более

* Положение равновесия колеса можно определить с помощью уравнения моментов.

** Произносится: “перпетуум мобиле”

заманчивым, чем искусство делать золото из дешевых металлов.

У Пушкина в “Сценах из рыцарских времен” выведен такой мечтатель в лице Бертольда:

“Мартын. Что такое *perpetuum mobile*?”

Бертольд. *Perpetuum mobile*, то есть вечное движение. Если найду вечное движение, то я не вижу границ творчеству человеческому... видишь ли, добрый мой Мартын: делать золото — задача заманчивая, открытие, может быть, любопытное, но найти *perpetuum mobile*... О!...”

Были придуманы сотни вечных двигателей, но ни один не двигался, В каждом случае, как и в нашем примере, изобретатель упускал из виду какое-нибудь обстоятельство, которое и разрушало все планы.




Рис. 42. Мнимое вечно движущееся колесо, придуманное в средние века.




Рис. 43. Мнимый вечный двигатель с перекатывающимися шариками.

Вот еще образчик мнимого вечного двигателя: колесо с перекатывающимися в нем тяжелыми шариками (рис. 43). Изобретатель воображал, что шары на одной стороне колеса, находясь всегда ближе к краю, своим весом заставят колесо вращаться.

Разумеется, этого не произойдет — по той же причине, как и с колесом, изображенным на рис. 42. Тем не менее в одном из городов Америки устроено было ради рекламных целей, для привлечения внимания публики к кафе, огромное колесо именно подобного рода (рис. 44). Конечно, этот “вечный двигатель” незаметно приводился в действие искусно скрытым посторонним механизмом, хотя зрителям казалось, что колесо двигают перекатывающиеся в прорезах

тяжелые шары. В том же роде были и другие мнимые образцы вечных двигателей, выставлявшиеся одно время в витринах часовых магазинов для привлечения публики: все они незаметно приводились в движение электрическим током.




Рис. 44 Мнимый вечный двигатель в Лос-Анжелесе (Калифорния), устроенный ради рекламы.

Один рекламный “вечный двигатель” доставил мне однажды немало хлопот. Мои ученики-рабочие были им настолько поражены, что оставались холодны к моим доказательствам невозможности вечного двигателя. Вид шариков, которые, перекатываясь, вращали колесо и тем же колесом поднимались вверх, убеждал их сильнее моих доводов; они не хотели верить, что мнимое механическое чудо приводится в действие электрическим током от городской сети. Выручило меня то, что в выходные дни ток тогда не подавался. Зная это, я посоветовал слушателям наведаться к витрине в эти дни. Они последовали моему совету.

— Ну, что, видели двигатель?— спросил я.

— Нет, — ответили мне сконфуженно. — Его не видно: прикрыт газетой...

Закон сохранения энергии вновь завоевал у них доверие и более уже не утрачивал его.

“Зацепочка”

Немало русских изобретателей-самоучек трудилось над разрешением заманчивой проблемы вечного двигателя. Один из них, крестьянин-сибиряк Александр Щеглов, описан у М. Е. Салтыкова-Щедрина в повести “Современная идиллия” под именем “мещанина Презентова”. Вот как рассказывает Щедрин о посещении мастерской этого изобретателя:

“Мещанин Презентов был человек лет тридцати пяти, худой, бледный, с большими задумчивыми глазами и длинными волосами, которые прямыми прядями спускались к шее. Изба была у него достаточно просторная, но целая половина ее была занята большим маховым колесом, так что наше общество с трудом в ней разместилось. Колесо было сквозное, со спицами. Обод его, довольно объемистый, сколочен был из тесин, наподобие ящика, внутри которого была пустота. В этой-то пустоте и помещался механизм, составлявший секрет изобретателя. Секрет, конечно, не особенно мудрый, вроде мешков, наполненных песком, которым предоставлялось взаимно друг друга уравнивать. Сквозь одну из спиц была продета палка, которая удерживала колесо в состоянии неподвижности.

— Слышали мы, что вы закон вечного движения к практике применили? — начал я.

— Не знаю, как доложить, — ответил он сконфуженно, — кажется, словно бы...

— Можно взглянуть?

— Помилуйте! За счастье...

Он подвел нас к колесу, потом обвел кругом. Оказалось, что и спереди и сзади — колесо.

— Вертится?

— Должно бы, кажется, вертеться. Капризится будто...

— Можно отнять запорку?

Презентов вынул палку — колесо не шелохнулось.

— Капризится! — повторил он, — надо импет дать.

Он обеими руками схватился за обод, несколько раз повернул его вверх и вниз и, наконец, с силой раскачал и пустил, — колесо завертелось. Несколько оборотов оно сделало довольно быстро и плавно, — слышно было, однако ж, как внутри обода мешки с песком то напирают на перегородки, то отваливаются от них; потом начало вертеться тише, тише; послышался треск, скрип, и, наконец, колесо совсем остановилось.

— Зацепочка, стало быть, — сконфуженно объяснил изобретатель и опять напрягся и размахал колесо.

Но во второй раз повторилось то же самое.

— Трение, может быть, в расчет не приняли?

— И трение в расчете было... Что трение? Не от трения это, а так... Иной раз словно порадуется, а потом вдруг... закопризнает, заупрямится — и шабаш. Кабы колесо из настоящего материала было сделано, а то так, обрезки кой-какие”.

Конечно, дело тут не в “зацепочке” и не в “настоящем материале”, а в ложности основной идеи механизма. Колесо немного вертелось от “импета” (толчка), который дан был ему изобретателем, но неизбежно должно было остановиться, когда сообщенная извне энергия истощилась на преодоление трения.

“Главная сила — в шарах”

О другом русском изобретателе вечного двигателя, пермяке-крестьянине Лаврентии Голдыреве (умершем в 1884г.), повествует писатель Н. Е. Петропавловский: в рассказе “Perpetuum mobile” он выводит его под именем Пыхтина. Изобретение этого самоучки описано беллетристом, лично знавшим Голдырева, довольно подробно:

“Перед ними стояла странная машина больших размеров, с первого взгляда похожая на тот станок, в котором подковывают лошадей; виднелись плохо отесанные деревянные столбы, перекладины и целая система колес, маховых и зубчатых; все это было неуклюже, не остругано, безобразно. В самом низу, под машиной, лежали какие-то чугунные шары; целая куча этих шаров лежала и в стороне.

— Это она и есть? — спросил управляющий.

— Она-с..

— Какое чудовище!.. Ты бы хоть немного обтесал ее.

— Да, она, точно... не отесана малость.

— Что же, вертится она? — спросил управляющий.

— Как же, вертится...

— Да у тебя есть лошадь, чтобы вертеть-то ее?

— Зачем мне лошадь? Она сама, — отвечал Пыхтин и принялся показывать устройство чудища.

Главную роль играли те чугунные шары, которые сложены были тут же в кучу.

— Главная сила в этих вот шарах... Вот глядите: наперво шар буцнется на этот черпак... отсюда свистнет, подобно молнии, вон по этому желобу, а там его подденет тот черпак, и он перелетит, как сумасшедший, на то колесо и опять даст ему хорошего толчка, — такого то есть толчка, от которого он зажужжит даже... А пока этот шар летит, там уже свое дело делает другой... Там уж он опять летит и — буц вот сюда. Тут уж он опять по желобу летит... бросится на тот черпак, перескочит на то колесо и опять р-раз! Так и далее. Вот она в чем штука-то... Вот я пушу ее...

Пыхтин торопливо метался по сараю, собирая разбросанные шары. Наконец, свалив их в одну кучу подле себя, он взял один из них в руку и с размаху бухнул его на ближайший черпак колеса, потом быстро другой, за ним третий... В сарае поднялось что-то невообразимое: шары лязгали о железные черпаки, дерево колес скрипело, столбы стонали. Адский свист, жужжание, скрежет наполнили полутемное место..."

Машина, конечно, вращалась только до тех пор, пока изобретатель продолжал подбрасывать все новые и новые шары: сила их удара и вес являлись единственным источником работы мнимого вечного двигателя. Изобретатель невольно сказал правду, когда утверждал, что "главная сила в этих вот шарах". Нет сомнения, что после того, как был бы брошен в машину последний шар из кучи, неуклюжее изобретение прекратило бы свое шумное движение.

Изобретатель и сам впоследствии разочаровался в своем детище, когда, выставив его в Екатеринбурге (ныне Свердловск), ознакомился на той же выставке с настоящими промышленными машинами. Спрошенный о придуманной им "самодвижущейся машине", он уныло ответил:

— Ну ее к шуту! Прикажите уж изрубить ее на дрова..

Аккумулятор Уфимцева

Настолько легко впасть в ошибку, если о "вечном" движении судить только по внешнему виду, показывал так называемый аккумулятор механической энергии Уфимцева. Курский изобретатель А. Г. Уфимцев создал новый тип ветросиловой станции с дешевым "инерционным" аккумулятором, устроенным по типу махового колеса. В 1920 г. Уфимцевым построена была модель его аккумулятора в виде диска, вращающегося на вертикальной оси с шариковым подшипником, в кожухе, из которого выкачан воздух. Будучи разогнан до 20 000 оборотов в минуту, диск сохранял вращение в течение пятнадцати суток! Глядя на вал такого диска, целыми днями вращающийся без притока энергии извне, невдумчивый наблюдатель мог заключить, что перед ним реальное осуществление вечного движения.

"Чудо, которое не является чудом"

Безнадежная погоня за вечным двигателем многих людей сделала глубоко несчастными. Я знал человека, тратившего

все свои заработки и сбережения на изготовление моделей вечного двигателя и дошедшего вследствие этого до полной нищеты. Он сделался жертвой своей неосуществимой идеи. Полуодетый, всегда голодный, он просил у всех дать ему




Рис. 45. “Чудо, которое не является чудом”.

средства для постройки “окончательной модели”, которая уже “непременно будет двигаться”. Грустно было сознавать, что этот человек подвергался лишениям единственно лишь вследствие плохого знания элементарных основ физики.

Любопытно, что если поиски вечного двигателя всегда оказывались бесплодным, то, напротив, глубокое понимание его невозможности приводило нередко к

плодотворным открытиям ⁶.

Прекрасным примером может служить тот способ, с помощью которого Симон Стевин, замечательный голландский ученый конца XVI и начала XVII века, открыл закон равновесия сил на наклонной плоскости. Этот математик и инженер заслуживает гораздо большей известности, нежели та, какая выпала на его долю, потому что он сделал много важных открытий, которыми мы теперь постоянно пользуемся: изобрел десятичные дроби, ввел в алгебру употребление показателей, открыл гидростатический закон, впоследствии вновь открытый Паскалем,

Закон равновесия сил на наклонной плоскости он открыл, не опираясь на правило параллелограмма сил, единственно лишь с помощью чертежа, который здесь воспроизведен с виньетки на титульном листе его “Математических мемуаров” (рис. 45). Через трехгранную призму перекинута цепь из 14 одинаковых шаров. Что произойдет с этой цепью? Нижняя часть, свисающая гирляндой, уравнивается сама собой. Но остальные две части цепи — уравниваются ли друг друга? Иными словами: правые два шара уравниваются ли левыми четырьмя? Конечно, да, — иначе цепь сама собой вечно бежала бы справа налево, потому что на место соскользнувших шаров всякий раз помещались бы другие и равновесие никогда бы не восстанавливалось. Но так как мы знаем, что цепь, перекинутаая указанным образом, вовсе

не движется сама собой, то, очевидно, два правых шара действительно уравниваются четырьмя левыми. Получается словно чудо: два шара тянут с такой же силой, как и четыре.

Из этого мнимого чуда Стевин вывел важный закон механики. Он рассуждал так. Обе цепи — и длинная и короткая — весят различно: одна цепь тяжелее другой во столько же раз, во сколько раз длинная грань призмы длиннее короткой. Отсюда вытекает, что и вообще два груза, связанных шнуром, уравнивают друг друга на наклонных плоскостях, если веса их пропорциональны длинам этих плоскостей.

В частном случае, когда короткая плоскость отвесна, мы получаем известный закон механики: чтобы удержать тело на наклонной плоскости, надо действовать в направлении этой плоскости силой, которая во столько раз меньше веса тела, во сколько раз длина плоскости больше ее высоты.

Так, исходя из мысли о невозможности вечного двигателя, сделано было важное открытие в механике.

Еще “вечные двигатели”

На рис. 46 вы видите тяжелую цепь, перекинутую через колеса так, что правая ее половина при всяком положении должна быть длиннее левой. Следовательно, — рассуждал изобретатель, — она должна перевешивать и безостановочно падать вниз, приводя в движение весь механизм. Так ли это?

Конечно, нет. Мы сейчас видели, что тяжелая цепь может уравниваться легкой, если силы действуют на них под разными углами. В рассматриваемом механизме левая цепь натянута отвесно, правая же расположена наклонно, а потому она, хотя и тяжелее, все же не перетягивает левую. Ожидаемого “вечного” движения здесь получиться не может.




Рис. 46. Вечный ли это двигатель?

Пожалуй, остроумнее всех поступил некий изобретатель вечного двигателя, показывавший свое изобретение в шестидесятых годах прошлого столетия на Парижской выставке. Двигатель состоял из большого колеса с перекачивавшимися в нем шарами, причем изобретатель утверждал, что никому не удастся задержать движение колеса. Посетители один за другим пытались остановить колесо, — но оно немедленно возобновляло вращение, как только отнимали руки. Никто не догадывался, что колесо вращается именно благодаря стараниям посетителей остановить его: толкая его назад, они тем самым заводили пружину искусно скрытого механизма...

“Вечный двигатель” времен Петра I

Проблема вечного двигателя глубоко интересовала гениального “работника на троне”, Петра I, относившегося вообще благожелательно ко всем изобретателям. “Я нимало не хую алхимиста, — сказал однажды Петр, — ищущего превращать металлы в золото, механика, старающегося сыскать вечное движение, математика, старающегося узнавать долготу места, для того, что, изыскивая чрезвычайное, они внезапно изобретают многие побочные полезные вещи. Такого рода людей должно всячески ободрять, а не презирать”.

Сохранилась оживленная переписка, которую вел в 1715—1722 гг. Петр I с А. И. Остерманом и Шумахером по поводу приобретения в Германии “вечного двигателя”, придуманного неким доктором Орфиреусом. Изобретатель, прославившийся на всю Германию своим “самодвижущимся колесом”, соглашался продать царю эту машину лишь за огромную сумму. Ученый библиотекарь Шумахер, посланный Петром на Запад для собирания редкостей, так доносил царю о притязаниях Орфиреуса, с которым он вел переговоры о покупке:

“Последняя речь изобретателя была: на одной стороне положите 100 000 ефимков*, а на другой я положу машину”.

О самой же машине изобретатель, по словам библиотекаря, говорил, что она “верна есть, и никто же оную похулить

* Ефимок (Joachimstaler) — около рубля.

не может, разве из злонравия, и весь свет наполнен злыми людьми, которым верить весьма невозможно”.

В январе 1725 г. Петр собирался в Германию, чтобы лично осмотреть “вечный двигатель”, о котором так много говорили, но смерть помешала царю выполнить его намерение.

Кто же был этот таинственный доктор Орфиреус и что представляла собой его “знатная машина”? Мне удалось разыскать сведения и о том, и о другой.

Настоящая фамилия Орфиреуса была Беслер. Он родился в Германии в 1680 г., изучал богословие, медицину, живопись, и, наконец, занялся изобретением вечного двигателя. Из многих тысяч таких изобретателей Орфиреус — самый знаменитый и, пожалуй, самый удачливый. До конца дней своих (умер в 1745 г.) он жил в довольстве на доходы, которые получал, показывая свою машину.




Рис. 47. “Самодвижущееся колесо” Орфиреуса, едва не приобретенное Петром I.

На рис. 47, заимствованном из старинной книги, изображена машина Орфиреуса, какой она была в 1714 г. Вы видите большое колесо, которое будто бы не только вращалось само собой, но и поднимало при этом тяжелый груз на значительную высоту.

Слава о чудесном изобретении, которое ученый доктор показывал сначала на ярмарках, быстро разнеслась по Германии, и Орфиреус вскоре приобрел могущественных пок-

ровителей. Им заинтересовался польский король Август II, затем ландграф Гессен-Кассельский. Последний предоставил изобретателю свой замок и всячески испытывал машину.

Так, в 1717 г., 12 ноября, двигатель, находившийся в уединенной комнате, был приведен в действие; затем комната была заперта на замок, опечатана и оставлена под бдительным караулом двух гренадеров. Четырнадцать дней никто не смел даже приближаться к комнате, где вращалось таинственное колесо. Лишь 26 ноября печати были сняты; ландграф со свитой вошел в помещение. И что же? Колесо все еще вращалось “с неослабевающей быстротой”. Машину остановили, тщательно осмотрели, затем опять пустили в ход. В течение сорока дней помещение снова оставалось запечатанным; сорок суток караулили у дверей гренадеры. И когда 4 января 1718 г. печати были сняты, экспертная комиссия нашла колесо в движении!

Ландграф и этим не удовольствовался: сделан был третий опыт — двигатель был запечатан на целых два месяца. И все-таки по истечении срока его нашли движущимся!

Изобретатель получил от восхищенного ландграфа официальное удостоверение в том, что его “вечный двигатель” делает 50 оборотов в минуту, способен поднять груз весом 16 кгс на высоту 1,5 м, а также может приводить в действие кузнечный мех и точильный станок. С этим удостоверением Орфиреус и странствовал по Европе. Вероятно, он получал порядочный доход, если соглашался уступить свою машину Петру I не менее чем за 100 000 рублей.

Весть о столь изумительном изобретении доктора Орфиреуса быстро разнеслась по Европе, проникнув далеко за пределы Германии. Дошла она и до Петра, сильно заинтересовав падкого до всяких “хитрых махин” царя.

Петр обратил внимание на колесо Орфиреуса еще в 1715г., во время своего пребывания за границей, и тогда же поручил А. И. Остерману, известному дипломату, познакомиться с этим изобретением поближе; последний вскоре прислал подробный доклад о двигателе, хотя самой машины ему не удалось видеть. Петр собирался даже пригласить Орфиреуса, как выдающегося изобретателя, к себе на службу и поручил запросить о нем мнение Христиана Вольфа, известного философа того времени (учителя Ломоносова).

Знаменитый изобретатель отовсюду получал лестные предложения. Великие мира сего осыпали его высокими милостями; поэты слагали оды и гимны в честь его чудес-




Рис. 48. Разоблачение секрета колеса Орфиреуса.

ного колеса. Но были и недоброжелатели, подозревавшие здесь искусный обман. Находились смельчаки, которые открыто обвиняли Орфиреуса в плутовстве; предлагалась премия в 1000 марок тому, кто разоблачит обман. В одном из памфлетов, написанных с обличительной целью, мы находим рисунок, воспроизведенный здесь (рис. 48). Тайна “вечного двигателя”, по мнению разоблачителя, кроется просто в том, что спрятанный человек тянет за веревку, намотанную, незаметно для наблюдателей, на часть оси колеса, скрытую в стойке.

Тонкое плутовство было раскрыто случайно — только потому, что ученый доктор поссорился со своей женой и служанкой, посвященными в его тайну. Не случись этого, мы, вероятно, до сих пор оставались бы в недоумении относительно “вечного двигателя”, наделавшего столько шума. Оказывается, “вечный двигатель” действительно приводился в движение спрятанными людьми, незаметно дергавшими за тонкий шнурок. Этими людьми были брат изобретателя и его служанка.

Разоблаченный изобретатель не сдавался; он упорно утверждал до самой смерти, что жена и прислуга донесли на него по злобе. Но доверие к нему было подорвано. Недаром он твердил посланцу Петра, Шумахеру, о людском злонравии и о том, что “весь свет наполнен злыми людьми, которым верить весьма невозможно”.

Во времена Петра I славился в Германии еще и другой “вечный двигатель” — некоего Гертнера. Шумахер писал об этой машине следующее: “Господина Гертнера *perpetuum mobile*, который я в Дрездене видел, состоит из холста, песком засыпанного, и в образе точильного камня сделанной машины, которая назад и вперед сама от себя движется, но, по словам господина инвентора (изобретателя), не может весьма велика сделаться”. Без сомнения, и этот двигатель не достигал своей цели и в лучшем случае представлял собой замысловатый механизм с искусно скрытым, отнюдь не “вечным” лживым двигателем. Вполне прав был Шумахер, когда писал Петру, что французские и английские ученые “ни во что почитают все оные перепетуи мобилес и сказывают, что оное против принципов математических”.

ГЛАВА ПЯТАЯ

СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

Задача о двух кофейниках

Перед вами (рис. 49) два кофейника одинаковой ширины: один высокий, другой — низкий. Какой из них вместительнее?

Многие, вероятно, не подумав, скажут, что высокий кофейник вместительнее низкого. Если бы вы, однако, стали лить жидкость в высокий кофейник, вы смогли бы налить в него только до уровня отверстия его носика — дальше вода начнет выливаться. А так как отверстия носика у обоих кофейников на одной высоте, то низкий кофейник оказывается столь же вместительным, как и высокий с коротким носиком.




Рис. 49. В какой из этих кофейников можно налить больше жидкости?

Это и понятно: в кофейнике и в трубке носика, как во всяких сообщающихся сосудах, жидкость должна стоять на одинаковом уровне, несмотря на то что жидкость в носике весит гораздо меньше, чем в остальной части кофейника. Если же носик недостаточно высок, вы никак не нальете кофейник доверху: вода будет выливаться. Обычно носик устраивается даже выше краев кофейника, чтобы сосуд можно было немного наклонять, не выливая содержимого.

Чего не знали древние

Жители современного Рима до сих пор пользуются остатками водопровода, построенного еще древними: солидно возводили римские рабы водопроводные сооружения.

Не то приходится сказать о познаниях римских инженеров, руководивших этими работами; они явно недостаточно




Рис. 50. Водопроводные сооружения Древнего Рима.

были знакомы с основами физики. Взгляните на рис. 50, воспроизведенный с картины музея в Мюнхене. Вы видите, что римский водопровод прокладывался не в земле, а над ней, на высоких каменных столбах. Для чего это делалось? Разве не проще было бы прокладывать в земле трубы, как делается теперь? Конечно, проще, но римские инженеры того времени имели весьма смутное представление о законах сообщающихся сосудов. Они опасались, что в водоемах, соединенных очень длинной трубой, вода не установится на одинаковом уровне. Если трубы проложены в земле, следуя уклонам почвы, то в некоторых участках вода ведь должна течь вверх, — и вот римляне боялись, что вода вверх не потечет. Поэтому они обычно придавали водопроводным трубам равномерный уклон вниз на всем их пути (а для этого требовалось нередко либо вести воду в обход, либо возводить высокие арочные подпоры)¹. Одна из римских труб, Аква Марциа, имеет длину 100 км, между тем как прямое расстояние между ее концами вдвое меньше. Полсотни километров каменной кладки пришлось проложить из-за незнания элементарного закона физики!

Жидкости давят... вверх!

О том, что жидкости давят вниз, на дно сосуда, и вбок, на стенки, знают даже те, кто никогда не изучал физики. Но что они давят и *вверх*, многие даже не подозревают. Обыкновенное ламповое стекло поможет убедиться, что такое давление действительно существует². Вырежьте из

плотного картона кружок таких размеров, чтобы он закрывал отверстие лампового стекла. Приложите его к краям стекла и погрузите в воду, как показано на рис. 51. Чтобы кружок не отпадал при погружении, его можно придерживать ниткой, протянутой через его центр, или просто прижать пальцем. Погрузив стекло до определенной глубины, вы заметите, что кружок хорошо держится и сам, не прижимаемый ни давлением пальца, ни натяжением нитки: его подпирает вода, надавливающая на него снизу вверх.

Вы можете даже измерить величину этого давления вверх. Наливайте осторожно в стекло воду; как только уровень ее внутри стекла приблизится к уровню в сосуде, кружок




Рис. 51. Простой способ убедиться, что жидкость давит снизу вверх.




Рис. 52. Давление жидкости на дно сосуда зависит от площади дна и высоты уровня жидкости.

отпадет. Значит, давление воды на кружок снизу уравновешивается давлением на него сверху столба воды, высота которого равна глубине кружка под водой. Таков закон давления жидкости на всякое погруженное тело.

Отсюда, между прочим, происходит и та потеря веса в жидкостях, о которой говорит знаменитый закон Архимеда.

Имея несколько ламповых стекол разной формы, но с одинаковыми отверстиями, вы сможете проверить и другой закон, относящийся к жидкостям³; именно: давление жидкости на дно сосуда зависит только от площади дна и высоты уровня, от формы же сосуда оно совершенно не

зависит. Проверка будет состоять в том, что вы проделаете описанный сейчас опыт с разными стеклами, погружая их на одну и ту же глубину (для чего надо предварительно приклеить к стеклам бумажные полоски на равной высоте). Вы заметите, что кружок всякий раз будет отпадать при одном и том же уровне воды в стеклах (рис. 52). Значит, давление водяных столбов различной формы одинаково, если только одинаковы их основание и высота. Обратите внимание на то, что здесь важна именно *высота*, а не *длина*, потому что длинный наклонный столб давит на дно совершенно так же, как и короткий отвесный столб одинаковой с ним высоты (при равных площадях оснований).

Что тяжелее?

На одну чашку равноплечих весов поставлено ведро, до краев наполненное водой. На другую — точно такое же ведро, *тоже полное до краев*, но в нем плавает кусок дерева (рис. 53). Какое ведро перетянет?

Я пробовал задавать эту задачу разным лицам и получал разноречивые ответы. Одни отвечали, что должно перетянуть то ведро, в котором плавает дерево, потому что “кроме воды, в ведре есть еще и дерево”. Другие — что, наоборот, перетянет первое ведро, “так как вода тяжелее дерева”.

Но ни то, ни другое не верно: оба ведра имеют *одинаковый вес*. Во втором ведре, правда, воды меньше, нежели в первом, потому что плавающий кусок дерева вытесняет некоторый ее объем. Но, по закону плавания, всякое *плавающее* тело вытесняет своей погруженной частью ровно *столько жидкости* (по весу), *сколько весит все это тело*. Вот почему весы и должны оставаться в равновесии.




Рис. 53. Оба ведра одинаковы и наполнены водой до краев; в одном плавает кусок дерева. Которое перетянет?

Решите теперь такую задачу. Я ставлю на одну чашку весов стакан с водой и рядом кладу гирьку. Когда весы *уравновешены* гирями на другой чашке, я роняю гирьку в стакан с водой. Что сделается с весами, когда гирька упадет на дно сосуда?

По закону Архимеда, гирька в воде становится легче, чем была вне воды. Можно, казалось бы,

ожидать, что чашка весов со стаканом поднимется. Между тем в действительности весы останутся в равновесии. Как это объяснить?

Гирька в стакане вытеснила часть воды, которая оказалась выше первоначального уровня; вследствие этого увеличивается давление на дно сосуда, так что дно испытывает добавочную силу, равную потере веса гирькой. Насколько *легче* стала гирька, настолько же *тяжелее* стала вода в стакане; общий вес их не изменился, и поэтому равновесие чашек не нарушается.

Естественная форма жидкости

Мы привыкли думать, что жидкости не имеют никакой *собственной* формы. Это неверно. Естественная форма жидкости — шар. Обычно сила тяжести мешает жидкости принимать эту форму, и жидкость либо растекается тонким слоем, если разлита без сосуда, либо же принимает форму сосуда, если налита в него. И находясь внутри другой жидкости с такой же плотностью, жидкость, по закону Архимеда, “теряет” свой вес: она словно ничего не весит, тяжесть на нее не действует — и тогда жидкость принимает свою естественную, шарообразную форму.

Оливковое масло плавает в воде, но тонет в спирте. Можно поэтому приготовить такую смесь из воды и спирта, в которой масло не тонет и не всплывает. Введя в эту смесь немного масла посредством шприца, мы увидим странную вещь: масло собирается в большую круглую каплю, которая не всплывает и не тонет, а висит неподвижно (рис. 54)*.

Опыт надо проделывать терпеливо и осторожно, иначе получится не одна большая капля, а несколько шариков поменьше. Но и в таком виде опыт достаточно интересен.

Это, однако, еще не все. Пропустив через центр масляного шара длинный деревянный стерженек (или проволоку), вращают его. (Опыт удастся лучше, если насадить на ось небольшой смоченный маслом картонный кружочек, который весь оставался бы внутри шара.) Под влиянием вращения шар начинает сначала сплющиваться, а затем через несколько секунд отделяет от себя кольцо (рис. 55).

* Чтобы форма шара не казалась искаженной, нужно производить опыт в сосуде с плоскими стенками (или в сосуде любой формы, но поставленном внутри наполненного водой сосуда с плоскими стенками)

Разрываясь на части, кольцо это образует не бесформенные куски, а новые шарообразные капли, которые продолжают кружиться около центрального шара.




Рис. 54. Масло внутри сосуда с разбавленным спиртом собирается в шар, который не тонет и не всплывает (опыт Плато).




Рис. 55. Если масляный шар в спирте быстро вращать при помощи воткнутого в него стерженька, от шара отделяется кольцо.

Впервые этот поучительный опыт провел бельгийский физик Плато. Здесь описан опыт Плато в его классическом виде. Гораздо легче и не менее поучительно провести его в ином виде. Маленький стакан споласкивают водой, наполняют оливковым маслом и ставят на дно большого стакана; в последний наливают осторожно столько спирта, чтобы




Рис. 56. Упрощение опыта Плато.

маленький стакан был весь в него погружен. Затем по стенке большого стакана из ложечки осторожно доливают понемногу воду. Поверхность масла в маленьком стакане становится выпуклой; выпуклость постепенно возрастает, и при достаточном количестве подлитой воды поднимается из стакана, образуя шар довольно значительных размеров, висящий внутри смеси спирта и воды (рис. 56)⁴.

За неимением спирта можно проделать этот опыт с анилином — жидкостью, которая при обыкновенной температуре тяжелее воды, а при 75—85 °С легче ее. Нагревая воду, мы можем, следовательно, заставить анилин плавать внутри нее, причем он принимает форму большой шарообразной капли. При комнатной температуре капля анилина уравнивается в растворе соли ⁵.

Почему дробь круглая?




Рис. 57. Башня дроболитейного завода.

Сейчас мы говорили о том, что жидкость, освобожденная от действия силы тяжести, принимает свою естественную форму — шарообразную. Если вспомните сказанное раньше о невесомости падающего тела и примете в расчет, что в самом начале падения можно пренебречь ничтожным сопротивлением воздуха*, то сообразите, что падающие капли жидкости также должны принимать форму шаров. И действительно: падающие капли дождя имеют форму шариков. Дробинки — не что иное, как застывшие капли расплавленного свинца, который при заводском способе изготовления заставляют падать каплями с большой высоты в воду; при этом они затвердевают в форме совершенно правильных шариков.

Так отлитая дробь называется “башенной”, потому что при отливке ее заставляют падать с вершины высокой “дроболитейной” башни (рис. 57). Башни дроболитейного завода — металлической конструкции и достигают в высоту 45 м; в верхней части располагается литейное помещение с плавильными котлами, внизу — бак с водой. Отлитая дробь подлежит еще сортировке и отделке. Капля расплавленно-

* Дождевые капли опускаются равноускоренно только в самом начале падения; обычно за время порядка 1 секунды устанавливается *равномерное* движение (см. статью “Скорость дождевых капель” в моей “Занимательной механике”)⁶

го свинца застывает в дробинку еще во время падения; бак с водой нужен лишь для того, чтобы смягчить удар дробинки при падении и предотвратить искажение ее шарообразной формы. (Дробь диаметром больше 6 мм, так называемая картечь, изготавливается иначе: вырубкой из проволоки ку-сочков, потом обкатываемых.)

“Бездонный” бокал

Вы налили воды в бокал до краев. Он полон. Возле бокала лежат булавки. Может быть, для одной-двух булавок еще найдется место в бокале? Попробуйте.

Начните бросать булавки и считайте их. Бросать надо осмотрительно: бережно погружайте острие в воду и затем осторожно выпускайте булавку из руки, без толчка или давления, чтобы сотрясением не расплескать воду. Одна, две, три булавки упали на дно — уровень воды остался неизменным. Десять, двадцать, тридцать булавок... Жидкость не выливается. Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят... Целая сотня булавок лежит на дне, а вода из бокала все еще не выливается (рис. 58).




Рис. 58.
Поразительный опыт
с булавками в бокале
воды.

Не только не выливается, но даже и не поднялась сколько-нибудь заметным образом над краями. Продолжайте добавлять булавки. Вторая, третья, четвертая сотня булавок оказалась в сосуде — и ни одна капля не перелилась через край; но теперь уже видно, как поверхность воды вздулась, возвышаясь немного над краями бокала. В этом вздутии вся разгадка непонятного явления.

Вода плохо смачивает стекло, если оно хотя бы немного загрязнено жиром; края же бокала — как и вся употребляемая нами посуда — неизбежно покрывается следами жира от прикосновения пальцев. Не смачивая краев, вода, вытесняемая булавками из бокала, образует выпуклость. Вздутие незначительно на глаз, но если дадите себе труд вычислить объем одной булавки и сравните его с объемом той выпуклости, которая образовалась над краями бокала, вы убедитесь, что первый объем в сотни раз меньше второго, и оттого в “полном” бокале может найтись место

еще для нескольких сотен булавок. Чем шире посуда, тем больше булавок она способна вместить, потому что тем больше объем вздутия.

Сделаем для ясности примерный подсчет. Длина булавки — около 25 мм, толщина ее — 0,5 мм. Объем такого цилиндра нетрудно вычислить по известной формуле геометрии ($\pi D^2 h / 4$); он равен 5 куб. мм. Вместе с головкой объем булавки не превышает 5,5 куб. мм.

Теперь подсчитаем объем водяного слоя, возвышающегося над краями бокала. При диаметре бокала 9 см = 90 мм площадь круга равна около 6400 кв. мм. Считая, что толщина поднявшегося слоя только 1 мм, имеем для его объема 6400 куб. мм; это больше объема булавки в 1200 раз. Другими словами, “полный” бокал воды может принять еще свыше тысячи булавок! И действительно, осторожно опуская булавки, можно погрузить их целую тысячу, так что для глаз они словно займут весь сосуд и будут даже выступать над его краями, а вода все-таки еще не будет выливаться.

Любопытная особенность керосина

Кому приходилось иметь дело с керосиновой лампой, тот, вероятно, знаком с досадными неожиданностями, обусловленными одной особенностью керосина. Вы наполняете резервуар, вытираете его снаружи досуха, а через час находите его снова мокрым.

Дело в том, что вы недостаточно плотно закрутили горелку и керосин, стремясь растечься по стеклу, выполз на наружную поверхность резервуара. Если желаете оградить себя от подобных “сюрпризов”, вы должны возможно плотнее закручивать горелку*.

Эта ползучесть керосина весьма неприятным образом ощущается на судах, машины которых потребляют керосин (или нефть). На подобных судах, если не приняты меры, положительно невозможно перевозить никакие товары, кроме тех же керосина или нефти, потому что жидкости эти, выползая из баков через незаметные скважины, растекаются не только по металлической поверхности самих баков, но проникают решительно всюду, даже в одежду пассажиров, сообщая всем

* Но, закручивая горелку наглухо, не забудьте проследить за тем, чтобы резервуар не был налит до самых краев: керосин при нагревании расширяется довольно значительно (он увеличивается в объеме на десятую долю при повышении температуры на 100 °C), и, чтобы резервуар не лопнул, необходимо оставить место для расширения

предметам свой неистребимый запах. Попытки бороться с этим злом остаются часто безрезультатными.

Английский юморист Джером не очень преувеличивал, когда в повести “Трое в одной лодке” рассказывал о керосине следующее:

“Я не знаю вещества, более способного просачиваться всюду, чем керосин. Мы держали его на носу лодки, а он оттуда просочился на другой конец, пропитав своим запахом все, что попадалось ему по пути. Просачиваясь сквозь обшивку, он капал в воду, портил воздух и небо, отравлял жизнь. Иногда керосиновый ветер дул с запада, иногда с востока, а иной раз это был северный керосиновый ветер или, может быть, южный, но, прилетал ли он из снежной Арктики или зарождался в песках пустыни, он всегда достигал нас, насыщенный ароматом керосина. По вечерам это благоухание уничтожало прелесть заката, а лучи месяца положительно источали керосин... Привязав лодку у моста, мы пошли прогуляться по городу, но ужасный запах преследовал нас. Казалось, весь город был им пропитан”.

На самом деле, конечно, пропитано было им лишь платье путешественников.

Способность керосина смачивать наружную поверхность резервуаров подала повод к неправильному мнению, будто керосин может проникать сквозь металлы и стекло.

Копейка, которая в воде не тонет

Такая копейка существует не только в сказке, но и в действительности. Вы убедитесь в этом, если проделаете несколько легко выполнимых опытов. Начнем с более мелких предметов — с иголок. Кажется невозможным заставить стальную иглу плавать на поверхности воды, а между тем это не так трудно сделать. Положите на поверхность воды лоскуток папиросной бумаги ⁸, а на него — совершенно сухую иголку. Теперь остается только осторожно удалить папиросную бумагу из-под иглы. Делается это так: вооружившись другой иглой или булавкой, слегка погружают края лоскутка в воду, постепенно подходя к середине; когда лоскуток весь намокнет, он упадет на дно, игла же будет продолжать плавать (рис. 59). При помощи магнита, подносимого к стенкам стакана (на уровне воды), вы можете даже управлять движением этой плавающей иглы.

При известной сноровке можно обойтись и без папиросной бумаги: захватив иглу пальцами посередине, уроните ее в горизонтальном положении с небольшой высоты на поверхность воды.

Вместо иглы можно заставить плавать булавку (то и другое — не толще 2 мм), легкую пуговицу, мелкие плоские металлические предметы. На ловчившись в этом, попробуйте заставить плавать и копейку⁹.

Причина плавания этих металлических предметов та, что вода плохо смачивает металл, побывавший в наших руках и потому покрытый тончайшим слоем жира. Оттого вокруг плавающей иглы на поверхности воды образуется вдавленность, ее можно даже видеть. Поверхностная пленка жидкости, стремясь распрямиться, оказывает давление вверх на иглу и тем поддерживает ее. Поддерживает иглу также и выталкивающая сила жидкости: согласно закону плавания игла выталкивается снизу с силой, равной весу вытесненной ею воды¹⁰.

Всего проще добиться плавания иглы, если смазать ее маслом; такую иглу можно прямо класть на поверхность воды, и она не потонет.





Рис. 59. Игла, плавающая на воде. Вверху — разрез иглы (2 мм толщины) и точная форма углубления на воде.

Вода в решетке

Оказывается, что и носить воду в решетке возможно не только в сказке. Знание физики поможет исполнить такое классически невозможное дело. Для этого надо взять проволочное решето с не слишком мелкими ячейками (около 1 мм) и окунуть его сетку в растопленный парафин; затем вынуть решето из парафина: проволока окажется покрытой тонким слоем парафина, едва заметным для глаз.

Решето осталось решетом — в нем есть сквозные отверстия, через которые свободно проходит булавка, — но теперь вы можете, в буквальном смысле слова, носить в нем воду. В таком решете удерживается довольно высокий слой воды, не проливаясь сквозь ячейки; надо только осторожно налить воду и оберегать решето от толчков.

Почему же вода не проливается? Потому что, не смачивая парафин, она образует в ячейках решета тонкую пленку, обращенную выпуклостью вниз, которая и удерживает воду (рис. 60).

Такое парафинированное решето можно положить на воду, и оно будет держаться на ней. Значит, возможно не только носить воду в решете, но и плавать на нем.




Рис. 60. Почему вода не выливается из парафинированного решета.

Этот парадоксальный опыт объясняет ряд обыкновенных явлений, к которым мы чересчур привыкли, чтобы задумываться об их причине. Смоление бочек и лодок, смазывание салом пробок и втулок, окрашивание масляной краской и вообще покрытие маслянистыми веществами всех тех предметов, которые мы хотим сделать непроницаемыми для воды, а также и прорезинивание тканей — все это не что иное, как изготовление решета вроде сейчас описанного. Суть дела и там и тут одна и та же, только в случае с решетом она выступает в необычном виде.

Пена на службе техники

Опыт плавления стальной иглы и монеты на воде имеет сходство с явлением, используемым в горно-металлургической промышленности для “обогащения” руд, т.е. для увеличения содержания в них ценных составных частей. Техника знает много способов обогащения руд; тот, который мы сейчас имеем в виду и который называется “флотацией”, — наиболее действенный; он успешно применяется даже в тех случаях, когда все остальные не достигают цели.

Сущность флотации (т.е. всплывания) состоит в следующем (рис. 61). Тонко измельченная руда загружается в чан с водой и маслянистыми веществами, которые способны обволакивать частицы полезного минерала тончайшими пленками, не смачиваемыми водой. Смесь энергично перемешивается с воздухом, образуя множество мельчайших пузырьков — пену. При этом частицы полезного минерала, обложенные тонкой маслянистой пленкой, приходя в соприкосновение с

оболочкой воздушного пузырька, пристают к ней и повисают на пузырьке, который и выносит их вверх, как воздушный шар в атмосфере поднимает гондолу (рис. 61). Частицы же пустой породы, не облеченные маслянистым веществом, не пристают к оболочке и остаются в жидкости. Надо заметить, что воздушный




Рис. 61. Как происходит флотация.

пузырек пены гораздо больше по объему, нежели минеральная частица, а плавучесть его достаточна для увлечения твердой крупинки вверх. В итоге частицы полезного минерала почти все оказываются в пене, покрывающей жидкость. Пену снимают и направляют на дальнейшую обработку — для получения так называемого “концентрата”, который в десятки раз богаче полезным минералом, нежели первоначальная руда.

Техника флотации разработана так тщательно, что надлежащим подбором примешиваемых жидкостей можно отделить каждый полезный минерал от пустой породы любого состава.

К самой идее флотация привела не теория, а внимательное наблюдение случайного факта. В конце прошлого века американская учительница Карри Эверсон, стирая загрязненные маслом мешки, в которых хранился раньше медный колчедан, обратила внимание на то, что крупинки колчедана всплывают с мыльной пеной. Это и послужило толчком к развитию способа флотации.

Мнимый вечный двигатель

В книгах иногда описывается в качестве настоящего “вечного двигателя” прибор такого устройства (рис. 62): масло (или вода), налитое в сосуд, поднимается фитилями сначала в верхний сосуд, а оттуда другими фитилями — еще выше; верхний сосуд имеет желоб для стока масла, которое падает на лопатки колеса, приводя его во вращение.

Стекшее вниз масло снова поднимается по фитилям до верхнего сосуда. Таким образом, струя масла, стекающая по желобку на колесо, ни на секунду не прерывается, и колесо вечно должно находиться в движении...

Если бы авторы, описывавшие эту вертушку, дали себе труд ее изготовить, они, конечно, убедились бы, что не только колесо не вертится, но что ни одна капля жидкости даже не попадает в верхний сосуд!

Это можно сообразить, впрочем, и не приступая к изготовлению вертушки. В самом деле, почему изобретатель думает, что масло должно стекать вниз с верхней, загнутой части фитиля? Капиллярное притяжение, преодолевая тяжесть, подняло жидкость вверх по фитилю; но ведь та же причина удержит жидкость в порах намокшего фитиля, не давая ей капать с него.

Если допустить, что в верхний сосуд нашей мнимой вертушки от действия капиллярных сил может попасть жидкость, то надо будет признать, что те же фитили, которые будто бы доставили ее сюда, сами же и перенесли бы ее обратно в нижний.

Этот мнимый вечный двигатель напоминает другую водяную машину “вечного” движения, придуманную еще в 1575 г. итальянским механиком Страдою Старшим. Мы изобразили здесь этот забавный проект (рис. 63). Архимедов винт, вращаясь, поднимает воду в верхний бак, откуда она вытекает из лотка струей, ударяющей в лопатки наливного колеса (справа внизу). Водяное колесо вращает точильный камень, а одновременно двигает, с помощью ряда зубчатых колес, тот самый архимедов винт, который поднимает воду в верхний бак. Винт




Рис. 62. Неосуществимая вертушка.




Рис. 63. Старинный проект водяного “вечного” двигателя для точильного камня.

вращает колесо, а колесо — винт!.. Если бы возможны были подобные механизмы, то проще всего было бы устроить так: перекинуть веревку через блок и привязать к ее концам одинаковые гири: когда один груз опускался бы, он приподнимал бы тем самым другой груз, а тот, опускаясь с этой высоты, поднимал бы первый. Чем не вечный двигатель?

Мыльные пузыри

Умеете ли вы выдувать мыльные пузыри? Это не так просто, как кажется. И мне казалось, что здесь никакой сноровки не нужно, пока я не убедился на деле, что умение выдувать большие и красивые пузыри — своего рода искусство, требующее упражнений. Но стоит ли заниматься таким пустым делом, как выдувание мыльных пузырей? В общезнании они пользуются худой славой; по крайней мере в разговоре мы вспоминаем о них для не особенно лестных уподоблений. Совсем иначе смотрит на них физик. “Выдуйте мыльный пузырь,— писал великий английский ученый лорд Кельвин,— и смотрите на него: вы можете заниматься всю жизнь его изучением, не переставая извлекать из него уроки физики”.

Действительно, волшебные переливы красок на поверхности тончайших мыльных пленок дают физику возможность измерить длину световых волн, а исследование натяжения этих нежных пленок помогает изучать законы действия сил между частицами, — тех сил сцепления, при отсутствии которых в мире не существовало бы ничего, кроме тончайшей пыли.

Те немногие опыты, которые описаны ниже, не преследуют столь серьезных задач. Это просто интересное развлечение, которое лишь познакомит нас с искусством выдувания мыльных пузырей. Английский физик Ч. В. Бойс подробно описал длинный ряд разнообразных опытов с ними. Интересующихся мы и отсылаем к его превосходной книге*, здесь же опишем лишь простейшие опыты.

Их можно производить с раствором простого хозяйственного мыла, но для желающих мы укажем на оливковое или миндальное мыло, которое наиболее пригодно для получения крупных и красивых мыльных пузырей. Кусок такого мыла разводят осторожно в чистой холодной воде, пока не

* Бойс Ч. В. Мыльные пузыри. — М.; Л.: Детиздат, 1937.

получится довольно густой раствор. Всего лучше пользоваться дождевой или снеговой водой, а за неимением ее — кипяченой и охлажденной водой. Чтобы пузыри держались долго, Плато советует прибавлять к мыльному раствору $\frac{1}{3}$ глицерина (по объему). С поверхности раствора удаляют ложкой пену и пузырьки, а затем погружают в него тонкую трубочку, конец которой изнутри и извне вымазан предварительно мылом. Достигают хороших результатов и с помощью соломинок длиной сантиметров в десять, крестообразно расщепленных на конце.

Выдувают пузырь так: всосав предварительно в трубку немного раствора, осторожно дуют в нее, держа трубку отвесно. Так как пузырь наполняется при этом теплым воздухом наших легких, который легче окружающего комнатного воздуха, то выдутый пузырь тотчас же поднимается вверх.

Если удастся сразу выдуть пузырь сантиметров в десять диаметром, то раствор годен; в противном случае прибавляют в жидкость еще мыла до тех пор, пока можно будет выдувать пузыри указанного размера. Но этого испытания мало. Выдув пузырь, обмакивают палец в мыльный раствор и стараются пузырь проткнуть; если он не лопнет, то можно приступить к опытам; если же пузырь не выдержит, надо прибавить еще немного мыла.

Производить опыты нужно медленно, осторожно, спокойно. Освещение должно быть по возможности яркое, иначе пузыри не покажут своих радужных переливов.

Вот несколько занимательных опытов с пузырями ¹¹.

Мыльный пузырь вокруг вазочки. В тарелку или на поднос наливают мыльного раствора столько, чтобы дно тарелки было покрыто слоем в 2—3 мм; в середину кладут вазочку (или цветок) и накрывают стеклянной воронкой. Затем, медленно поднимая воронку, дуют в ее узкую трубочку, — образуется мыльный пузырь; когда же этот пузырь достигнет достаточных размеров, наклоняют воронку, как показано на рис. 64, а, высвобождая из-под нее пузырь. Тогда вазочка окажется лежащей под прозрачным полукруглым колпаком из мыльной пленки, переливающей всеми цветами радуги.

Вместо вазочки можно взять статуэтку, увенчав ее голову мыльным пузырьком (рис. 64, б). Для этого необходимо предварительно капнуть на голову статуэтки немного раствора, а затем, когда большой пузырь уже выдут, проткнуть его и выдуть внутри него маленький.

Несколько пузырей друг в друге. Из воронки, употребленной для описанного опыта, выдувают, как и в том случае, большой мыльный пузырь. Затем совершенно погружают соломинку в мыльный раствор так, чтобы только кончик ее, который придется взять в рот, остался сухим, и просовывают




Рис. 64. опыты с мыльными пузырями: а) пузырь вокруг вазочки, б) пузырь на статуэтке внутри другого пузыря, в) ряд пузырей друг в друге

ее осторожно через стенку первого пузыря до центра; медленно вытягивая затем соломинку обратно, не доводя ее, однако, до края, выдувают второй пузырь, заключенный в первом, в нем — третий, четвертый и т.д. (рис. 64, в).

Цепочка из пузырей. Чтобы составить ее (рис. 65), нужно быстро сбрасывать в воздух, один за другим, несколько мыльных пузырей, по возможности одинаковых размеров.

Цилиндр из мыльной пленки. Он получается между двумя проволочными кольцами. Для этого на нижнее кольцо спускают обыкновенный шарообразный пузырь, затем сверху к пузырю прикладывают смоченное второе кольцо и, поднимая его вверх, растягивают пузырь, пока он не сделается цилиндрическим (рис. 66). Любопытно, что если вы поднимете верхнее кольцо на высоту большую, чем длина окружности кольца, то цилиндр в одной половине сузится, в другой — расширится и затем распадется на два пузыря.

Пленка мыльного пузыря все время находится в натяжении и давит на заключенный в ней воздух; направив воронку к пламени свечи, вы можете убедиться, что сила тончайших пленок не так уж ничтожна; пламя заметно уклонится в сторону (рис. 67).




Рис. 65. Как составить цепочку из мыльных пузырей

Интересно наблюдать за пузырем, когда он из теплого помещения попадает в холодное: он видимо уменьшается в объеме и, наоборот, раздувается, попадая из холодной комнаты в теплую. Причина кроется, конечно, в сжатии и расширении воздуха, заключенного внутри пузыря ¹². Если,




Рис. 66. Как получить цилиндр из мыльной пленки.




Рис. 67. Воздух вытесняется стенками мыльного пузыря.

например, на морозе в -15°C объем пузыря 1000 куб. см и он с мороза попал в помещение, где температура $+15^{\circ}\text{C}$, то он должен увеличиться в объеме примерно на

$$1000 \cdot 30 \cdot \frac{1}{273} = \text{около } 110 \text{ куб. см.}$$

Следует отметить еще, что обычные представления о недолговечности мыльных пузырей не вполне правильны; при надлежащем обращении удастся сохранить мыльный пузырь очень долго. Английский физик Дьюар (прославившийся своими работами по сжижению водорода) хранил мыльные пузыри в особых бутылках, хорошо защищенных от пыли, высыхания и сотрясения воздуха; при таких условиях ему удавалось сохранять некоторые пузыри месяц и более. Есть сведения, что под стеклянным колпаком мыльный пузырь может сохраняться годами.

Что тоньше всего?

Немногие, вероятно, знают, что пленка мыльного пузыря представляет собой одну из самых тонких вещей, какие

доступны невооруженному зрению. Обычные предметы сравнения, служащие в нашем языке для выражения, тонкости, чрезвычайно грубы по сравнению с мыльной пленкой. “Тонкий, как волос”, “тонкий, как папиросная бумага” — означают огромную толщину рядом с толщиной пленки мыльного пузыря, которая в 5000 раз тоньше волоса и папиросной бумаги. При увеличении в 200 раз человеческий волос имеет толщину около сантиметра, разрез же




Рис. 68. Вверху — игольное ушко, человеческий волос, бациллы и паутиная нить, увеличенные в 200 раз. Внизу — бациллы и мыльная пленка, увеличенные в 40 000 раз: 1 мкм = 0,001 мм.

мыльной пленки даже в таком увеличении еще недоступен зрению. Требуется увеличение еще в 200 раз, чтобы разрез стенки мыльного пузыря усматривался в виде тонкой линии; волос же при таком увеличении (в 40 000 раз!) будет иметь толщину свыше 2 м. Рис. 68 дает наглядное представление об этих соотношениях.

Сухим из воды

Положите монету на большую плоскую тарелку, налейте столько воды, чтобы она покрыла монету, и предложите гостям взять ее прямо руками, не замочив пальцев.

Эта, казалось бы, невозможная задача довольно просто решается с помощью стакана и горящей бумажки. Зажгите бумажку, положите ее горящей внутрь стакана и быстро поставьте стакан на тарелку близ монеты дном вверх. Бумажка погаснет, стакан наполнится белым дымом, а затем под ним сама собой соберется вся вода с тарелки. Монета же, конечно, останется на месте, и через минуту, когда она обсохнет, вы сможете взять ее, не замочив пальцев.

Какая сила вогнала воду в стакан и поддерживает ее на определенной высоте? Атмосферное давление. Горящая бумажка нагрела в стакане воздух, давление его от этого возросло, и часть газа вышла наружу. Когда бумажка погас-

ла, воздух снова остыл, но при охлаждении его давление уменьшилось, и под стакан вошла вода, вгоняемая туда давлением наружного воздуха.

Вместо бумажки можно пользоваться спичками, воткнутыми в пробку, как показано на рис. 69.

Весьма нередко приходится слышать и даже читать неверное объяснение этого старинного опыта*. А именно, говорят, что при этом "сгорает кислород" и потому количество газа под стаканом уменьша-




Рис. 69. Как собрать всю воду на тарелке под стакан, опрокинутый вверх дном.

* Первое его описание и правильное объяснение принадлежат, видимо, древнему ученому (Александрийской эпохи) Филону Византийскому.

ется. Такое объяснение грубо ошибочно. Главная причина только в *нагревании* воздуха, а вовсе не в поглощении части кислорода горящей бумажкой. Это следует, во-первых, из того, что можно обойтись и без горящей бумажки, а просто нагреть стакан, сполоснув его кипятком. Во-вторых, если вместо бумажки взять смоченную спиртом вату, которая горит дольше и сильнее нагревает воздух, то вода поднимается чуть не до половины стакана; между тем известно, что кислород составляет только $1/5$ всего объема воздуха. Наконец, нужно иметь в виду, что вместо “сгоревшего” кислорода образуется углекислый газ и водяной пар; первый, правда, растворяется в воде, но пар остается, занимая отчасти место кислорода.

Как мы пьем?

Неужели и над этим можно задуматься? Конечно. Мы приставляем стакан или ложку с жидкостью ко рту и “втягиваем” в себя их содержимое. Вот это-то простое “втягивание” жидкости, к которому мы так привыкли, и надо объяснить. Почему, в самом деле, жидкость устремляется к нам в рот? Что ее увлекает? Причина такова: при питье мы расширяем грудную клетку и тем разрежаем воздух во рту; *под давлением наружного воздуха* жидкость устремляется в то пространство, где давление меньше, и таким образом проникает в наш рот. Здесь происходит то же самое, что произошло бы с жидкостью в сообщающихся сосудах, если бы над одним из этих сосудов мы стали разрежать воздух: под давлением атмосферы жидкость в этом сосуде поднялась бы. Наоборот, захватив губами горлышко бутылки, вы никакими усилиями не “втянете” из нее воду в рот, так как давление воздуха во рту и над водой одинаково.

Итак, строго говоря, мы пьем не только ртом, но и *легкими*; ведь расширение легких — причина того, что жидкость устремляется в наш рот.

Улучшенная воронка

Кому случалось наливать через воронку жидкость в бутылку, тот знает, что нужно время от времени воронку приподнимать, иначе жидкость из нее не выливается. Воздух в бутылке, не находя выхода, удерживает своим давлением жидкость в воронке. Правда, немного жидкости стечет вниз, так что воздух в бутылке чуть сожмется дав-

лением жидкости. Но стесненный в уменьшенном объеме воздух будет иметь увеличенную упругость, достаточную, чтобы уравновесить своим давлением вес жидкости в воронке. Понятно, что, приподнимая воронку, мы открываем сжатому воздуху выход наружу, и тогда жидкость вновь начинает литься.

Поэтому весьма практично устраивать воронки так, чтобы суженная часть их имела продольные гребни на наружной поверхности, — гребни, мешающие воронке вплотную приставать к горлышку ¹³.

Тонна дерева и тонна железа

Общеизвестен шуточный вопрос: что тяжелее — тонна дерева или тонна железа? Не подумавши, обыкновенно отвечают, что тонна железа тяжелее, вызывая дружный смех окружающих.

Шутники, вероятно, еще громче рассмеются, если им ответят, что тонна дерева тяжелее, чем тонна железа. Такое утверждение кажется уж ни с чем не сообразным, — и однако, строго говоря, это ответ верный!

Дело в том, что закон Архимеда применим не только к жидкостям, но и к газам. Каждое тело в воздухе теряет из своего веса столько, сколько весит вытесненный телом объем воздуха.

Дерево и железо тоже, конечно, теряют в воздухе часть своего веса. Чтобы получить истинные их веса, нужно потерю прибавить. Следовательно, в нашем случае: истинный вес дерева равен 1 тонна-сила + вес воздуха в объеме дерева; истинный вес железа равен 1 тонна-сила + вес воздуха в объеме железа. Но тонна дерева занимает гораздо больший объем, нежели тонна железа (раз в 15), поэтому истинный вес тонны дерева *больше* истинного веса тонны железа! Выражаясь точнее, мы должны были бы сказать: истинный вес того дерева, которое в воздухе весит тонну, больше истинного веса того железа, которое весит в воздухе также тонну.

Так как тонна железа занимает объем $1/8$ куб. м, а тонна дерева — около 2 куб. м, то разность в весе вытесняемого ими воздуха должна составлять около 2,5 кгс. Вот насколько тонна дерева в действительности тяжелее тонны железа! ¹⁴

Человек, который ничего не весил

Быть легким не только как пушинка, но и стать легче воздуха*, чтобы, избавившись от докучных оков силы тяжести, свободно подняться высоко над Землей куда угодно, — вот мечта, которая с детства кажется многим заманчивой. При этом обыкновенно забывают об одном — что люди могут свободно двигаться на Земле только потому, что они *тяжелее воздуха*. В сущности, “мы живем на дне воздушного океана”, — как провозгласил Торричелли, и если бы почему-либо мы сделались вдруг в тысячу раз легче — стали бы легче воздуха, — то неизбежно должны были бы всплыть к поверхности этого воздушного океана. С нами случилось бы то же, что произошло с пушкинским гусаром: “Всю склянку выпил; верь не верь — но кверху вдруг взвился я пухом”. Мы поднялись бы вверх на целые километры, пока не достигли бы области, где плотность разреженного воздуха равна плотности нашего тела. Мечты о свободном витании над горами и долинами рассыпались бы прахом, так как, освободившись от оков силы тяжести, мы сделались бы пленниками другой силы — атмосферных течений.

Писатель Уэллс избрал такое необыкновенное положение сюжетом для одного из своих научно-фантастических рассказов. Чересчур-полный человек желал во что бы то ни стало избавиться от своей полноты. А у рассказчика будто бы как раз имелся чудодейственный рецепт, который обладал способностью избавлять тучных людей от их чрезмерного веса. Толстяк выпросил у него рецепт, принял лекарство, — и вот какого рода сюрпризы поразили рассказчика, когда, придя навесить своего знакомого, он постучал у его дверей (рис. 70):

“Дверь долго не открывалась. Я слышал, как повернулся ключ, затем голос Пайкрафта (так звали толстяка. — Я. П.) произнес:

— Войдите.

Я повернул ручку и открыл дверь. Естественно, я ожидал увидеть Пайкрафта.

* Пушинка, вопреки распространенному мнению, не только не легче воздуха, но в сотни раз тяжелее его. Парит же она в воздухе лишь потому, что обладает весьма большой поверхностью, так что сила сопротивления воздуха ее движению велика.

И знаете ли, — его не было! Кабинет был в беспорядке: тарелки и блюда стояли между книгами и письменными принадлежностями, несколько стульев было опрокинуто, но Пайкрафт не было...

— Я здесь старина! Закройте дверь, — сказал он. И тогда я нашел его.

Он находился у самого карниза, в углу у двери, точно кто-нибудь приклеил его к потолку. Лицо у него было сердитое и выражало страх.

— Если что-нибудь подается, то вы, Пайкрафт, упадете и сломаете себе шею, — сказал я.

— Я рад был бы этому, — заметил он.

— Человеку ваших лет и вашего веса предаваться такой гимнастике... Однако, как вы там, черт возьми, держитесь? — спросил я.

И вдруг я увидел, что он вовсе не держится, а плавает там наверху, как надутый газом пузырь

Он сделал усилие, чтобы оторваться от потолка и сползти вдоль стены ко мне. Он ухватился за рамку гравюры, она подалась, и он снова полетел к потолку. Он хлопнулся о потолок, и тогда я догадался, почему выдающиеся части его тела запачканы мелом. Он снова, с большой осторожностью, попробовал спуститься при помощи камина.

— Это лекарство, — запыхтел он, — было слишком действенно. Потеря веса почти абсолютная.

Тут я все понял.

— Пайкрафт! — сказал я. — Ведь вам нужно было лечение от *полноты*, а вы всегда называли это *весом*... Да постойте же, я вам помогу, — сказал я, взяв несчастного за руки и дергая вниз.

Он заплясал по комнате, стараясь твердо встать где-нибудь. Курьезное зрелище! Это было очень похоже на то, как если бы я в ветреный день старался удержать парус.

— Стол этот, — сказал несчастный Пайкрафт, изнемогавший от пляски, — очень прочен и тяжел. Если бы вам удалось засунуть меня под него...

Я это сделал. Но и засунутый под письменный стол, он шатался там, как привязанный воздушный шар, ни минуты не оставаясь в покое.

— Одно лишь очевидно, — сказал я, — именно то, чего вы не должны делать. Если вы вздумаете выбраться, например, из дома, то будете подниматься все выше и выше...



Рис. 70. — Я здесь, старина! — сказал Пайкрафт

Я подал мысль, что следует приспособиться к своему новому положению. Я наметнул, что ему нетрудно будет научиться ходить по потолку на руках.

— Я не могу спать, — пожаловался он.

Я указал ему, что вполне возможно прикрепить к кровати сетке мягкий тюфяк, привязать к нему все нужные предметы тесьмами и застегивать на боку одеяло и простыню.

Ему воздвигли в комнате лестницу, и все кушанья ставились на библиотечный шкаф. Мы напали также на остроумную выдумку, благодаря которой Пайкрафт мог спуститься на пол, когда желал: она просто заключалась в том, что “Британская энциклопедия” была помещена на верхнюю полку открытого шкафа. Толстяк сейчас же вытащил пару томов и, держа их в руках, спустился на пол.

Я провел в его квартире целых два дня. С буравчиком и молотком в руках я соорудил здесь всевозможные остроумные приспособления для него: провел проволоку, чтобы он мог достать звонки, и т.д.

Я сидел возле камина, а он висел в своем любимом углу, у карниза, прибивая турецкий ковер к потолку, когда мне в голову пришла мысль:

— Э, Пайкрафт! — воскликнул я. — Все это совершенно излишне! Свинцовая подкладка под одеждой, и дело сделано!

Пайкрафт чуть не расплакался от радости.

— Купите, — сказал я, — листового свинца и нашейте его под свое платье. Носите сапоги со свинцовыми подошвами, держите в руках чемодан из цельного свинца, и готово дело! Вы не будете уже тогда пленником здесь: можете поехать за границу, можете путешествовать. Вам никогда не придется бояться кораблекрушения: стоит вам только сбросить с себя некоторые части одежды или всю ее, и вы всегда сможете полететь по воздуху.”

Все это представляется с первого взгляда вполне согласным с законами физики. Нельзя, однако, оставить без возражений иных подробностей рассказа. Наиболее серьезное возражение то, что, утратив вес своего тела, толстяк все же не поднялся бы к потолку!

В самом деле, по закону Архимеда Пайкрафт должен был бы “всплыть” к потолку в том случае, если бы вес его платья, со всем содержимым его карманов, был меньше веса воздуха, вытесняемого тучным его телом. Чему равен вес воздуха в объеме человеческого тела, нетрудно вычислить, если вспомнить, что вес нашего тела почти равен весу такого же объема воды. Мы весим примерно 60 кгс, вода в равном объеме — около того же, а воздух обычной плотности в 770 раз легче воды; значит, в объеме, равном объему нашего тела, воздух весит 80 гс. Как ни грузен был мистер Пайкрафт, он едва ли весил больше 100 кгс и, следовательно, не мог вытеснить воздух весом больше 130 гс. Неужели же костюм, обувь, бумажник и все прочее, что было на Пайкрафте, весило не больше 130 гс? Конечно, больше. А если

так, то толстяк должен был оставаться на полу комнаты, правда, в довольно неустойчивом положении, но все же не всплывать к потолку “как привязанный воздушный шар” Только раздевшись донага, Пайкрафт должен был бы действительно всплыть к потолку. В одежде же он должен был бы уподобиться человеку, подвязанному к шару-прыгуну: небольшое усилие мускулов, легкий прыжок уносил бы его высоко над Землей, откуда он в безветренную погоду плавно опускался бы обратно*.

“Вечные часы”

В этой книге мы рассмотрели уже несколько мнимых вечных двигателей и выяснили безнадежность попыток их изобрести.

Теперь побеседуем о даровом двигателе, т.е. о таком двигателе, который способен работать неопределенно долго без всяких забот с нашей стороны, так как черпает нужную ему энергию из неистощимых ее запасов в окружающей среде. Все, конечно, видели барометр — ртутный или металлический. В первом барометре вершина ртутного столбика постоянно то поднимается, то опускается, в зависимости от перемен атмосферного давления; в металлическом — от той же причины постоянно колеблется стрелка. В XVIII веке один изобретатель использовал эти движения барометра для завода часового механизма и таким образом построил часы, которые сами собой заводились и шли безостановочно, не требуя никакого завода (рис. 71).

Известный английский механик и астроном Фергюссон видел это интересное изобретение и отозвался о нем (в 1774 г.) так

“Я осмотрел вышеописанные часы, которые приводятся в непрерывное движение подъемом и опусканием ртути в своеобразно устроенном барометре; нет основания думать, чтобы они когда-либо остановились, так как накапливающаяся в них двигательная сила была бы достаточна для поддержания часов в ходу из целый год даже после полного устранения барометра. Должен сказать со всей откровенностью, что, как показывает детальное знакомство с этими часами, они являются самым остроумным механизмом, какой мне когда-либо

* Подробно о шарах-прыгунах рассказано в гл. 4 моей “Занимательной механики”

случалось видеть, — и по идее, и по выполнению”

К сожалению, часы эти не сохранились до нашего времени — они были похищены, и местонахождение их неизвестно. Остались, впрочем, чертежи их конструкции, выполненные упомянутым астрономом, так что есть возможность их восстановить.

В состав механизма этих часов входит ртутный барометр крупных размеров. В стеклянной урне, подвешенной в раме, и в опрокинутой над ней горлышком вниз большой колбе заключается около 150 кг ртути. Оба сосуда укреплены подвижно один относительно другого; искусной системой рычагов достигается то, что при увеличении атмосферного давления колба опускается и урна поднимается, при уменьшении же давления — наоборот. Оба движения заставляют вращаться небольшое зубчатое колесо всегда в одну сторону. Колесо неподвижно только при полной неизменности атмосферного давления, но во время пауз механизм часов движется прежде накопленной энергией падения гирь. Нелегко устроить так, чтобы гири одновременно поднимались вверх и двигали своим падением механизм. Однако старинные часовщики были достаточно изобретательны, чтобы справиться с этой задачей. Оказалось даже, что энергия колебаний атмосферного давления заметно превышала потребность, т.е. гири поднимались быстрее, чем опускались; понадобилось поэтому особое приспособление для периодического выключения падающих гирь, когда они достигали высшей точки.

Легко видеть важное принципиальное отличие этого и подобных ему “даровых” двигателей от “вечных” двигате-




Рис. 71. Устройство дарового двигателя XVIII века.

лей. В даровых двигателях энергия не создается из ничего, как мечтали устроить изобретатели вечного двигателя; она черпается извне, в нашем случае — из окружающей атмосферы, где она накапливается солнечными лучами. Практически даровые двигатели были бы столь же выгодны, как и настоящие “вечные” двигатели, если бы конструкция их была не слишком дорога по сравнению с доставляемой ими энергией (как в большинстве случаев и бывает).

В следующей главе мы познакомимся с другими типами дарового двигателя и покажем на примере, почему промышленное использование подобных механизмов оказывается, как правило, совершенно невыгодным.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Когда Октябрьская железная дорога длиннее — летом или зимой?

На вопрос: “Какой длины Октябрьская железная дорога?” — кто-то ответил:

— Шестьсот сорок километров в среднем; летом метров на триста длиннее, чем зимой.

Неожиданный ответ этот не так нелеп, как может показаться. Если длиной железной дороги называть длину сплошного рельсового пути, то он и в самом деле должен быть летом длиннее, чем зимой. Не забудем, что от нагревания рельсы удлиняются — на каждый градус Цельсия более чем на одну 100 000-ю своей длины. В знойные летние дни температура рельса может доходить до 30–40 °С и выше: иногда рельс нагревается солнцем так сильно, что обжигает руку. В зимние морозы рельсы охлаждаются до –25 °С и ниже. Если остановиться на разнице в 55 °С между летней и зимней температурой, то, умножив общую длину пути 640 км на 0,00 001 и на 55, получим около 1/3 км! Выходит, что и в самом деле рельсовый путь между Москвой и Ленинградом летом на треть километра, т.е. примерно метров на триста, длиннее, нежели зимой.

Изменяется здесь, конечно, не длина дороги, а только сумма длин всех рельсов. Это не одно и то же, потому что рельсы железнодорожного пути не примыкают друг к другу вплотную: между их стыками оставляются небольшие промежутки — запас для свободного удлинения рельсов при нагревании*. Наше вычисление показывает, что сумма длин

* Зазор этот, при длине рельсов 8 м, должен иметь при 0 °С размер 6 мм. Для полного закрытия такого зазора нужно повышение температуры рельса до 65 °С. При укладке трамвайных рельсов нельзя, по техническим условиям, оставлять зазоров. Это обычно не вызывает

всех рельсов увеличивается за счет общей длины этих пустых промежутков; общее удлинение в летние знойные дни достигает 300 м по сравнению с общей длиной всех рельсов в сильный мороз. Итак, *железная часть* Октябрьской дороги действительно летом на 300 м длиннее, нежели зимой ¹

Безнаказанное хищение

На линии Ленинград — Москва каждую зиму пропадает совершенно бесследно несколько сотен метров дорогой телефонной и телеграфной проволоки, и никто этим не обеспокоен, хотя виновник исчезновения хорошо известен.




Рис. 72. Изгибание трамвайных рельсов вследствие сильного нагревания.

Конечно, и вы знаете его: похититель этот — мороз. То, что мы говорили о рельсах, вполне применимо и к проводам, с той лишь разницей, что медная телефонная проволока

искривления рельсов, так как вследствие погружения их в почву температурные колебания не так велики, да и сам способ скрепления рельсов препятствует боковому их искривлению. Однако в очень сильный зной трамвайные рельсы все же искривляются, как наглядно показывает рис. 72, исполненный с фотографии. То же случается иногда и с рельсами железнодорожного пути. Дело в том, что на уклонах подвижной состав поезда при движении увлекает рельсы за собой (иной раз даже вместе со шпалами), в итоге на таких участках пути зазоры нередко исчезают и рельсы прилегают друг к другу концами вплотную.

удлиняется при нагревании в 1,5 раза больше, чем сталь. Но здесь уже нет никаких пустых промежутков, и потому мы без всяких оговорок можем утверждать, что *телефонная линия Ленинград — Москва зимой метров на 500 короче, нежели летом*. Мороз безнаказанно каждую зиму похищает чуть не полкилометра проволоки, не внося, впрочем, никакого расстройства в работу телефона или телеграфа и аккуратно возвращая похищенное при наступлении теплого времени.

Но когда такое сжатие от холода происходит не с проводами, а с мостами, последствия бывают подчас весьма ощутимы. Вот что сообщали в декабре 1927 г. газеты о подобном случае:

“Необычайные для Франции морозы, стоящие в течение нескольких дней, послужили причиной серьезного повреждения моста через Сену, в самом центре Парижа. Железный остов моста от мороза сжался, отчего вздулись и затем рассыпались кубики на покрывающей его мостовой. Проезд по мосту временно закрыт”.

Высота Эйфелевой башни

Если теперь вас спросят, какова высота Эйфелевой башни, то, прежде чем ответить: “300 метров”, вы, вероятно, осведомитесь:

— В какую погоду — холодную или теплую?

Ведь высота столь огромного стального сооружения не может быть одинакова при всякой температуре. Мы знаем, что стальной стержень длиной 300 м удлиняется на 3 мм при нагревании его на 1° С. Приблизительно на столько же должна возрастать и высота Эйфелевой башни при повышении температуры на 1 °С. В теплую солнечную погоду стальной материал башни может нагреться в Париже до +40 °С, между тем как в холодный, дождливый день температура его падает до +10 °С, а зимой до 0 °С и даже до –10 °С (большие морозы в Париже редки). Как видим, колебания температуры доходят до 40 °С и более. Значит, высота Эйфелевой башни может колебаться на $3 \times 40 = 120$ мм, или на 12 см.

Прямые измерения обнаружили даже, что Эйфелева башня еще чувствительнее к колебаниям температуры, нежели воздух: она нагревается и охлаждается быстрее и раньше реагирует на внезапное появление солнца в облачный день. Изменения высоты Эйфелевой башни были обнаружены с помощью проволоки из особой никелевой стали,

обладающей способностью почти не изменять своей длины при колебаниях температуры. Замечательный сплав этот носит название “инвар” (от латинского “неизменный”).

Итак, в жаркий день вершина Эйфелевой башни поднимается выше, чем в холодный, на отрезок, примерно равный длине этой строки, и это увеличение длины стального гиганта не стоит ни одного лишнего сантиметра.

От чайного стакана к водомерной трубке

Раньше чем разлить чай по стаканам, опытная хозяйка, заботясь об их целостности, не забывает положить в них ложки, особенно если они серебряные. Житейский опыт выработал вполне правильный прием. На чем он основан?

Уясним себе прежде, почему вообще стаканы трескаются от горячей воды.

Причина — неравномерное расширение стекла. Горячая вода, налитая в стакан, прогревает его стенки не сразу: сначала нагревается внутренний слой стенок, в то время как наружный не успевает еще нагреться. Нагретый внутренний слой тотчас же расширяется, наружный же остается пока неизменным и испытывает, следовательно, сильный напор изнутри. Происходит разрыв — стекло ломается.

Не думайте, что вы избавитесь от таких “сюрпризов”, если обзаведетесь толстыми стаканами. Толстые стаканы — как раз самые непрочные в этом отношении: они лопаются чаще, нежели тонкие. Это и понятно: тонкая стенка прогревается быстрее, в ней быстрее устанавливаются равномерная температура и одинаковое расширение, — не так, как в толстом, медленно прогреваемом слое стекла.

Об одном только не надо забывать, выбирая тонкую стеклянную посуду: тонкими должны быть не только боковые стенки, но и дно стакана. При наливании горячей воды нагревается главным образом дно; если оно толсто, стакан растрескается, как бы тонки ни были его стенки. Легко лопаются также стаканы и фарфоровые чашки с толстым кольцеобразным выступом внизу.

Чем стеклянный сосуд тоньше, тем увереннее можно подвергать его нагреванию. Химики пользуются очень тонкими сосудами и кипятят в них воду прямо на горелке, не тревожась за целостность сосуда.

Конечно, идеальной посудой была бы такая, которая вовсе не расширялась бы при нагревании. Чрезвычайно

мало расширяется *кварц*: в 15—20 раз меньше, чем стекло. Толстый сосуд из прозрачного кварца может быть как угодно нагрет — он не лопнет. Можно смело опустить кварцевый сосуд, нагретый до красного каления, в ледяную воду, не опасаясь за его целостность*.

Стаканы лопаются не только при быстром нагревании, но и при резком охлаждении. причина — неравномерное *сжатие*: наружный слой, охлаждаясь, стягивается и сильно сдавливает внутренний слой, еще не успевший охладиться и сжаться. Поэтому не следует, например, банку с горячим вареньем выставлять на резкий холод, погружать в холодную воду и т. п.

Вернемся, однако, к чайной ложечке в стакане. На чем основано ее предохраняющее действие?

Резкое различие в нагревании внутреннего и наружного слоя стенок бывает лишь тогда, когда в стакан сразу наливается очень горячая вода; вода теплая не вызывает резкой разницы в нагревании, следовательно, и в натяжении различных частей стекла. От теплой воды посуда не лопается. Что же происходит, если в стакан положена ложка? Попадая на дно, горячая жидкость, прежде чем нагреть стекло (которое плохо проводит тепло), успевает отдать часть своей теплоты хорошему проводнику — металлу; температура жидкости понижается; из горячей она делается теплой и потому почти безвредной. Дальнейшее же подливание горячего чая не столь уже опасно для стакана, так как он успел немного прогреться.

Словом, металлическая ложка в стакане (особенно если она массивна) сглаживает неравномерность нагревания стакана и тем предотвращает растрескивание стекла.

Но почему лучше, если ложка серебряная? Потому что серебро — хороший проводник тепла; серебряная ложка быстрее отнимает теплоту от воды, нежели медная. Вспомните, как серебряная ложка в стакане с горячим чаем обжигает руку! По этому признаку вы даже можете безошибочно определять материал ложки: медная ложка пальцев не обжигает².

Неравномерное расширение стеклянных стенок ставит под угрозу целостность не только чайных стаканов, но и ответственных частей парового котла — его водомерных трубок, по которым определяется высота воды в котле. Внутренние слои этих стеклянных трубок, нагреваемые горячим паром и

* Кварцевая посуда удобна для лабораторного употребления еще тем, что она очень тугоплавка: кварц плавится только при 1700 °С.

водой, расширяются больше наружных. К натяжению, порождаемому этой причиной, прибавляется еще сильное давление пара и воды в трубке, отчего она может лопнуть. Чтобы предотвратить это, изготовляют иногда водомерные трубки из двух слоев стекла разных сортов: внутренний слой имеет меньший коэффициент расширения, нежели наружный.

Легенда о сапоге в бане

“Отчего зимой день короткий и ночь длинная, а летом — наоборот? День зимой оттого короткий, что, подобно всем прочим предметам, видимым и невидимыми, от холода сжимается..., а ночь от возжигания светильников и фонарей расширяется, ибо согревается”.

Курьезное рассуждение “войска Донского отставного урядника” из рассказа Чехова вызывает у вас улыбку своей явной несообразностью. Однако люди, которые смеются над подобными “учеными” рассуждениями, нередко сами создают теории, столь же несообразные. Кому не приходилось слышать или даже читать о сапоге в бане, не влезавшем на разгоряченную ногу будто бы потому, что “нога при нагревании увеличилась в объеме”? Этот знаменитый пример сделался чуть ли не классическим, а между тем ему дают совершенно превратное объяснение.

Прежде всего, температура человеческого тела в бане почти не повышается: повышение температуры тела в бане обычно не превосходит 1 °С. Человеческий организм успешно борется с тепловым влиянием окружающей среды и поддерживает постоянную температуру на определенной точке.

Но при нагревания на 1 °С увеличение объема нашего тела так ничтожно, что его нельзя заметить при надевании сапог. Коэффициент расширения твердых и мягких частей человеческого тела не превосходит нескольких десятитысячных. Следовательно, ширина ступни и толщина голени могли бы увеличиться всего на какую-нибудь сотую долю сантиметра. Неужели же сапоги шьются с точностью до 0,01 см — толщины волоса?

Но факт, конечно, несомненен: сапоги трудно надевать после бани. Причина, однако, не в тепловом расширении, а в приливе крови, во влажной поверхности кожи и тому подобным явлениям, не имеющим ничего общего с тепловым расширением.

Как устраивались чудеса

Древнегреческий математик и механик Герон Александрийский, изобретатель фонтана, носящего его имя, оставил нам описание двух остроумных способов, с помощью которых египетские жрецы обманывали народ, внушая ему веру в чудеса.

На рис. 73 вы видите пустотелый металлический жертвенник, и под ним скрытый в подземелье механизм, приводящий в движение двери храма. Жертвенник стоял снаружи его. Когда разводят огонь, воздух внутри жертвенника вследствие нагревания сильнее давит на воду в сосуде, скрытом под полом; из сосуда вода вытесняется по трубке и выливается в ведро, которое, опускаясь, приводит




Рис. 73. Разоблачение “чуда” египетских жрецов: двери храма открываются действием жертвенного огня.

в действие механизм, вращающий двери (рис. 74). Изумленные зрители, ничего не подозревающие о скрытой под полом установке, видят перед собой “чудо”: как только на жертвеннике запылает огонь, двери храма, “внемля молитвам жреца”, растворяются словно сами собой...³

Другое “чудо”, устраивавшееся жрецами, изображено на рис. 75. Когда на жертвеннике запылает пламя, воздух, расширяясь, выдавит масло из нижнего резервуара в трубки, скрытые внутри фигур жрецов, и тогда масло чудесным образом само подливается в огонь... Но стоило жрецу, следившему за этим жертвенником, незаметно вынуть проб-




Рис. 74. Схема устройства дверей храма, которые сами открываются, когда на жертвеннике пылает огонь.




Рис. 75. Другое “чудо” древности: масло само подливается в жертвенное пламя.

ку из крышки резервуара — и излияние масла прекращалось (потому что избыток воздуха свободно выходил через отверстие); к этой уловке жрецы прибегали тогда, когда приношение молящихся было слишком скудно.

Часы без завода

Мы уже описывали раньше часы без завода (вернее, без специального завода), устройство которых основано на переменах в давлении атмосферы. Опишем теперь подобные же самозаводящиеся часы, основанные на тепловом расширении.

Механизм их изображен на рис. 76. Главная часть его — стержни Z_1 и Z_2 , сделанные из особого металлического сплава с большим коэффициентом расширения. Стержень Z_1 упирается в зубцы колеса X , так что при удлинении этого стержня от нагревания зубчатое колесо немного поворачивается. Стержень Z_2 зацепляет зубцы колеса Y при укорочении от холода и поворачивает его в том же направлении. Оба колеса насажены на вал W_1 , при вращении которого поворачивается большое колесо с черпаками. Черпаки захватывают ртуть, налитую в нижний желоб (R_1), и переносят в верхний (R_2); отсюда ртуть течет к левому колесу, также с черпаками; наполняя последние, ртуть заставляет колесо вращаться; при этом приходит в движение цепь KK , охватывающая колеса K_1 (на общем валу W_2 с большим колесом) и K_2 ; последнее колесо закручивает заводную пружину часов.

Что же делается с ртутью, вылившейся из черпаков левого колеса? Она стекает по наклонному желобу R_1 , снова к правому колесу, чтобы отсюда опять начать свое перемещение.




Рис. 76. Часы, которые заводятся сами собой.

Механизм, как видим, должен двигаться, не останавливаясь, до тех пор, пока будут удлиняться или укорачиваться стержни Z_1 и Z_2 . Следовательно, для завода часов необходимо только, чтобы температура воздуха попеременно то повышалась, то понижалась. Но это именно и происходит само собой, не требуя забот с нашей стороны: всякая перемена в температуре окружающего воздуха вызывает удлинение или укорочение стержней,

вследствие чего медленно, но постоянно закручивается пружина часов ⁴.

Можно ли назвать эти часы вечным двигателем? Конечно, нет. Часы будут идти неопределенно долго, пока не износится механизм, но источником их энергии служит теплота окружающего воздуха; работа теплового расширения накапливается этими часами по маленьким порциям, чтобы непрерывно расходовать ее на движение часовых стрелок. Это даровой двигатель, так как не требует забот и расходов на поддержание своей работы. Но он не творит энергии из ничего: первоисточником его энергии является теплота Солнца, согревающего Землю.

Другие образцы самозаводящихся часов сходного устройства изображены на рис. 77 и 78. Здесь главной частью является глицерин, расширяющийся с повышением температуры воздуха и поднимающий при этом некоторый груз; падение груза и движет механизм часов. Так как раствор глицерина не затвердевает при больших морозах, то механизм этот пригоден для часов на городских площадях и других открытых местах. Колебания температуры на 2°C уже достаточно для обеспечения хода таких часов. Один экземпляр их испытывался в течение года и показал вполне

удовлетворительный ход, хотя в течение всего года к механизму не прикасалась ничья рука.

Выгодно ли по тому же принципу устраивать двигатели более крупные? На первый взгляд кажется, что подобный даровой двигатель должен быть очень экономичен. Вычисление дает, однако, иной результат. Для завода обыкновенных часов (будильника) на целые сутки нужно энергии всего около 1 Дж. Это составляет в секунду круглым




Рис. 77. Схема устройства самозаводящихся часов другого образца.




Рис. 78. Самозаводящиеся часы; в цоколе часов скрыта трубка с глицерином.

счетом 100 000-ю долю джоуля, а так как 1 кВт равен 1000 Дж в секунду, то мощность одного часового механизма составляет всего 100 000 000-ю долю киловатта. Значит, если стоимость самозаводящихся часов оценим хотя бы в одну копейку, то капитальный расход на один киловатт подобного двигателя составит

$$1 \text{ коп.} \times 100\,000\,000 = 1\,000\,000 \text{ руб.}$$

Миллион рублей на киловатт — пожалуй, дороговато для “дарового” двигателя...

Поучительная папироса

На коробке лежит папироса (рис. 79). Она дымится с обоих концов. Но дым, выходящий через мундштук, опускается *вниз*, между тем как с другого конца он вьется *вверх*. Почему? Ведь, казалось бы, с той и с другой стороны выделяется один и тот же дым.

Да, дым один и тот же, но над тлеющим концом папиросы имеется восходящее течение нагретого воздуха, которое и увлекает с собой частицы дыма. Воздух же, проходящий




Рис. 79. Почему дым папиросы у одного конца поднимается вверх, у другого опускается вниз?

вместе с дымом через мундштук, успевает охладиться и не увлекается уже вверх; а так как частицы дыма сами по себе тяжелее воздуха, то они и опускаются вниз.

Лед, не тающий в кипятке

Возьмите пробирку, наполните водой, погрузите в нее кусочек льда, а чтобы он не всплыл вверх (лед легче воды), придавите его грузиком; при этом, однако, вода должна иметь свободный доступ ко льду. Теперь приблизьте пробирку к спиртовке так, чтобы пламя лизало лишь верхнюю часть пробирки (рис. 80). Вскоре вода начинает кипеть, выделяя клубы пара. Но странная вещь: лед на дне пробирки не тает! Мы имеем перед




Рис. 80. Вода в верхней части пробирки кипит, между тем лед внизу не тает.

собой словно маленькое чудо: лед, не тающий в кипящей воде...

Разгадка кроется в том, что на дне пробирки вода вовсе не кипит, а остается *холодной*; она кипит только *вверху*: У нас не “лед в кипятке”, а “лед под кипятком”. Расширяясь от тепла, вода становится легче и не опускается на дно, а остается в верхней части пробирки. Перемешивание слоев воды будет происходить лишь в верхней части пробирки и не захватит нижних, более плотных слоев. Нагревание может передаваться вниз лишь путем теплопроводности, но теплопроводность воды и стекла чрезвычайно мала.

На лед или под лед?

Желая *нагреть* воду, мы помещаем сосуд с водой над пламенем, а не сбоку от него. И поступаем вполне правильно, так как воздух, нагреваемый пламенем, становится более легким, вытесняется со всех сторон *кверху* и обтекает наш сосуд. Следовательно, помещая нагреваемое тело над пламенем, мы используем теплоту источника самым выгодным образом.

Но как поступить, если мы хотим, напротив, *охладить* какое-либо тело с помощью льда? Многие, по привычке, помещают тело над льдом,— ставят, например, кувшин молока поверх льда. Это нецелесообразно: ведь воздух над льдом, охладившись, *опускается* вниз и заменяется окружающим теплым воздухом. Отсюда практический вывод: если хотите остудить напиток или кушанье, помещайте его *не на лед, а под лед*.

Поясним подробнее. Если поставить сосуд с водой на лед, то охладится лишь самый нижний слой жидкости, остальная же часть будет окружена неохлажденным воздухом. Напротив, если положить кусок льда *поверх* крышки сосуда, то охлаждение его содержимого пойдет быстрее. Охлажденные верхние слои жидкости будут опускаться, заменяясь теплой жидкостью, поднимающейся снизу, пока не охладится вся жидкость в сосуде*. Кроме того, охлажденный воздух вокруг льда также будет опускаться вниз и окружит собой сосуд.

* Чистая вода охлаждается при этом не до 0 °С, а только до температуры 4 °С, при которой она имеет наибольшую плотность. Но на практике и нет надобности охлаждать напитки до 0 °С.

Почему дует от закрытого окна?

Часто дует от окна, которое закрыто совершенно плотно и не имеет ни малейшей щели. Это кажется странным. Между тем здесь нет ничего удивительного.

Воздух комнаты почти никогда не находится в покое; в нем существуют невидимые для глаза течения, порождаемые нагреванием и охлаждением воздуха. От нагревания воздух разрежается и, следовательно, становится легче; от охлаждения, напротив, уплотняется, становится тяжелее. Легкий нагретый воздух от батареи центрального отопления или теплой печи вытесняется холодным воздухом вверх, к потолку, а воздух охлажденный, тяжелый, возле окон или холодных стен, стекает вниз, к полу.

Эти течения в комнате легко обнаружить с помощью детского воздушного шара, если подвязать к нему небольшой груз, чтобы шар не упирался в потолок, а свободно парил в воздухе. Выпущенный близ нагретой печки, такой шар путешествует по комнате, увлекаемый невидимыми воздушными течениями: от печки под потолком к окну, там опускается к полу и возвращается к печке, чтобы вновь путешествовать по комнате.

Вот почему зимой мы чувствуем, как дует от окна, особенно у ног, хотя рама так плотно закрыта, что наружный воздух не может проходить сквозь щели.

Таинственная вертушка

Из тонкой папиросной бумаги вырежьте прямоугольничек. Перегните его по средним линиям и снова расправьте: вы будете знать, где центр тяжести такой фигуры. Положите теперь бумажку на острие торчащей иглы так, чтобы игла подпирала ее как раз в этой точке.

Бумажка останется в равновесии: она подперта в центре тяжести⁵. Но от малейшего дуновения она начнет вращаться на острие.

Пока приборчик не обнаруживает ничего таинственного. Но приблизьте к нему руку, как показано на рис. 81; приближайте осторожно, чтобы бумажка не была сметена током воздуха. Вы увидите странную вещь: бумажка начнет вращаться⁶, сначала медленно, потом все быстрее. Отодвиньте руку — вращение прекратится. Приблизьте — опять начнется.




Рис. 81. Почему бумажка вращается?

Это загадочное вращение одно время — в семидесятих годах прошлого века — давало многим повод думать, что тело наше обладает какими-то сверхъестественными свойствами. Любители мистического находили в этом опыте подтверждение своим туманным учениям об исходящей из человеческого тела таинственной силе. Между тем причина вполне естественна и очень проста: воз-

дух, нагретый снизу вашей рукой, поднимается вверх и, напирая на бумажку, заставляет ее вращаться, подобно всем известной спиральной “змейке” над лампой, потому что, перегибая бумажку, вы придали ее частям легкий уклон.

Внимательный наблюдатель может заметить, что описанная вертушка вращается в определенном направлении — от запястья, вдоль ладони, к пальцам. Это можно объяснить разницей температур названных частей руки: концы пальцев всегда холоднее, нежели ладонь; поэтому близ ладони образуется более сильный восходящий поток воздуха, который напирает на бумажку сильнее, чем поток, порождаемый теплотой пальцев*.

Греет ли шуба?

Что сказали бы вы, если бы вас стали уверять, будто шуба нисколько не греет? Вы подумали бы, конечно, что с вами шутят. А если бы вам стали доказывать это утверждение на ряде опытов? Прodelайте, например, такой опыт. Заметьте, сколько показывает термометр, и закутайте его в шубу. Через несколько часов выньте. Вы убедитесь, что он не нагрелся даже и на четверть градуса: сколько показывал раньше, столько показывает и теперь. Вот и доказательство, что шуба не греет. Вы могли бы заподозрить, что шубы даже холодят. Возьмите два пузыря со льдом; один закутайте в

* Можно заметить также, что при повышенной температуре вертушка движется быстрее. Этому поучительному приборчику, когда-то многих смущавшему, было в свое время посвящено даже небольшое физико-физиологическое исследование, доложенное в Московском медицинском обществе в 1876 г. (Нечаев Н. П. Вращение легких тел действием тепла руки).

шубу, другой оставьте в комнате незакрытым. Когда лед во втором пузыре растает, разверните шубу: вы увидите, что здесь он почти и не начинал таять. Значит, шуба не только не согрела льда, но как будто даже холодила его, замедляя таяние.

Что можно возразить? Как опровергнуть эти доводы? Никак. Шубы действительно не греют, если под словом “греть” разуместь *сообщение теплоты*. Лампа греет, печка греет, человеческое тело греет, потому что все эти предметы являются источниками теплоты. Но шуба в этом смысле слова нисколько не греет. Она *своего тепла не дает, а только мешает теплоте нашего тела уходить от него*. Вот почему теплокровное животное, тело которого само является источником теплоты, будет чувствовать себя в шубе теплее, чем без нее. Но термометр не порождает собственного тепла, и его температура не изменится от того, что мы закутаем его в шубу. Лед, обернутый в шубу, долгие сохраняет свою низкую температуру, потому что шуба — весьма плохой проводник теплоты — замедляет доступ к нему тепла извне, от комнатного воздуха.

В таком же смысле, как шуба, снег греет землю: будучи, подобно всем порошкообразным телам, плохим проводником тепла, он мешает теплу уходить из покрытой им почвы. В почве, защищенной слоем снега, термометр показывает нередко градусов на десять больше, чем в почве, не покрытой снегом.

Итак, на вопрос, греет ли нас шуба, надо ответить, что шуба только помогает нам греть самих себя. Вернее было бы говорить, что мы греем шубу, а не она нас.

Какое время года у нас под ногами?

Когда на поверхности земли лето, какое время года на глубине, например, трех метров под ее поверхностью?

Вы думаете, что и там лето? Ошибаетесь! Времена года на поверхности земли и в почве вовсе не одни и те же, как можно подумать. Почва чрезвычайно плохо проводит теплоту. В Ленинграде водопроводные трубы на глубине 2 м не замерзают в самые суровые морозы. Колебания температуры, происходящие на поверхности земли, распространяются в глубь почвы очень медленно и достигают разных слоев ее с большим опозданием. Непосредственные измерения, например, в Павловске (Ленинградской области) показали, что на глубину трех метров самый теплый момент года

приходит с опозданием в 76 дней, а самый холодный — с опозданием в 108 дней. Это значит, что если самый жаркий день на поверхности земли был, скажем 25 июля, то на глубине трех метров он наступит лишь 9 октября! Если самый холодный день был 15 января, то на указанной глубине он наступит в мае! Для более глубоких слоев почвы опоздания будут еще значительнее.

С углублением в почву температурные колебания не только опаздывают, но и ослабевают, а на некоторой глубине затухают совершенно: круглый год, в течение целых столетий, неизменно стоит там одна и та же постоянная температура, именно — средняя годовая температура данного места. В погребах Парижской обсерватории, на глубине 28 м, полтора столетия хранится термометр, помещенный сюда еще Лавуазье, и за полтора столетия он даже не дрогнул, неизменно показывая одну и ту же температуру (+11,7 °C).

Итак, в почве, которую мы попираем ногами, никогда не бывает того же времени года, какое стоит на ее поверхности. Когда над почвой зима, на глубине трех метров еще осень — правда, не та осень, которая была раньше, на поверхности земли, а с более умеренным понижением температуры; когда же над почвой лето, в глубину доходят слабые отголоски зимних морозов.

Это важно иметь в виду всякий раз, когда заходит речь об условиях жизни подземных животных (например, личинок майского жука) и подземных частей растений. Мы не должны удивляться, например, тому, что в корнях наших деревьев размножение клеток совершается именно в холодную половину года и что деятельность так называемой камбиальной ткани замирает почти на весь теплый сезон, — как раз наоборот, чем в стволе, над почвой.

Бумажная кастрюля

Взгляните на рис. 82: яйцо варится в воде, налитой в бумажный колпак! “Но ведь бумага сейчас загорится и вода зальет пламя”, — скажете вы. Попробуйте же сделать опыт, взяв для него плотную пергаментную бумагу и надежно прикрепив ее к проволоке. Вы убедитесь, что бумага нисколько не пострадает от огня. Причина в том, что вода может быть нагрета в открытом сосуде только до температуры кипения, т.е. до 100 °C; поэтому нагреваемая вода, обладающая к тому же большой теплоемкостью, поглощая

избыток теплоты бумаги, не дает ей нагреться заметно выше 100°C , т.е. настолько, чтобы она могла воспламениться. (Практичнее будет пользоваться небольшой бумажной коробкой в форме, изображенной на рис. 83.) Бумага не загорается, если даже пламя лижет ее.




Рис. 82. Яйцо варится в бумажной кастрюле.

К тому же роду явлений относится и печальный опыт, который невольно проделыва-




Рис. 83. Бумажная коробка для кипячения воды.

ют рассеянные люди, ставящие самовар без воды: самовар расплавляется. Причина понятна: припой сравнительно легкоплавков, и только тесное соседство воды спасает его от опасного повышения температуры. Нельзя также нагревать запаянные кастрюли без воды. В пулемете Максима нагревание воды предохраняло оружие от расплавления.




Рис. 86. Несгораемая бумажка.




Рис. 85. Несгораемая нитка.

Вы можете, далее, расплавить, например, свинцовую пломбу в коробочке, сделанной из игральной карты. Надо только подвергать действию пламени именно то место

бумаги, которое непосредственно соприкасается со свинцом: металл, как сравнительно хороший проводник тепла, быстро отнимает от бумаги тепло, не давая ей нагреться заметно выше температуры плавления, т.е. 327°C (для свинца); такая температура недостаточна для воспламенения бумаги ⁸.

Хорошо удастся также следующий опыт (рис. 84): толстый гвоздь или железный (еще лучше медный) прут обмотайте *плотно* узкой бумажной полоской наподобие винта. Затем внесите прут с бумажной полоской в пламя. Огонь будет лизать бумагу, закоптит ее, но не сожжет, пока прут не раскалится. Разгадка опыта — в хорошей теплопроводности металла; со стеклянной палочкой подобный опыт не удался бы. Рис. 85 изображает сходный опыт с “несгораемой” ниткой, *туго* намотанной на ключ.

Почему лед скользкий?

На гладко натертом полу легче поскользнуться, нежели на обыкновенном. Казалось бы, то же самое должно происходить на льду, т.е. *гладкий* лед должен быть более скользок, нежели лед бугорчатый, шероховатый.

Но если вам случалось везти нагруженные ручные санки через неровную, бугристую ледяную поверхность, вы могли убедиться, что, вопреки ожиданиям, сани проскальзывали по такой поверхности заметно легче, чем по гладкой. Шероховатый лед более скользок, чем зеркально гладкий! Это объясняется тем, что скользкость льда зависит главным образом не от гладкости, а от совершенно особой причины: от того, что температура плавления льда понижается при увеличении давления.

Разберем, что происходит, когда мы катаемся на коньках. Стоя на коньках, мы опираемся на очень маленькую площадь, всего в несколько квадратных сантиметров. И на эту небольшую площадь целиком давит вес нашего тела. Если вы вспомните сказанное в гл. 2 о давлении, то поймете, что конькобежец давит на лед со значительной силой. Под большим давлением лед тает при пониженной температуре; если, например, лед имеет температуру -5°C , а давление коньков понизило точку плавления льда, попираемого коньками, более чем на 5°C , то эти части льда будут таять*.

* Теоретически можно вычислить, что для понижения точки таяния льда на 1°C требуется весьма значительное давление (130 кгс на квадратный

Что же получается? Теперь между полозьями коньков и льдом находится тонкий слой воды,— неудивительно, что конькобежец скользит. И как только он переместит ноги в другое место, там произойдет то же самое. Всюду под коньками лед превращается в тонкий слой воды. Такими свойствами из всех существующих тел обладает только лед; один советский физик назвал его “единственным скользким телом в природе”. Прочие тела гладки, но не скользки¹⁰.

Теперь мы можем вернуться к вопросу о том, гладкий или шероховатый лед более скользок. Мы знаем, что один и тот же груз давит тем сильнее, чем на меньшую площадь он опирается. В каком же случае человек оказывает на опору большее давление: когда он стоит на зеркально гладком или на шероховатом льду? Ясно, что во втором случае: ведь здесь он опирается лишь на немногие выступы и бугорки шероховатой поверхности. А чем больше давление на лед, тем обильнее плавление и, следовательно, лед тем более скользок (если только полоз достаточно широк; для узкого полоза коньков, врезающегося в бугорки, это неприложимо— энергия движения расходуется здесь на срезывание бугорков).

Понижением точки таяния льда под значительным давлением объясняется и множество других явлений обыденной жизни. Благодаря этой особенности льда отдельные куски его смерзаются вместе, если их сильно сдавливать. Мальчик, сжимая в руках комья снега при игре в снежки, бессознательно пользуется именно этим свойством ледяных крупинок (снежинок) смерзаться под усиленным давлением, понижающим температуру их таяния. Катая снежный ком для “снежной бабы”, мы опять-таки пользуемся указанной особенностью льда: снежинки в местах соприкосновения, в нижней части кома, смерзаются под тяжестью надавливающей на них массы. Вы понимаете теперь, конечно, почему в сильные морозы снег образует рассыпающиеся снежки, а “баба” плохо лепится. Под давлением ног прохожих снег на тротуарах постепенно уплотняется в лед: снежинки смерзаются в сплошной пласт¹¹.

сантиметр). Производит ли конькобежец такое огромное давление на лед? Если распределить вес конькобежца на поверхность полозьев коньков, то получатся числа гораздо меньше. Это доказывает, что ко льду прилегает *вплотную* далеко не вся поверхность полозьев, а лишь ее часть⁹.

Задача о ледяных сосульках

Случалось ли вам задумываться над тем, как образуются ледяные сосульки, которые мы часто видим свешивающимися с крыш?

В какую погоду образовались сосульки: в оттепель или в мороз? Если в оттепель, то как могла замерзнуть вода при температуре выше нуля? Если в мороз, то откуда могла взяться вода на крыше?

Вы видите, что задача не так проста, как кажется сначала. Чтобы могли образоваться ледяные сосульки, нужно в одно и то же время иметь *две температуры*: для таяния — выше нуля и для замерзания — ниже нуля.

На самом деле так и есть: снег на склоне крыши тает, потому что солнечные лучи нагревают его до температуры *выше* нуля, а стекающие капли воды у края крыши замерзают, потому что здесь температура *ниже* нуля. (Конечно, мы говорили не о том случае образования сосулек, который обусловлен теплотой отапливаемого под крышей помещения.)

Представьте такую картину. Ясный день; мороз всего в $1-2^{\circ}\text{C}$. Солнце заливает все своими лучами; однако же эти косые лучи не нагревают Землю настолько, чтобы снег мог таять. Но на склон крыши, обращенный к Солнцу, лучи




Рис. 86. Лучи Солнца греют наклонную крышу сильнее, чем горизонтальную земную поверхность (указаны углы падения лучей)

падают не полого, как на Землю, а круче, под углом, более близким к прямому. Известно, что освещение и нагревание лучами тем больше, чем больший угол составляют лучи с плоскостью, на которую они падают. (Поток энергии на единицу поверхности пропорционален синусу этого угла; для случая, изображенного на рис. 86, снег на крыше получает тепла в 2,5 раза больше, нежели равная площадь снега на горизонтальной поверхности, потому что синус 60° больше синуса 20° в 2,5 раза.) Вот почему скат крыши нагревается сильнее и снег на нем может таять. Оттаявшая вода стекает и каплями свисает с края крыши. Но под крышей температура ниже нуля, и капля, охлаждаемая к тому же испарением, замерзает. На замерзшую каплю натекает следующая, такая же замерзающая; затем третья капля, и т.д.; постепенно образуется маленький ледяной бугорок. В другой раз при такой же погоде эти ледяные наплывы еще удлиняются, и в результате образуются сосульки, вырастающие наподобие известковых сталактитов в подземных пещерах. Так возникают сосульки на крышах сараев и вообще неотапливаемых помещений.

Та же причина вызывает на наших глазах и более грандиозные явления: ведь различие в климатических поясах и временах года обусловлено в значительной степени* изменением угла падения солнечных лучей. Солнце от нас зимой почти на таком же расстоянии, как и летом; оно одинаково удалено от полюсов и экватора (различия в расстоянии настолько ничтожны, что не имеют значения). Но наклон солнечных лучей к поверхности Земли близ экватора больше, чем у полюсов; летом этот угол больше, чем зимой. Это вызывает заметные различия в температуре дня и, следовательно, в жизни всей природы.

* Но не всецело: другая важная причина заключается в неодинаковой продолжительности дня, т. е. того промежутка времени, в течение которого Солнце согревает Землю. Обе причины, впрочем, обусловлены одним астрономическим фактом: наклоном земной оси к плоскости обращения Земли вокруг Солнца.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЛУЧИ СВЕТА

Пойманные тени

Ой, тени, тени черные,
Кого вы не нагоните?
Кого не перегоните?
Вас только, тени черные,
Нельзя поймать — обнять!

Некрасов

Прадеды наши умели если не ловить свои тени, то извлекать из них пользу: с помощью теней рисовали “силуэты” — теневые изображения человеческой фигуры.

В наши дни благодаря фотографии каждый имеет возможность получить свой портрет или запечатлеть черты дорогих ему людей. Но в XVIII веке люди не были так счастливы: портреты, заказываемые художникам, стоили больших денег и были доступны лишь немногим. Вот почему так распространены были *силуэты*: до известной степени они заменяли тогда современные фотографии. Силуэты — пойманные и закрепленные тени. Они получались механическим путем и в этом отношении напоминают противоположную им светопись. Мы пользуемся *светом*, предки наши для той же цели пользовались его отсутствием — *тенью*.

Как зарисовывались силуэты, понятно из рис. 87. Голову поворачивали так, чтобы тень давала характерный профиль, и обводили карандашом ее очертания. Затем контур заливали тушью, вырезали и наклеивали на белую бумагу; силуэт готов. При желании уменьшали его с помощью особого прибора — пантографа (рис. 88).

Не думайте, что простой темный абрис не может дать представления о характерных чертах оригинала. Напротив, удачный силуэт отличается иногда поразительным сходст-

вом с оригиналом (рис. 89). Эта особенность теневых изображений — при простоте контуров давать сходство с оригиналом — заинтересовала некоторых художников, которые стали рисовать в таком роде целые сцены, ландшафты и т. п. Постепенно рисование силуэтов создало целую школу художников¹.




Рис. 87. Старинный способ получения силуэтных портретов.

Курьезно происхождение самого слова “силуэт”: оно заимствовано от фамилии французского министра финансов середины XVIII века Этьена де Силуэт, призывавшего




Рис. 88. Уменьшение силуэтного портрета.



Рис. 89. Силуэт Шиллера (1790 г.).

своих расточительных современников к разумной бережливости и упрекавшего французскую знать в чрезмерных тратах на картины и портреты. Дешевизна теневых портретов подала повод шутникам называть их портретами “à la Silhouette” (“по Силуэту”).

Цыпленок в яйце

Свойствами теней вы можете воспользоваться, чтобы показать товарищам интересную шутку. Из промасленной бумаги устройте экран; для этого достаточно затянуть такой бумагой квадратный вырез в листке картона. Позади экрана поместите две лампы; зрители будут сидеть впереди него, по другую сторону. Одну лампу, например левую, зажгите.




Рис. 90. Мнимый рентгеновский снимок.

Между зажженной лампой и экраном поставьте на проволоке овальный кусок картона, и тогда на экране появятся, конечно, силуэт яйца. (Правая лампа пока не зажжена.) Теперь вы заявляете гостям, что приведете в действие “рентгеновский аппарат”, который обнаружит внутри яйца... цыпленка! И действительно, через мгновение гости видят, как силуэт яйца словно светлеет по краям, а в середине его довольно отчетливо вырисовывается силуэт цыпленка (рис. 90).

Разгадка фокуса проста: вы зажигаете правую лампу, на пути лучей которой помещен картонный контур цыпленка.

Часть овальной тени, на которую накладывается тень от “цыпленка”, освещена правой лампой, поэтому края “яйца” светлее внутренней части. Зрители же, сидящие по ту сторону экрана и ничего не подозревающие о ваших действиях, могут, пожалуй, — если они несведущи в физике, — вообразить, что вы в самом деле пропустили через яйцо рентгеновские лучи.

Карикатурные фотографии

Многие не знают, что фотографический аппарат можно устроить и без увеличительного стекла (объектива), пользуясь просто маленьким круглым отверстием. Изображения получаются при этом менее яркие. Любопытные видоизменения такой камеры без объектива представляет “щелевая” камера, в которой вместо дырочки имеются две пересекающиеся щели. В передней части камеры помещаются две пластинки; в одной сделана вертикальная щель, в другой — горизонтальная. Если обе пластинки прилегают друг к другу вплотную, изображение получается такое же, как и у камеры с дырочкой, т.е. неискаженное. Совсем иное наблюдается, если пластинки находятся на некотором расстоянии одна от другой (их нарочно делают подвижными); тогда изображение курьезным образом искажается (рис. 91 и 92). Получается скорее карикатура, нежели фотография.



Рис. 91.
Фотография-карикатура,
вытянутая вертикально.



Рис. 92. Фотография-карикатура,
вытянутая горизонтально.

Чем же объясняется такое искажение?

Рассмотрим случай, когда горизонтальная щель находится впереди вертикальной (рис. 93). Через переднюю щель *В* лучи от *вертикальной* линии фигуры *А* (креста) пройдут как через простое отверстие; задняя щель несколько не изменит хода этих лучей. Следовательно, изображение вертикальной линии получится на матовом стекле *Д* в том масштабе, который отвечает расстоянию *Д* от щели *В*.

Иначе изобразится на стекле *горизонтальная* линия фигуры *А* при том же расположении щелей. Через горизонтальную щель лучи пройдут беспрепятственно, не перекрещиваясь, пока не достигнут вертикальной щели *С*; через эту щель лучи пройдут как через дырочку и дадут на матовом стекле *Д* изображение в том масштабе, который отвечает расстоянию *Д* от щели *С*.




Рис. 93. Почему щелевая камера дает искаженные изображения.

Короче говоря, для *вертикальных* линий при данном расположении щелей как бы существует одна только *передняя* щель; для *горизонтальных*, напротив, — одна только *задняя*. А так как передняя щель *дальше* от матового стекла, нежели задняя, то все вертикальные размеры должны получиться на стекле *Д* в большем масштабе, нежели горизонтальные: изображение будет как бы вытянуто по вертикальному направлению.

Наоборот, при обратном расположении щелей должно получиться изображение, вытянутое в горизонтальном направлении (ср. рис. 91 и 92).

Понятно, что при *косом* размещении щелей будут получаться искажения соответственно иного рода.

Такой камерой можно пользоваться для получения не одних лишь карикатур. Она пригодна и для более серьезных практических целей, например для того, чтобы приготовить варианты архитектурных украшений, узоров для ковров, обоев

и т. п., вообще получать орнаменты и узоры, по желанию растянутые или сжатые в определенном направлении.

Задача о солнечном восходе

Вы наблюдали восход Солнца ровно в 5 часов. Но известно, что свет распространяется не мгновенно: требуется некоторое время, чтобы лучи успели дойти от источника света до глаза наблюдателя. Можно поэтому задать вопрос: в котором часу наблюдали бы вы тот же восход, если бы свет распространялся мгновенно?

Свет пробегает расстояние от Солнца до Земли примерно за 8 минут. Казалось бы, что при *мгновенном* распространении света мы должны были бы увидеть восход солнца на 8 минут раньше, т.е. в 4 часа 52 минуты.

Для многих, вероятно, будет полной неожиданностью, что такой ответ совершенно неверен. Ведь Солнце “восходит” оттого, что наш земной шар повертывается в уже *освещенное пространство* новые точки своей поверхности. Поэтому при мгновенном распространении света вы заметили бы восход Солнца *в тот же самый момент*, что и при последовательном его распространении, т.е. ровно в 5 часов*.

Другое дело, если вы наблюдаете (в телескоп) появление на краю Солнца какого-нибудь выступа (протуберанца): при мгновенном распространения света вы заметили бы его на 8 минут раньше.

* Если же принять во внимание так называемую “атмосферную рефракцию”, то результат получится еще более неожиданный. Рефракция искривляет путь лучей в воздухе и тем самым позволяет нам видеть восход Солнца ранее его геометрического появления над горизонтом. Но при мгновенном распространении света рефракции быть не может, так как преломление обусловливается различием скорости света в разных средах. Отсутствие же рефракции повлечет за собой то, что наблюдатель увидит восход Солнца немного позже, чем при немгновенном распространении света; разница эта, завися от широты места наблюдения, температуры воздуха и других условий, колеблется от 2 минут до нескольких суток и даже более (в полярных широтах). Получается любопытный парадокс при мгновенном (т. е. бесконечно быстром) распространении света мы наблюдали бы восход Солнца позже, чем при немгновенном! Дальнейшее развитие этой задачи см. в моей книге “Знаете ли вы физику?”

По океану Вселенной

Говоря о распространении солнечных лучей в мировом пространстве, интересно указать на одну особенность света, менее известную, но подавшую некоторым пылким умам надежду осуществить возможность путешествовать по океану Вселенной. Я говорю о *давлении* света. Вот что писал об этом в книге “Давление света” английский физик Дж. Пойнтинг:

“Когда мы наблюдаем, как плотина размывается во время шторма, нам легко верится, что морские волны производят давление на берег, о который они ударяются. Но трудно поверить, что микроскопические световые волны также дают на всякий предмет, на который они падают, что зажженная лампа, например, посылает волны, производящие давление на самый источник света и на поверхность, которую они освещают. А между тем нам теперь достоверно известно, что свет производит подобного рода давление”.

Спешу прибавить, что давление это крайне ничтожно; лучи Солнца дают на земную поверхность с силой около 0,5 мкс на квадратный метр, или 0,5 кгс на квадратный километр. Вся обращенная к Солнцу поверхность земного шара испытывает от солнечных лучей силу давления в 60 миллионов кгс. Цифра эта кажется, конечно, колоссальной, но она много потеряет в ваших глазах, если я скажу вам, что она меньше силы, с которой Земля притягивается Солнцем, в 60 *миллионов миллионов* (6×10^{13}) раз! В сущности, эта сила давления представляет ведь “только” вес тысячи паровозов.

Для мелких тел отношение между силой светового давления и силой притяжения выражается более крупной дробью, чем для земного шара. Это и понятно, так как сила давления лучей света пропорциональна *поверхности* тела, а сила притяжения пропорциональна *массе*. Если бы поперечник земного шара был вдвое меньше, то объем, а следовательно, и масса его уменьшились бы в 8 раз, поверхность же — в 4 раза; вследствие этого притяжение уменьшилось бы в 8 раз, но давление лучей — всего в 4 раза.

Отсюда вытекает любопытное следствие. Так как сила давления лучей Солнца с уменьшением поперечника освещаемого тела убывает медленнее, нежели сила притяжения, то ясно, что при некотором достаточно малом диаметре тела обе силы должны сравняться. Вычислено, что микроскопически маленькая водяная капелька (или частица другого вещества), диаметром менее тысячной доли миллиметра,

находясь от Солнца на расстоянии Земли, испытывает со стороны Солнца давление, равное его притяжению. Другими словами, такая капелька или пылинка как бы не притягивается Солнцем. Для еще более мелких капель сила светового давления должна уже *превышать* силу солнечного притяжения, т.е. такая капля будет *отталкиваться лучами Солнца*. Перевес светового давления над притяжением дает, правда, в данном случае ничтожную силу, — но ведь и масса этой капельки неизмеримо мала.

Неудивительно, что скорость, которую лучи света сообщают такой капельке, может достигать нескольких десятков и более километров в секунду.

Теперь не покажется странным, что мельчайшие бактерии и особенно их споры могли бы, достигнув верхних границ атмосферы, покидать нашу планету и уноситься в беспредельное мировое пространство с огромной, притом все возрастающей скоростью. Шведский ученый Сванте Аррениус допускал даже, что этим путем могут переноситься с планеты на планету зародыши жизни...

Если у вас живое воображение, то при чтении этих строк вы, наверное, подумали: а не может ли и человек воспользоваться тем же способом для межпланетного путешествия? Нет, потому что для этого необходимо было бы соорудить снаряд, для которого отношение поверхности к массе было бы такое же выгодное, как и у мельчайших бактерий ².

ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕЛОМЛЕНИЕ СВЕТА

Видеть сквозь стены

В девяностых годах прошлого века продавался любопытный прибор под громким названием: “рентгеновский аппарат”. Помню, как я был озадачен, когда еще школьником впервые взял в руки эту остроумную выдумку: трубка давала возможность видеть буквально сквозь непрозрачные пред-




Рис. 94. Мнимый рентгеновский аппарат

меты! Я различал окружающее не только через толстую бумагу, но и через лезвие ножа, непроницаемое даже для подлинных рентгеновских лучей. Нехитрый секрет устройства этой игрушки сразу станет вам ясен, если вы взглянете на рис. 94, изображающий прообраз описываемой трубки.

Четыре зеркальца, наклоненных под углом в 45° , отражают лучи несколько раз, ведя их, так сказать, в обход непрозрачного предмета.

В военном деле широко пользуются подобными приборами. Сидя в траншее, можно следить за неприятелем, не поднимая головы над землей и, следовательно, не подставляя себя под огонь неприятеля, если смотреть в прибор, который называется “перископом” (рис. 95).




Рис. 95 Перископ.




Рис. 96. Схема перископа подводной лодки.

Чем длиннее путь лучей света от места вступления в перископ до глаза наблюдателя, тем меньше поле зрения, видимое в прибор. Чтобы увеличить поле зрения, применяется система оптических стекол. Однако стекла поглощают

часть света, попадающего в перископ; видимость предметов от этого ухушается.

Капитан подводной лодки наблюдает за атакуемым судном также посредством перископа — длинной трубки, конец которой выступает над водой. Эти перископы гораздо сложнее, чем сухопутные, но сущность та же: лучи отражаются от зеркала (или призмы), укрепленного в выступающей части перископа, идут вдоль трубы, отражаются в нижней ее части и попадают в глаз наблюдателя (рис. 96).

Говорящая “отрубленная” голова

“Чудо” это нередко показывалось в странствующих по провинции “музеях” и “паноптикумах”. Непосвященного оно положительно ошеломляет: вы видите перед собой небольшой столик с тарелкой, а на тарелке лежит... живая



Рис. 97. Секрет
“отрубленной” головы.

человеческая голова, которая двигает глазами, говорит, ест! Под столиком спрятать туловище как будто негде. Хотя подойти вплотную к столу нельзя, — вас отделяет от него барьер, — все же вы ясно видите, что под столом ничего нет.

Когда вам придется быть свидетелем такого “чуда”, попробуйте закинуть в пустое место под столиком скомканную бумажку. Загадка сразу разъяснится: бумажка отскочит от... зеркала! Если она и не долетит до стола, то все же обнаружит существование зеркала, так как в нем появится ее отражение (рис. 97).

Достаточно поставить по зеркалу между ножками стола, чтобы пространство под ним казалось издали пустым, — разумеется, в том лишь случае, если в зеркале — не отражается обстановка комнаты или публики. Вот почему комната должна быть пуста, стены совершенно одинаковы, пол выкрашен в однообразный цвет, без узоров, а публика держится от зеркала на достаточном расстоянии.

Секрет прост до смешного, но пока не узнаешь, в чем он заключается, теряешься в догадках.

Иногда фокус обставляется еще эффектнее. Фокусник показывает сначала пустой столик: ни под ним, ни над ним ничего нет. Затем приносится из-за сцены закрытый ящик,

в котором будто бы и хранится “живая голова без туловища” (в действительности же ящик пустой). Фокусник ставит этот ящик на стол, откидывает переднюю стенку, — и изумленной публике представляется говорящая человеческая голова. Читатель, вероятно, уже догадался, что в верхней доске стола имеется откидная часть, закрывающая отверстие, через которое сидящий под столом, за зеркалами, просовывает голову, когда на стол ставят пустой ящик без дна. Фокус видоизменяют и на иной лад, но перечислять все варианты мы здесь не станем; увидев, читатель разгадает их сам.

Вперед или сзади?

Есть не мало вещей домашнего обихода, с которыми многие люди обращаются нецелесообразно. Мы уже указывали раньше, что иные не умеют пользоваться льдом для охлаждения: ставят охлаждаемые напитки *на* лед, вместо того чтобы помещать их *под* лед. Оказывается, что и обыкновенным зеркалом не все умеют пользоваться. Сплошь и рядом, желая хорошо разглядеть себя в зеркале, ставят лампу *позади* себя, чтобы “осветить свое отражение”, вместо того чтобы осветить самих себя! Некоторые женщины поступают именно таким образом. Наша читательница, без сомнения, догадается поместить лампу *вперед* себя.

Можно ли видеть зеркало?

Вот еще доказательство недостаточного знакомства нашего с обыкновенным зеркалом: на поставленный в заголовке вопрос большинство отвечает неправильно, хотя все глядится в зеркало ежедневно.

Те, кто убежден, что зеркало можно видеть, ошибаются. Хорошее чистое зеркало невидимо. Можно видеть раму зеркала, его края, предметы, в нем отражающиеся, но самого зеркала, если только оно не загрязнено, видеть нельзя. Всякая *отражающая* поверхность, в отличие от поверхности *рассеивающей*, сама по себе невидима. (Рассеивающей называется такая поверхность, которая разбрасывает лучи света по всевозможным направлениям. Обычно мы называем отражающие поверхности зеркальными или полированными, а рассеивающие — матовыми¹.)

Все трюки, фокусы и иллюзии, основанные на использовании зеркал, — хотя бы, например, сейчас описанный опыт с головой, — основаны именно на том, что само зеркало невидимо, а видны лишь отражающиеся в нем предметы.

Животные у зеркала

Любопытно, — хотя и не совсем с точки зрения физики, — как относятся к своему отражению в зеркале животные. Многие животные попросту не видят его. Мне никак не удавалось добиться того, чтобы кошка заметила свое отражение. Возможно, что иллюзия разрушается для нее отсутствием тех обонятельных впечатлений, которые в ее сознании сопутствуют зрительному образу живой кошки. Не потому ли животные на водопое безбоязненно относятся к отражению своей головы в воде? Экспериментов с собаками и с лошадьми я не проводил. Зато не подлежит сомнению, что обезьяны вполне поддаются иллюзии зеркала. Вот что рассказывал об этом наблюдатель из Ленинградского зоологического сада:

“Зеркало было прибито в открытом вольере к стене, на уровне пола. Утром два гамадрила хотели выйти в наружную клетку, но, увидев в ней новый предмет, испугались и убежали. Долго они выглядывали, не решаясь выйти. Привлекаемые блеском нового предмета и ободренные его неподвижностью, они, наконец, медленно вышли в вольер, отвертываясь от зеркала и держась на почтительном расстоянии от него. Повернувшись, чтобы еще раз взглянуть на этот загадочный предмет, они неожиданно увидели свои изображения, но, приняв их за новых товарищей, радостно закричали и побежали сообщить новость другим гамадрилам.

...Все население вольера собралось перед зеркалом. Обезьяны протягивали руки новым товарищам, что-то лепетали и, по-видимому, приглашали их присоединиться к ним.

...Но упорство, проявленное новыми товарищами, не желающими войти в вольер, стало раздражать обезьян, их речь утратила оттенок нежного дружелюбия, а на лицах появились гримасы. Новые земляки из зеркала продолжали молчать, отвечали такими же гримасами и кривляниями, что еще более раздражало обезьян.

...Несколько раз работница приносила гамадрилам пищу, но они не обращали на нее никакого внимания и не отходили от зеркала. Наконец принесли лакомое блюдо — гоголь-моголь, и проголодавшиеся обезьяны пошли на зов работницы. Но, отойдя несколько шагов от зеркала и повернувшись к нему, они вдруг заметили, что и новые товарищи уходят! Боязнь потерять их была так велика, что обезьяны отказались от гоголь-моголя и снова начали исследовать зеркало. Убедившись, что оно не является открытой дверью, через

которую можно войти, гамадрилы попробовали заглянуть за него, пытались оторвать его от стены, но все усилия их остались тщетными и тайна появления новых знакомых осталась неразгаданной.

...Поздно вечером вконец измученные бесплодными усилиями и голодовкой обезьяны ушли на ночевку, а с наступлением утра снова все сели вокруг зеркала. Упорство и постоянство, с которыми они возвращались к нему каждое утро, пытаясь разрешить тайну появления новых товарищей, были поразительны. Обезьяны перестали нормально питаться и целые дни сидели около зеркала. Через неделю зеркало пришлось убрать, и жизнь вольтера вошла в свою колею"

Кого мы видим, глядя в зеркало?

“Разумеется, самих себя, — ответят многие, — наше изображение в зеркале есть точнейшая копия нас самих, сходная с нами во всех подробностях”.

Не угодно ли, однако, убедиться в этом сходстве? У вас на правой щеке родинка — у вашего двойника правая щека чиста, но на левой щеке есть пятнышко, которого у вас на этой щеке не имеется. Вы зачесываете волосы *направо* — ваш двойник зачесывает их *налево*. У вас правая бровь выше и гуще левой; у него, напротив, эта бровь ниже и реже, нежели левая. Вы носите часы в правом кармане жилета, а записную книжку в левом кармане пиджака; ваш зеркальный двойник имеет иные привычки: его записная книжка хранится в правом кармане пиджака, часы — в левом жилетном. Обратите внимание на циферблат часов (рис. 98). У вас таких часов никогда не бывало: расположение и начертание цифр на них необычайное; например, цифра восемь изображена так, как ее нигде не изображают — *ИХ* и помещена на месте двенадцати; двенадцати же нет совсем; после шести следует пять и т.д.; кроме того, движение стрелок на часах вашего двойника обратно обычному.

Наконец, у вашего зеркального двойника есть одна особенность: он левша. Он пишет, шьет, ест левой рукой, и если вы выразите готовность с ним поздороваться, он протянет вам левую руку.




Рис.98. Такие часы имеет двойник, которого вы видите в зеркале.

Нелегко решить, грамотен ли ваш двойник. Во всяком случае грамотен как-то по-особенному. Едва ли удастся вам прочесть хоть одну строку из той книги, которую он держит, или какое-нибудь слово в тех каракулях, которые он выводит своей левой рукой.

Таков тот человек, который притязает на полное сходство с вами! А вы хотите судить по нему о внешнем виде вас самих..

Шутки в сторону: если вы думаете, что, глядя в зеркало, видите самих себя, — вы заблуждаетесь. Лицо, туловище и одежда у большинства людей не строго симметричны (хотя мы этого обычно не замечаем): правая половина не вполне сходна с левой. В зеркале все особенности правой половины переходят к левой, и наоборот, так что перед нами является фигура, производящая зачастую совсем иное впечатление, чем наша собственная.

Рисование перед зеркалом

Нетождественность зеркального отражения с оригиналом еще заметнее выступает в следующем опыте.

Поставьте перед собой отвесно на стол зеркало, положите перед ним бумажку и попробуйте нарисовать на ней какую-




Рис. 99. Рисование перед зеркалом.

нибудь фигуру, например прямоугольник с диагоналями. Но не смотрите при этом прямо на свою руку, а следите лишь за движениями руки, отраженной в зеркале (рис. 99).

Вы убедитесь, что столь легкая на вид задача почти невыполнима. В течение многих лет наши зрительные впечатления и двигательные ощущения успели прийти в определенное соответствие. Зеркало нарушает эту связь, так как представляет глазам движения нашей руки в искаженном виде. Давнишние привычки будут протестовать против каждого вашего движения: вы хотите провести линию вправо, а рука тянет влево и т. п.

Еще больше неожиданных странностей вы встретите, если вместо простого чертежа попытаетесь рисовать перед зеркалом более сложные фигуры или писать что-нибудь, глядя на строки в зеркале: выйдет комичная путаница!

Те отпечатки, которые получаются на промокательной бумаге, — тоже изображения зеркально симметричные. Рассмотрите надписи, испещряющие вашу промокательную бумагу, и попробуйте прочесть их. Вам не разобрать ни одного слова, даже вполне отчетливые буквы имеют необычный наклон влево, а главное, последовательность штрихов в них не та, к какой вы привыкли. Но приставьте к бумаге зеркало под прямым углом — и вы увидите в нем все буквы написанными так, как вы привыкли их видеть. Зеркало дает симметричное отражение того, что само является симметричным изображением обыкновенного письма.

Расчетливая поспешность

Мы знаем, что в однородной среде свет распространяется прямолинейно, т.е. скорейшим путем. Но свет избирает скорейший путь также и в том случае, когда не идет от одной точки к другой непосредственно, а достигает ее, предварительно отразившись от зеркала.

Проследим за его путем. Пусть буква *A* на рис. 100 обозначает источник света, линия *MN* — зеркало, а линия *ABC* — путь луча от свечи до глаза *C*. Прямая *KB* перпендикулярна к *MN*.

По законам оптики угол отражения 2 равен углу падения 1 . Зная это, легко доказать, что из всех возможных путей от *A* к *C*, с попутным достижением зеркала *MN*, путь *ABC* — самый скорый. Для этого сравним путь луча *ABC* с каким-нибудь другим, например с *ADC* (рис. 101). Опустим пер-




Рис. 100. Угол отражения 2 равен углу падения 1.




Рис. 101. Свет, отражаясь, избирает кратчайший путь.

пендикуляр AE на точки A на MN и продолжим его далее до пересечения с продолжением луча BC в точке F . Соединим также точки F и D . Убедимся прежде всего в равенстве треугольников ABE и FBE . Они — прямоугольные, и у них общий катет EB ; кроме того, углы EFB и EAB равны между собой, так как соответственно равны углам 2 и 1. Следовательно, $AE = FE$. Отсюда вытекает равенство прямоугольных треугольников AED и FED по двум катетам и, следовательно, равенство AD и FD .

Ввиду этого мы можем путь ABC заменить равным ему путем FBC (так как $AB = FB$), а путь ADC — путем FDC . Сравнивая же между собой длины FBC и FDC , видим, что прямая линия FBC короче ломаной FDC . Отсюда путь ABC короче ADC , что и требовалось доказать!

Где бы ни находилась точка D , путь ABC всегда будет короче пути ADC , если только угол отражения равен углу падения. Значит, свет действительно избирает самый короткий и самый скорый путь из всех возможных между источником, зеркалом и глазом. На это обстоятельство впервые указал еще замечательный древнегреческий механик и математик Герон Александрийский.

Задача о горящем стоге

Знание кратчайшего пути в случаях, подобных сейчас рассмотренным, может сослужить нам иногда хорошую службу в практической жизни. Представьте, например, что человек из своего дома (рис. 102) на берегу реки заметил, что стог сена на лугу поодаль загорелся. Захватив ведро, он




Рис. 102. Задача о горящем стоге: найти кратчайший путь до стога.

бежит к реке и, зачерпнув воды, спешит к стогу. Для простоты допустим, что с полным ведром он бежит так же быстро, как с пустым. По какому пути должен он бежать, чтобы поспеть на место пожара возможно скорее?

Легко сообразить, что задача эта совершенно сходна с той, которую мы только что рассмотрели. Поэтому вам нетрудно




Рис. 103. Решение задачи о горящем стоге.

дать правильный ответ: бегущий должен подражать лучу света, т.е. направиться к берегу так, чтобы угол 1 был равен углу 2 (рис. 103). Мы уже видели, что в таком случае путь окажется кратчайшим.

Новое и старое о калейдоскопе

Всем известна хорошая игрушка, носящая название “калейдоскоп” (рис. 104): горсточка пестрых осколков отражается в двух или трех плоских зеркальцах и образует удивительно красивые фигуры, разнообразно меняющиеся при малейшем повороте калейдоскопа. Хотя калейдоскоп




Рис. 104. Калейдоскоп.

довольно общеизвестен, мало кто подозревает, какое огромное число разнообразных фигур можно получить с его помощью. Допустим, вы держите в руках калейдоскоп с 20 стеклышками и 10 раз в минуту поворачиваете его, чтобы получить новое расположение отражающихся стеклышек. Сколько времени понадобится вам, чтобы пересмотреть все получающиеся при этом фигуры?

Самое пылкое воображение не предусмотрит правильного ответа на этот вопрос. Океаны высохнут и горные цепи сотрутся, прежде чем будут исчерпаны все узоры, чудесным образом скрытые внутри

вашей маленькой игрушки, потому что для осуществления всех их понадобится по крайней мере 500 миллиардов лет. Свыше пятисот миллионов тысячелетий нужно вращать наш калейдоскоп, чтобы пересмотреть все его узоры!

Бесконечно разнообразные, вечно меняющиеся узоры калейдоскопа давно интересуют декораторов-художников, фантазия которых не может соперничать с неистощимой изобретательностью этого прибора. Калейдоскоп создает подчас узоры, поразительной красоты, могущие служить прекрасными мотивами для орнаментов на обоях, для узоров на различных тканях и т. п.

Но в широкой публике калейдоскоп не вызывает уже того живого интереса, с каким встречен он был в начале XIX века, когда был еще новинкой. Его воспевали в прозе и стихах.

Калейдоскоп изобретен был в Англии в 1816 г. и через год—полтора проник уже в Россию, где был встречен с восхищением. Баснописец А. Измайлов в журнале “Благо-

намеренный” (июль 1818 г.) писал о калейдоскопе в следующих выражениях:

“Прочитав объявление о калейдоскопе, достаю сие чудесное орудие —

Смотрю — и что ж в моих глазах?
В фигурах разных и звездах
Сапфиры, яхонты, топазы,
И изумруды, и алмазы,
И аметисты, и жемчуг,
И перламутр — все вижу вдруг!
Лишь сделаю рукой движение —
И новое в глазах явление!

Не только в стихах, но и в прозе невозможно описать того, что видишь в калейдоскопе. Фигуры переменяются при каждом движении руки и одна на другую не походят. Какие прелестные узоры! Ах, если бы можно было вышивать их на канве! Но где взять такие яркие шелка? Вот самое приятное занятие от безделья и от скуки. Гораздо лучше смотреть в калейдоскоп, нежели раскладывать гранпасьянс.

Утверждают, будто калейдоскоп известен был еще в XVII столетии. Ныне недавно он возобновлен и усовершенствован в Англии, оттуда месяца два назад перешел во Францию. Один из наших богачей заказал калейдоскоп в 20 000 франков. Вместо разноцветных стеклышек и бус велел он положить жемчуг и драгоценные камни”.

Далее баснописец рассказывает забавный анекдот о калейдоскопе и, наконец, заключает статью меланхолическим замечанием, чрезвычайно характерным для эпохи крепостничества и отсталости:

“Известный своими превосходными оптическими инструментами императорский физико-механик Роспини делает и продает калейдоскопы по 20 руб. Без сомнения, гораздо более найдется на них охотников, нежели на физические и химические лекции, от которых — к сожалению и удивлению — благонамеренный господин Роспини не получил никакой себе выгоды”.

Долго калейдоскоп оставался не более чем любопытной игрушкой и только в наши дни получил полезное применение для составления узоров. Изобретен прибор, с помощью которого можно фотографировать эти узоры и, таким образом, механически придумывать всевозможные орнаменты.

Дворцы иллюзий и миражей

Какие ощущения испытали бы мы, если бы, уменьшенные до размеров стеклянного осколка, очутились внутри калейдоскопа? Существует способ выполнить такой опыт на




Рис. 105. Трехкратное отражение стен центрального зала дает 36 залов.

деле. Эту чудесную возможность имели в 1900 г. посетители Всемирной Парижской выставки, где большим успехом пользовался так называемый “Дворец иллюзий” — нечто вроде калейдоскопа, но только неподвижного. Вообразите шестиугольный зал, каждая стена которого представляет собой огромное зеркало идеальной полировки. В углах зеркального вала устроены архитектурные украшения в виде колонн и карнизов, сливающихся с лепкой потолка. Зритель внутри такого зала видел себя словно

затерянным в невообразимой толпе похожих на него людей в бесконечной анфиладе залов и колонн; они окружали его со всех сторон и простирались вдаль, насколько видел глаз.

Залы, заштрихованные на рис. 105 горизонтально, получают вследствие однократного отражения; в результате двукратного отражения получают изображения, заштрихованные перпендикулярно к первым, т.е. еще 12 залов. Трехкратное отражение присоединяет к ним еще 18 залов (косая штриховка). Залы множатся с каждым отражением, и общее число их зависит от совершенства полировки и от параллельности зеркал, занимающих противоположные грани призматического зала. Практически различались еще залы, получавшиеся в результате двенадцатикратного отражения, т.е. взор посетителя охватывал 468 залов.

Причина “чуда” ясна всякому, кто знаком с законами отражения света: ведь тут имеются три пары параллельных зеркал и десять пар зеркал, поставленных под углом;

неудивительно, что они дают такое множество отражений. Еще любопытнее оптические эффекты, которые были достигнуты на Парижской выставке в так называемом “Дворце миражей”. Устроители этого “дворца” присоединили к бесчисленным отражениям еще мгновенную перемену всей картины. Они как бы устроили подвижный, огромных размеров калейдоскоп, внутри которого помещались зрители.

Перемена обстановки во “Дворце миражей” достигалась следующим образом: зеркальные стены на некотором расстоянии от ребер разрезаны вдоль, и полученный угол может вращаться вокруг оси, заменяясь другим. Из рис. 106 видно, что можно произвести три замены, соответствующие углам 1, 2 и 3. Теперь представьте себе, что все углы, обозначенные цифрой 1, заключают в себе обстановку тропического леса, все углы 2 — обстановку арабского зала, а углы 3 — индийского храма (рис. 107). Одним движением скрытого механизма, поворачивающего углы, тропический лес превращается в храм или в арабский зал. Весь секрет “волшебства” основан на таком простом




Рис. 106. Зеркальный зал “Дворца миражей”.




Рис. 107. Секрет “Дворца миражей”.

физическом явлении, как отражение световых лучей.

На том же эффекте отражения в параллельных зеркалах основано и старинное гадание с зеркалами. Гадающий видит перед собой уходящий вдаль ряд отражений свеч, которые помещены между двумя зеркалами. Жуткое впечатление, производимое этими бесконечными рядами свеч на суеверно настроенного человека, прекрасно передано Фетом:

Зеркало в зеркало с трепетным светом
Я при свечах навела,
В два ряда свет — и таинственным трепетом
Чудно горят зеркала...
Страшно припомнить душой оробелою:
Там за спиной нет огня...

Не удивительно, что некогда этим свойством зеркал пользовалась, говорят, инквизиция: для терзания своих жертв она изобрела особую “пытку зеркалами” ².

Почему и как преломляется свет?

То, что при переходе из одной среды в другую луч света преломляется, многим представляется странным капризом природы. Кажется непонятным, почему свет не сохраняет в новой среде первоначального своего направления, а избирает ломаный путь. Кто так думает, тот, вероятно, с удовлетворением узнает, что луч света претерпевает, в сущности, то же самое, что происходит и с марширующей колонной бойцов, пересекающей границу между почвой, удобной для ходьбы, и почвой неудобной. Вот что писал об этом физик прошлого века Д. Гершель:

“Представьте себе отряд солдат, идущий по местности, разделенной прямой границей на две полосы, из которых одна гладкая, ровная и удобная для ходьбы, другая — кочковатая, затруднительная, так что ходьба по ней не может совершаться столь быстро. Предположим сверх того, что фронт отряда составляет угол с пограничной линией между двумя полосами, так что солдаты достигают этой границы не все одновременно, а последовательно один за другим. Тогда каждый солдат, переступив границу, очутится на почве, по которой он не может более подвигаться так быстро, как до того времени. Он не сможет уже держаться на одной линии с остальной частью шеренги, еще находящейся на лучшей почве, и будет от нее отставать с каждой секундой все больше. Так как каждый солдат, достигая границы, испытывает одинаковое затруднение в ходьбе, то, если солдаты не нарушат строя, не рассеются, а будут продолжать маршировать правильной колонной, вся та часть колонны, которая переступила границу, будет неизбежно отставать от остальной и составит с ней поэтому тупой угол в точке

пересечения границы. И так как необходимость ходить в ногу, не перебивая дороги друг другу, заставит каждого солдата шагать прямо перед собой, под прямым углом к новому фронту, то путь, который он пройдет по переходе границы, будет, во-первых, перпендикулярен к новому фронту, а во-вторых, так относиться к тому пути, какой был пройден в случае отсутствия замедления, как новая скорость к прежней”.

Вы можете воспроизвести наглядное подобие преломления света у себя на столе. Накройте половину стола скатертью (рис. 108) и, слегка наклонив стол, заставьте скатываться по нему пару колесиков, наглухо посаженных на общую ось (например, от сломанного детского паровоза или другой игрушки). Если направление движения колес и край скатерти составляют прямой угол, преломления пути не происходит. Вы имеете в этом случае иллюстрацию оптического правила: луч, перпендикулярный к плоскости раздела сред, не преломляется. При направлении, наклонном к краю скатерти, путь колес изламывается на этом краю, т.е. на границе между средами с различной скоростью движения в них. Легко заметить, что при переходе из части стола, где скорость движения больше (непокрытая часть), в ту часть, где скорость меньше (скатерть), направление пути (“луч”) приближается к “перпендикуляру падения”. В обратном случае наблюдается удаление от этого перпендикуляра.




Рис. 108. Опыт, поясняющий преломление света.

Из этого можно, между прочим, почерпнуть важное указание, вскрывающее сущность рассматриваемого явления, а именно, что преломление обусловлено различием скорости света в обеих средах. Чем больше различие в скорости, тем значительнее преломление; так называемый “показатель преломления”, характеризующий величину излома лучей, есть не что иное, как отношение этих скоростей. Когда вы читаете, что показатель преломления при переходе из воздуха в воду есть $4/3$, то вы вместе с тем узнаете, что свет движется в воздухе примерно в 1,3 раза быстрее, чем в воде.

А в связи с этим находится и другая поучительная особенность распространения света. Если в случае отражения световой луч следует *кратчайшим путем*, то в случае пре-

ломления он избирает *скорейший путь*: никакое другое направление не приводит луч так скоро к “месту назначения”, как этот изломанный путь.

Когда длинный путь проходится быстрее, чем короткий?

Но неужели ломаный путь может быстрее привести к цели, чем прямой? Да, в тех случаях, когда скорость движения в различных частях пути различна. Вспомните, что приходится делать жителям деревни, расположенной между двумя железнодорожными станциями в соседстве с одной из них. Чтобы попасть скорее на дальнюю станцию, они едут на лошади сначала в *обратном* направлении, к ближайшей станции, там садятся в поезд и едут на место назначения. Им *короче* было бы, разумеется, прямо ехать туда на лошади, но они предпочитают более длинный путь на лошади и в вагоне, потому что такой путь приводит к цели *быстрее*.




Рис. 109. Задача о кавалеристе: найти скорейший путь из A в C .




Рис. 110. Решение задачи о кавалеристе: скорейший путь AMC .

Уделим минуту внимания еще одному примеру. Кавалерист должен прибыть с донесением из точки A к палатке командира в точке C (рис. 109). Его отделяют от палатки полоса глубокого песка и полоса луга, разграниченные между собой прямой линией EF . По песчаной почве лошадь движется *вдвое медленнее*, чем по лугу. Какой же путь должен выбрать кавалерист, чтобы достигнуть палатки в кратчайшее время?

На первый взгляд кажется, что самый скорый путь — прямая линия, проведенная от A до C . Но это совершенно ошибочно, и я не думаю, чтобы нашелся кавалерист, который выбрал бы такой путь. Медленное движение по песку наведет его на правильную мысль сократить эту медленную часть пути, прорезав песчаную полосу по менее косой

линии; конечно, тем самым удлинится вторая часть пути — по лугу; но так как по лугу можно двигаться вдвое быстрее, то удлинение пути не перевесит полученной выгоды, и в общем итоге путь будет проделан в меньший промежуток времени. Другими словами, путь кавалериста должен *преломиться* на границе двух полос почвы, и притом так, чтобы путь по лугу составлял с перпендикуляром к границе больший угол, чем путь по песчаной почве.

Кто знаком с геометрией, именно с теоремой Пифагора, тот может проверить, что прямой путь AC действительно не является путем скорейшим и что при тех размерах для ширины полос и расстояний, которые мы здесь имеем в виду, можно скорее достичь цели, если направиться, например, по ломаной AEC (рис. 110).

На рис. 109 указано, что ширина песчаной полосы 2 км, луговой — 3 км, а расстояние BC — 7 км. Тогда вся длина AC (рис. 110) равна, по теореме Пифагора, $\sqrt{5^2 + 7^2} = \sqrt{74} = 8,60$ км. Часть AN — путь по песку — этого отрезка составляет, как легко сообразить, $2/5$ этой величины, т.е. 3,44 км. Так как по песку движение происходит вдвое медленнее, чем по лугу, то 3,44 км песчаного пути равнозначны, в смысле требуемого времени, 6,88 км по лугу. И, следовательно, весь смешанный путь по прямой AC , равный 8,60 км, соответствует 12,04 км пути по лугу.

Сделаем такое же “приведение к лугу” и для ломаного пути AEC . Часть $AE = 2$ км и соответствует 4 км пути по лугу. Часть $EC = \sqrt{3^2 + 7^2} = \sqrt{58} = 7,61$ км. Итого: весь ломаный путь AEC отвечает $4 + 7,61 = 11,61$ км.

Итак, “короткий” прямой путь соответствует 12,04 км движения по лугу, а “длинный” ломаный — всего только 11,61 км по той же почве. “Длинный” путь, как видите, дает выгоду в $12,04 - 11,61 = 0,43$ км — почти в полкилометра!

Но мы не указали еще *самого* быстрого пути. Быстрейший путь, как учит теория, будет тот, при котором (нам придется обратиться к услугам тригонометрии) синус угла β относится к синусу угла α , как скорость на лугу относится к скорости на песке, т.е. как 2 : 1. Другими словами, нужно выбрать направление так, чтобы $\sin \beta$ был вдвое больше $\sin \alpha$ (рис. 111). Для этого нужно перешагнуть границу между полосами в такой точке M , которая находится в одном километре от E . Действительно, тогда

$$\sin \beta = \frac{6}{\sqrt{3^2 + 6^2}}, \quad \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + 2^2}},$$

отношение

$$\frac{\sin \beta}{\sin \alpha} = \frac{6}{\sqrt{45}} : \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{6}{3\sqrt{5}} : \frac{1}{\sqrt{5}} = 2,$$

т.е. как раз отношению скоростей.

А какова будет в таком случае “приведенная к лугу” длина пути? Вычислим: $AM = \sqrt{2^2 + 1^2}$, что отвечает 4,47 км пути по лугу; $MC = \sqrt{45} = 6,71$ км. Длина всего пути $4,47 + 6,71 = 11,18$ км, т.е. на 860 м *короче* прямолинейного пути, который, как мы уже знаем, соответствует 12,04 км.

Вы видите, какие выгоды доставляет при данных условиях изламывание пути. Световой луч как раз избирает такой скорейший путь, потому что закон преломления света строго удовлетворяет требованию математического решения задачи: синус угла преломления относится к синусу угла падения, как скорость света в новой среде к скорости его в покидаемой среде; с другой стороны, это отношение равно относительному показателю преломления света для указанных сред.




Рис. 111. Что такое синус? Отношение m к радиусу есть синус угла β , отношение n к радиусу — синус угла α .

Объединяя в одно правило особенности и отражения, и преломления, мы можем сказать, что свет во *всех* случаях следует по *быстрейшему* пути, т.е. подчиняется правилу, которое физики называют “принципом кратчайшего оптического пути” или “принципом минимального времени распространения” (принцип Ферма).

Если среда неоднородна и ее преломляющая способность меняется постепенно, как, например, в нашей атмосфере, то и в таком случае выполняется принцип минимального времени распространения. Этим объясняется то не-

большое искривление лучей небесных светил в атмосфере, которое на языке астрономов называется “атмосферной рефракцией”. В атмосфере, постепенно уплотняющейся книзу, луч света изгибается так, что вогнутость его обращена к Земле. Тогда луч остается дольше в высоких слоях, которые слабее замедляют его путь, и проводит меньше времени в “медленных” низких слоях, в итоге он приходит к цели быстрее, чем по пути строго прямолинейному.

Принцип Ферма справедлив не для одних лишь световых явлений: ему в полной мере подчиняется также распространение звука и вообще всех волновых движений, какова бы ни была природа этих волн.

Читатель, без сомнения, желал бы узнать, чем объясняется это свойство волн. Приведу поэтому относящиеся сюда соображения, высказанные выдающимся физиком Шредингером*. Он исходит из знакомого уже нам примера марширующих солдат и имеет в виду случай движения светового луча в среде с постепенно изменяющейся плотностью:

“Пусть для того, чтобы сохранить строгую правильность фронта, солдаты соединены длинным шеем который каждый из них крепко удерживает в руках. Команда гласит: всем бежать возможно быстрее! Если характер почвы медленно меняется от точки к точке, то сначала, скажем, правое, а позднее левое крыло фронта будет подвигаться быстрее — и поворот фронта осуществится сам собой. Мы заметим при этом, что пройденный путь — не прямолинейный, а искривленный. То, что путь этот строго совпадает с кратчайшим в смысле времени прибытия в данный пункт при заданных свойствах почвы, — довольно понятно, так как ведь каждый солдат старался подвигаться как можно быстрее”.

Новые робинзоны

Без сомнения, вы знаете, как герои романа Жюль Верна “Таинственный остров”, заброшенные на необитаемую землю, добыли огонь без спичек и огня. Робинзону явилась на помощь молния, зажегшая дерево, новым же робинзонам Жюль Верна помогла не случайность, а находчивость сведущего инженера и твердое знание им законов физики. Помните, как удивился наивный моряк Пенкроф, когда, возвратившись с охоты, нашел инженера и журналиста перед пылающим костром.

— Но кто же зажег огонь? — спросил моряк.

— Солнце, — ответил Спилетт.

Журналист не шутил. Действительно, Солнце доставило огонь, которым так восторгался моряк. Он не верил своим глазам и был до того изумлен, что даже не мог расспрашивать инженера.

— Значит, у вас было зажигательное стекло? — спросил инженера Герберт.

* В докладе, прочитанном в Стокгольме при получении Нобелевской премии (в 1933 г.).

— Нет, но я его изготовил.

И он его показал. Это были просто два стекла, снятые инженером со своих часов и часов Спилетта. Он соединил их края глиной, предварительно наполнив водой, и таким образом получилась настоящая зажигательная чечевица, с помощью которой, сосредоточив солнечные лучи на сухом мхе, инженер добыл огонь".

Читатель пожелает, я думаю, узнать, зачем нужно заполнять водой пространство между часовыми стеклами: разве наполненная воздухом двояковыпуклая чечевица не сосредоточивает лучей?

Именно нет. Часовое стекло ограничено двумя параллельными (концентрическими) поверхностями — наружной и внутренней; а известно из физики, что, проходя через тонкий прозрачный слой, ограниченный такими поверхностями, лучи почти не изменяют своего направления. Проходя затем через второе такое же стекло, они и здесь почти не отклоняются, а следовательно, не собираются в фокусе. Чтобы сосредоточить лучи в одной точке, необходимо заполнить пространство между стеклами каким-нибудь прозрачным веществом, которое преломляло бы лучи сильнее, нежели воздух. Так и поступил инженер в романе Жюль Верна.

Обыкновенный графин с водой, если имеет шарообразную форму, также может служить зажигательной чечевицей. Это знали уже древние, которые заметили и то, что сама вода при этом остается холодной. Случалось даже, что стоящий на открытом окне графин с водой зажигал занавески, скатерть, обугливал стол. Те огромные шаровые бутылки с окрашенной водой, которые, по старинному обычаю, украшали раньше витрины аптек, могли быть иногда причиной настоящих катастроф, вызывая возгорание легко воспламеняющихся веществ, расположенных поблизости.

Небольшой круглой колбой, наполненной водой, можно даже при небольших размерах колбы довести до кипения воду, налитую на часовое стеклышко: для этого достаточно колба сантиметров в 12 диаметром*. Зажечь папироску с помощью колбы с водой так же легко, как и стеклянной чечевицей, о которой еще Ломоносов в своем стихотворении "О пользе стекла" писал:

Мы пламень солнечный стеклом здесь получаем
И Прометею тем безбедно подражаем.

* Фокус колбы с водой помещается при этом весьма близко к колбе.

Ругаясь подлости нескладных оных врак,
Небесным без греха огнем курим табак.

Следует заметить, однако, что зажигательное действие водяных линз значительно слабее, чем стеклянных. Это связано, во-первых, с тем, что преломление света в воде гораздо меньше, чем в стекле, во-вторых, вода в сильной степени поглощает инфракрасные лучи, которые играют большую роль в нагревании тел.

Любопытно, что зажигательное действие стеклянных чечевиц известно было еще древним грекам, более чем за тысячелетие до изобретения очков и зрительных труб. О нем упоминает Аристофан в знаменитой комедии “Облака” Сократ предлагает Стрептиаду задачу:

“Если бы кто писал обязательство на тебя в пяти талантах, как бы ты уничтожил оное?”

Стрептиад. Нашел я, как истребить обязательство, да такой способ, что ты и сам признаешь его прехитрым! Видал ты, конечно, в аптеках камень прекрасный, прозрачный, которым зажигают?

Сократ. Зажигательное стекло?

Стрептиад. Точно так.

Сократ. Что же далее?

Стрептиад. Пока нотариус пишет, я, став позади его, направляю лучи Солнца на обязательство, да слова-то все и растоплю...”

Напомню для пояснения, что греки времен Аристофана писали на воощенных дощечках, текст на которых от чрезмерного тепла легко стирался.

Как добыть огонь с помощью льда?

Материалом для двояковыпуклой линзы, а следовательно, и для добывания огня может послужить также лед, если он достаточно прозрачен. При этом лед, преломляя лучи, сам не нагревается и не тает. Показатель преломления льда лишь немногим меньше, чем у воды, и если, как мы видели, можно добыть огонь с помощью шара, наполненного водой, то возможно сделать это и с помощью чечевицы из льда.

Ледяная чечевица сослужила хорошую службу в жюльверновом “Путешествии капитана Гаттераса”. Доктор Клоубонни таким именно образом зажег костер, когда путники потеряли огниво и очутились без огня, при страшном морозе в 48 градусов (рис. 112).

— Это несчастье, — сказал Гаттерас доктору.
 — Да, — отвечал тот.
 — У нас нет даже подзорной трубы, с которой мы могли бы снять чечевицу и добыть огня.
 — Знаю, — ответил доктор, — и очень жаль, что нет: солнечные лучи достаточно сильны, чтобы зажечь трут.
 — Что делать, придется утолить голод сырой медвежатиной, — заметил Гаттерас.



Рис. 112. Доктор сосредоточил лучи Солнца на труте.

— Да, — задумчиво проговорил доктор, — в крайнем случае. Но отчего бы нам не...

— Что вы задумали? — полюбопытствовал Гаттерас.

— Мне пришла в голову мысль...

— Мысль? — воскликнул боцман. — Если вам пришла мысль, значит мы спасены!

— Не знаю, как удастся, — колебался доктор.

— Что же вы придумали? — спросил Гаттерас.

— У нас нет чечевицы, но мы ее изготовим.

— Как? — поинтересовался боцман.

— Отшлифуем из куска льда.

— Неужели вы полагаете...

— Отчего бы и нет? Ведь нужно только, чтобы лучи Солнца были сведены в одну точку, а для этой цели лед может заменить нам лучший хрусталь. Только я предпочел

бы кусочек пресноводного льда: он крепче и прозрачнее.

— Вот, если не ошибаюсь, эта ледяная глыба, — указал боцман на ледяную глыбу в ста от путешественников, — судя по ее цвету, есть как раз то, что вам надо.

— Вы правы. Возьмите-ка свой топор. Пойдемте, друзья мои.

Все трое направились к указанной ледяной глыбе. Действительно, лед оказался пресноводным.

Доктор велел отрубить кусок льда, имеющий фут в диаметре, и начал обравнивать его топором. Потом отделал его ножом, наконец постепенно отшлифовал рукой. Получилась прозрачная чечевица, словно из лучшего хрусталя. Солнце было довольно яркое. Доктор подставил чечевицу его лучам и сосредоточил их на труте. Через несколько секунд трут загорелся".

Рассказ Жюль Верна не совсем фантастичен: опыты зажигания дерева при помощи ледяной чечевицы, впервые успешно выполненные в Англии с весьма большой чечевицей еще в 1763 г., с тех пор неоднократно производились с полным успехом. Конечно, трудно изготовить *прозрачную* ледяную чечевицу с помощью таких орудий, как топор, нож и “просто рука” (при 48-градусном морозе!), но можно изготовить ледяную чечевицу проще: налить воды в чашку надлежащей формы и заморозить, а затем, слегка подогрев чашку, вынуть из нее готовую чечевицу (рис. 113).




Рис. 113. Чашка для изготовления ледяной чечевицы.

Проделявая подобный опыт, не забывайте, что он удастся лишь в ясный морозный день и на открытом воздухе, но не в комнате за оконным стеклом: стекло поглощает часть энергии солнечных лучей, и остающейся недостаточно, чтобы вызвать значительное нагревание.

С помощью солнечных лучей

Прodelайте еще один опыт, тоже легко выполнимый в зимнее время. Положите на снег, заливаемый солнечным светом, два одинаковой величины лоскутка ткани, светлый и черный. Через час или два вы убедитесь, что черный лоскуток погрузился в снег, между тем как светлый остался на прежнем уровне. Доискаться причины подобного различия нетрудно: под черным лоскутком снег тает сильнее, так как темная ткань поглощает большую часть падающих на нее солнечных лучей; светлая же, напротив, большую часть их рассеивает и потому слабее нагревается, нежели черная.

Этот поучительный опыт впервые был проделан знаменитым борцом за независимость Соединенных Штатов Веньямином Франклином, обессмертившим себя, как физик, изобретением громоотвода.

“Я взял у портного несколько квадратных кусочков сукна различных цветов, — писал он. — Между ними были: черный, темно-синий, светло-синий, зеленый, пурпуровый, красный белый и

различные другие цвета и оттенки. В одно светлое солнечное утро я положил все эти куски на снег. Через несколько часов черный кусок, нагретый сильнее других, погрузился так глубоко, что лучи Солнца более его не достигали; темно-синий погрузился почти настолько же, как и черный; светло-синий — гораздо менее; куски остальных цветов опустились тем менее, чем они светлее. Белый же остался на поверхности, т.е. вовсе не опустился.

... К чему годна была бы теория, если бы из нее нельзя было извлечь никакой пользы? — восклицает он по этому поводу и продолжает:

— Разве не можем мы из этого опыта вывести то, что черное платье в теплом солнечном климате менее годно, чем белое, так как оно на Солнце сильнее нагревает наше тело, и если мы при этом еще будем делать движения, которые сами по себе нас согревают, то образуется излишняя теплота? Не должны ли мужские и женские летние шляпы быть белого цвета, чтобы устранить ту жару, которая вызывает у некоторых солнечный удар?... Далее, вычерненные стены не могут разве поглотить в течение дня столько солнечной теплоты, чтобы ночью остаться до некоторой степени теплыми и предохранять фрукты от мороза? Не может разве внимательный наблюдатель натолкнуться еще и на другие частности большей или меньшей важности?"

Каковы могут быть эти выводы и полезные применения, показывает пример немецкой южнополярной экспедиции 1903 г. на корабле "Гаусс". Судно вмерзло в лед, и все обычные способы освобождения не привели ни к каким результатам. Взрывчатые вещества и пилы, пущенные в дело, удалили всего несколько сотен кубометров льда и не освободили корабля. Тогда обратились к помощи солнечных лучей: из темной золы и угля устроили на льду полосу в 2 км длиной и в 10 м шириной; она вела от корабля до ближайшей широкой щели во льду. Стояли ясные долгие дни полярного лета, и солнечные лучи сделали то, чего не могли сделать динамит и пила. Лед, подтаяв, сломался вдоль насыпанной полосы, и корабль освободился от льда.

Старое и новое о миражах

Вероятно, всем известно, в чем заключается физическая причина обыкновенного миража. Нагретый слой воздуха, прилегающий к раскаленному песку пустыни, приобретает зеркальные свойства оттого, что этот слой воздуха имеет меньшую плотность, нежели вышележащие слои. Наклонный луч света от весьма далекого предмета, достигнув этого воздушного слоя, искривляет в нем свой путь так, что в дальнейшем следовании он вновь удаляется от земли и попадает в глаз наблюдателя, словно отразившись от зеркала

под очень большим углом падения. И наблюдателю кажется, что перед ним расстилается в пустыне водная гладь, отражающая прибрежные предметы (рис. 114).




Рис. 114. Как возникает мираж в пустыне. Путь светового луча представлен на рисунке наклоненным к земле преувеличенно круто.

Правильнее было бы, впрочем, сказать, что нагретый слой воздуха близ раскаленной почвы отражает лучи не наподобие зеркала, а наподобие водной поверхности, рассматриваемой из глубины воды. Здесь происходит не простое отражение, а то, что на языке физики называется “внутренним отражением”. Для этого необходимо, чтобы луч света вступал в воздушные слои очень полого — более полого, чем показано на нашем упрощенном рис. 114; иначе не будет превзойден “предельный угол” падения луча, а без этого не получается внутреннего отражения.

Отметим попутно один пункт этой теории, могущий породить недоразумение. Изложенное объяснение требует такого расположения воздушных слоев, при котором более плотные слои находились бы выше, чем менее плотные. Мы знаем, однако, что плотный, тяжелый воздух стремится опуститься и вытеснить лежащий под ним легкий слой газа вверх. Как же может существовать то расположение слоев плотного и разреженного воздуха, которое необходимо для появления миража?

Разгадка кроется в том, что требуемое расположение воздушных слоев бывает не в неподвижном воздухе, а в воздухе, находящемся в движении. Нагретый почвой слой

воздуха не покоится над ней, а непрерывно вытесняется вверх и тотчас сменяется новым слоем нагретого воздуха. Непрерывная смена обуславливает то, что к раскаленному песку всегда прилегает некоторый слой разреженного воздуха, пусть не одного и того же, но это уже безразлично для хода лучей.




Рис. 115. Мираж на асфальтированном шоссе.




Рис. 116. План форта, где наблюдался мираж. Стена F казалась зеркальной из точки A , стена F' — из точки A'

Мираж, который мы рассматриваем, известен с древности. В метеорологии его называют “нижним” миражом (в отличие от “верхнего”, порождаемого отражением лучей света слоями разреженного воздуха верхних областей атмосферы). Большинство людей убеждено, что этот классический мираж может наблюдаться только в знойном воздухе южных пустынь и никогда не бывает в более северных широтах. Между тем нижний мираж случается наблюдать и в наших краях. Особенно часты подобные явления в летнее время на асфальтированных дорогах, которые благодаря темному цвету сильно нагреваются на солнце. Матовая поверхность дороги кажется тогда издали словно политой водой и отражает отдаленные предметы. Ход лучей света при этом мираже показан на рис. 115.

При некоторой наблюдательности подобные явления можно видеть не так редко, как принято думать.

Есть и еще род миража — мираж *боковой*, о существовании которого обычно даже не подозревают. Это — отражение от нагретой отвесной стены. Такой случай описан одним французским автором. Приближаясь к форту крепости, он заметил, что ровная бетонная стена форта вдруг заблистала, как зеркало, отражая в себе окружающий ландшафт, почву, небо. Сделав еще несколько шагов, он заметил ту же перемену и с другой стеной форта. Казалось, будто серая неровная поверхность внезапно заменяется полированной. Стоял знойный день, и стены должны были сильно накалиться, в чем и заключалась разгадка их зеркальности. На рис. 116 показаны расположение стен форта (F и F') и местоположение наблюдателя (A и A'). Оказалось, что мираж наблюдается всякий раз, когда стена достаточно нагреется солнечными лучами. Удалось даже сфотографировать это явление.

На рис. 117 изображена стена F форта, сначала матовая (снята из точки A), а затем блестящая, как зеркало (снята из точки A'). Слева — обыкновенный серый бетон, в котором, конечно, не могут отражаться стоящие близ стены




Рис. 117 Серая неровная стена (слева) внезапно делается словно полированной, отражающей (справа).

фигуры двух солдат. Справа — та же стена в большей своей части приобрела зеркальные свойства, и ближайшая фигура солдата дает в ней свое симметричное изображение. Конечно, отражает лучи тут не сама поверхность стены, а лишь прилегающий к ней слой нагретого воздуха.

В знойные летние дни следовало бы обращать внимание на накалившиеся стены больших зданий и искать, не обнаружатся ли явления миража. Без сомнения, при внимательном наблюдении число различных видов миража должно заметно увеличиться.

Зеленый луч

“Наблюдали ли вы когда-нибудь Солнце, заходящее за горизонт моря? Да, без сомнения. Проследили ли вы за ним до того момента, когда верхний край диска соприкасается с линией горизонта и затем исчезает? Вероятно, да. Но заметили ли вы явление, происходящее в то мгновение, когда лучезарное светило бросает последний свой луч, если при этом небо свободно от облаков и совершенно прозрачно. Быть может, нет. Не пропускайте же случая сделать подобное наблюдение: в ваш глаз ударит не красный луч, а зеленый, дивного зеленого цвета, такого, какого ни один художник не может получить на своей палитре и какого не воспроизводит сама природа ни в разнообразных оттенках растительности, ни в цвете самого прозрачного моря.”

Подобная заметка в одной английской газете привела в восторженное состояние молодую героиню романа Жюль Верна “Зеленый луч” и побудила ее предпринять ряд путешествий с единственной целью — собственными глазами увидеть зеленый луч. Юной шотландке не удалось, как повествует романист, наблюдать это красивое явление природы. Но оно все же существует. Зеленый луч — не легенда, хотя с ним и связано много легендарного. Это — явление, которым может восхищаться каждый любитель природы, если будет искать его с должным терпением.

Почему появляется зеленый луч?

Вы поймете причину явления, если вспомните, в каком виде представляются нам предметы, когда мы смотрим на них сквозь стеклянную призму. Прodelайте такой опыт: держите призму у глаза горизонтально широкой стороной вниз и рассматривайте через нее листок бумаги, приколотый на стене. Вы заметите, что листок, во-первых, поднялся значительно выше своего истинного положения, а во-вторых, имеет сверху фиолетово-синюю каемку, внизу — желто-красную. Поднятие зависит от преломления света, цветные каемки — от *дисперсии* стекла, т.е. свойства стекла *неодинаково* преломлять лучи разного цвета. Фиолетовые и

синие лучи преломляются сильнее прочих, поэтому мы видим вверху фиолетово-синюю каемку; красные преломляются всего слабее, и потому нижний край нашего бумажного листка имеет красную каемку.

Для лучшего понимания дальнейшего необходимо остановиться на происхождении этих цветных каемок. Призма разлагает белый свет, исходящий от бумаги, на все цвета спектра, давая множество цветных изображений бумажного листка, расположенных (частью налагаясь одно на другое) в порядке преломляемости. От одновременного действия этих наложенных друг на друга цветных изображений глаз получает ощущение белого цвета (сложение спектральных цветов), но вверху и внизу выступают каемки несмешивающихся цветов. Знаменитый поэт Гете, проделавший этот опыт и не понявший его смысла, вообразил, что он разоблачил таким образом ложность учения Ньютона о цветах, и написал затем собственную “Науку о цветах”, которая почти всецело основана на превратных представлениях. Читатель, надо полагать, не повторит заблуждения великого поэта и не будет ожидать, что призма перекрасит для него все предметы.

Земная атмосфера является для наших глаз как бы огромной воздушной призмой, обращенной основанием вниз. Глядя на Солнце у горизонта, мы смотрим на него сквозь газовую призму. Диск Солнца получает вверху каемку синего и зеленого цвета, внизу — желто-красную. Пока Солнце стоит выше горизонта, свет диска своей яркостью перебивает гораздо менее яркие цветные полосы, и мы их не замечаем вовсе. Но в моменты восхода и захода Солнца, когда почти весь его диск скрыт под горизонтом, мы можем видеть синюю каемку верхнего края. Она двухцветная: выше расположена синяя полоска, ниже — голубая, от смешения синих и зеленых лучей. Когда воздух близ горизонта совершенно чист и прозрачен, мы видим синюю каемку — “синий луч”. Но чаще синие лучи рассеиваются атмосферой и остается одна зеленая каемка — “зеленый луч”. Наконец, в большинстве случаев рассеиваются мутной атмосферой также синие и зеленые лучи — тогда не замечается никакой каемки: Солнце закатывается багровым шаром.

Пулковский астроном Г. А. Тихов, посвятивший зеленому лучу специальное исследование, сообщает некоторые приметы видимости этого явления:

“Если Солнце имеет при закате красный цвет и на него легко смотреть простым глазом, то можно с уверенностью сказать, что зеленого луча не будет. (Причина понятна: красный цвет солнечного диска указывает на сильное рассеяние атмосферой синих и зеленых лучей, т.е. всей верхней каймы диска. — *Я. П.*)... Наоборот, если Солнце мало изменило свой обычный беловато-желтый цвет и заходит очень ярким (т.е. если поглощение света атмосферой невелико. — *Я. П.*), то можно с большой вероятностью ожидать зеленого луча. Но тут как раз важно, чтобы горизонт представлял резкую линию, без всяких неровностей, близкого леса, построек и т. п. Эти условия всего лучше выполняются на море; вот почему зеленый луч так хорошо известен морякам”

Итак, чтобы увидеть зеленый луч, нужно наблюдать Солнце в момент заката или восхода при очень чистом небе. В южных странах небо у горизонта прозрачнее, чем у нас, поэтому явление зеленого луча наблюдается там чаще. Но и у нас оно не так редко, как думают многие, вероятно под влиянием романа Жюль Верна. Настойчивые поиски зеленого луча рано или поздно вознаграждаются успехом. Случалось улавливать это красивое явление даже в зрительную трубу. Два эльзасских астронома так описывают подобное наблюдение:

“... В последнюю минуту, предшествующую заходу Солнца, когда, следовательно, еще видна заметная часть его, диск, имеющий волнообразную движущуюся, но резко очерченную границу, окружен зеленым ободком. Пока Солнце не зашло окончательно, этот ободок не виден простым глазом. Он становится виден лишь в момент полного исчезновения Солнца за горизонтом. Если же смотреть в зрительную трубу с достаточно сильным увеличением (примерно в 100 раз), можно проследить подробно все явления: зеленая кайма становится заметной самое позднее за 10 минут до захода Солнца; она ограничивает верхнюю часть диска, тогда как от нижней наблюдается красная кайма. Ширина каймы, вначале очень малая (всего несколько секунд дуги), возрастает по мере захождения Солнца; она достигает иногда до полуминутой дуги. Над зеленым ободком часто наблюдаются зеленые же выступы, которые при постепенном исчезновении Солнца как бы скользят по его краю до высшей точки; иногда они отрываются от ободка и светятся несколько секунд отдельно, пока не погаснут”.

Обычно явление длится секунду-две. Но при исключительной обстановке продолжительность его заметно удлиняется. Отмечен случай, когда зеленый луч наблюдался более 5 минут! Солнце садилось за отдаленной горой, и быстро шагавший наблюдатель видел зеленую кайму солнечного диска, словно скользящего по склону горы (рис. 118)³.

Очень поучительны случаи наблюдения зеленого луча при *восходе* Солнца, когда верхний край светила начинает показываться из-под горизонта. Это опровергает часто высказываемую догадку, будто зеленый луч — оптический обман, которому поддается глаз, утомленный ярким блеском только что закатившегося Солнца.

Солнце — не единственное светило, посылающее “зеленый луч”. Случалось видеть это явление, порождаемое заходящей Венерой.




Рис. 118. Длительное наблюдение “зеленого луча”. Справа сверху — зеленый луч, видимый в зрительную трубу. Диск Солнца имеет неправильные контуры. В положении 1 блеск солнечного диска ослепляет глаз и мешает видеть зеленую кайму простым глазом. В положении 2, когда диск Солнца почти исчезает, зеленый луч виден простым глазом.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ЗРЕНИЕ ОДНИМ И ДВУМЯ ГЛАЗАМИ

Когда не было фотографии

Фотография успела сделаться в вашем быту столь привычной, что мы и не представляем себе, как обходились без нее наши предки, даже и не очень отдаленные. В “Записках Пиквикского клуба” Диккенс забавно рассказывает, каким образом запечатлевали внешность человека в государственных учреждениях Англии в первой половине XIX века. Действие происходит в долговой тюрьме, куда привели Пиквика.

Пиквику сказали, что он должен посидеть, пока с него снимут портрет ¹.

— Снимут с меня портрет! — воскликнул м-р Пиквик.

— Образ ваш и подобие, сэр, — отвечал дюжий тюремщик. — Мы ведь мастера портреты снимать, было бы вам это известно. Не успеете повернуться, и рисунок будет готов. Сядьте, сэр, и будьте как дома.

Повинуясь приглашению, м-р Пиквик сел, и тогда Самуэль (слуга Пиквика. — *Я. П.*) шепнул ему на ухо, что выражение “снимать портрет” должно понимать здесь в фигуральном смысле:

— Это значит, сэр, что тюремщики станут присматриваться к вашему лицу, чтобы отличать вас от посетителей.

Сеанс начался. Толстый тюремщик беспечно посматривал на м-ра Пиквика, тогда как его товарищ стал напротив нового арестанта и устремил на него пристальный взгляд. Третий джентльмен остановился перед самым носом м-ра Пиквика и принялся изучать его черты с напряженным вниманием.

Наконец, портрет был снят, и м-ру Пиквику сказали, что он может идти в тюрьму”

Еще ранее роль таких “портретов”, запечатлеваемых памятью, играл перечень “примет”. Помните в “Борисе Годунове” Пушкина описание Григория Отрепьева в царском указе: “А ростом он мал, грудь широкая, одна рука короче другой, глаза голубые, волосы рыжие, на щеке боро-

давка, на лбу другая". В наши дни просто прилагается фотокарточка.

Чего многие не умеют?

Фотография проникла к нам в сороковых годах прошлого века сначала в виде так называемой "дагерротипии" — снимков на металлических пластинках. Неудобство этого способа светописы состояло в том, что приходилось позировать перед аппаратом довольно долго — десятки минут...².

"Мой дед, — рассказывал ленинградский физик Б. П. Вейнберг, — просидел перед фотографической камерой, чтобы получился с него один и притом неразмножаемый дагерротип, — сорок минут!"

Но все же возможность получать портреты без участия художника представлялась настолько новой, почти чудесной, что публика не скоро привыкла к этой мысли. В старинном русском журнале (1845 г.) рассказан по этому поводу такой случай:

"Многие еще до сих пор не хотят верить, что дагерротип мог действовать сам. Один весьма почтенный человек пришел заказать свой портрет. Хозяин (т.е. фотограф. — Я. П.) усадил его, приладил стекла, вставил дощечку, посмотрел на часы и вышел. Пока хозяин был в комнате, почтенный человек сидел как вкопанный; но лишь только хозяин вышел за дверь, господин, желавший иметь свой портрет, не счел нужным сидеть смирно, встал, понюхал табак, осмотрел со всех сторон дагерротип (аппарат. — Я. П.), приставил глаз к стеклу, покачал головой, проговорил "хитрая штука" и начал прохаживаться по комнате.

Хозяин возвратился и, с изумлением остановившись у двери воскликнул:

- Что вы делаете? Ведь я вам сказал, чтобы вы сидели смирно!
- Ну, я сидел. Я только встал, когда вы ушли.
- Тогда и надо было сидеть.
- Зачем же я буду сидеть напрасно?"

Вам кажется, читатель, что теперь мы далеки от всяких наивных представлений о фотографии. Однако и в наше время большинство людей не освоилось еще вполне с фотографией, и, между прочим, мало кто умеет *смотреть* на готовые снимки. Вы думаете, нечего тут и уметь: взять

* По имени изобретателя этого способа Дагерра.

снимок в руки и смотреть на него. Но это вовсе не так просто: фотографические снимки принадлежат к тем предметам, с которыми, при всей их распространенности, мы не умеем правильно обращаться. Большинство фотографов, любителей и профессионалов, — не говоря уже об остальной публике, — рассматривают снимки *не совсем так, как надо*. Давно уже известно искусство фотографии, и тем не менее многие не знают, как, собственно, следует рассматривать фотографические снимки*.

Искусство рассматривать фотографии

По устройству своему фотографическая камера — большой глаз: то, что рисуется на ее матовом стекле, зависит от расстояния между объективом и снимаемыми предметами. Фотографический аппарат закрепляет на пластинке перспективный вид, который представился бы нашему глазу (заметьте — *одному* глазу!), помещенному на месте объектива. Отсюда следует, что раз мы желаем получить от

снимка такое же зрительное впечатление, как и от самой природы, мы должны: 1) рассматривать снимок *только одним глазом* и 2) держать снимок *в надлежащем расстоянии от глаза*.




Рис. 119. Каким кажется палец левому и правому глазу, если держать руку недалеко от лица.

Нетрудно понять, что, рассматривая снимок *двумя* глазами, мы неизбежно должны увидеть перед собой плоскую картину, а не изображение, имеющее глубину. Это с необходимостью вытекает из особенностей нашего зрения. Когда мы рассматриваем объемный предмет, на сетчатках наших глаз получаются изображения неодинаковые: правый глаз видит не совсем то же, что кажется левому (рис. 119). Эта неодинаковость изображений и есть, в сущности, главная причина того, что предметы представляются нам объемными: сознание наше

* Многие читатели “Занимательной физики” — в том числе физики — признавались мне, что только из этой книги они впервые узнали, как надо правильно рассматривать фотографии.

сливает оба неодинаковых впечатления в один *рельефный* образ (на этом, как известно, основано устройство стереоскопа). Иное дело, если перед вами предмет плоский, например поверхность стены; оба глаза получают тогда вполне тождественные впечатления; одинаковость эта является для сознания признаком плоскостного протяжения предмета.

Теперь ясно, в какую ошибку впадаем мы, когда рассматриваем фотографию двумя глазами; этим мы навязываем своему сознанию убеждение, что перед нами именно плоская картина! Когда мы предлагаем *обоим* глазам снимок, предназначенный только для *одного*, мы мешаем себе видеть то, что должна дать нам фотография; вся иллюзия в таком совершенстве создаваемая фотографической камерой, разрушается этим промахом.

На каком расстоянии надо держать фотографию?

Столь же важно и второе правило — держать снимок в *надлежащем расстоянии от глаза*; в противном случае нарушается правильная перспектива.

Каково же должно быть это расстояние?




Рис. 120. В фотографическом аппарате угол 1 равен углу 2.

Для получения полного впечатления надо рассматривать снимок под тем же углом зрения, под каким объектив аппарата “видел” изображение на матовом стекле камеры, или, что то же самое, под каким он “видел” снимаемые предметы (рис 120). Отсюда следует, что снимок надо приблизить к глазу на расстояние, которое во столько же раз меньше расстояния предмета от объектива, во сколько раз изображение предмета меньше натуральной величины. Другими словами, надо держать снимок от глаза на расстоянии, которое приблизительно равно фокусной длине объектива.

Если мы примем во внимание, что в большинстве любительских аппаратов фокусное расстояние равно 12—15 см³, то поймем, что мы никогда не рассматриваем фотоснимки на правильном расстоянии от глаза: расстояние лучшего зрения для нормального глаза (25 см) почти вдвое более указанного. Плоскими кажутся и фотографии, висящие на стене, — их рассматривают с еще большего расстояния.

Только близорукие люди, с коротким расстоянием лучшего зрения (а также дети, способные видеть на близком расстоянии), могут доставить себе удовольствие любоваться эффектом, который дает обыкновенный снимок при правильном рассматривании (одним глазом). Держа фотографию на расстоянии 12—15 см от глаза, они видят перед собой не плоскую картину, а рельефный образ, в котором передний план отделяется от заднего почти как в стереоскопе.

Читатель, надеюсь, согласится теперь, что в большинстве случаев мы только по собственному неведению не получаем от фотографических снимков в полной мере того удовольствия, какое они могут доставить, и часто напрасно жалуемся на их безжизненность. Все дело в том, что мы не помещаем своего глаза в надлежащей точке относительно снимка и смотрим двумя глазами на изображение, предназначенное только для одного.

Странное действие увеличительного стекла

Близорукие люди, как мы сейчас объяснили, легко могут обыкновенные фотографии видеть рельефными. Но как быть людям с нормальными глазами? Они не могут придвигать изображение очень близко к глазу, но им поможет здесь увеличительное стекло. Смотря на снимок через чечевицу с увеличением в два раза, такие люди легко могут приобрести указанные выгоды близорукого, т.е., не напрягая глаз, могут видеть, как фотография приобретает рельефность и глубину. Разница между получаемым при этом впечатлением и тем, что мы видим, глядя на фотографию двумя глазами с большого расстояния, — огромна. Такой способ рассматривать обыкновенные фотографии почти заменяет эффекты стереоскопа.

Теперь становится понятным, почему фотоснимки часто приобретают рельефность, если смотреть на них одним

глазом в увеличительное стекло. Факт этот общеизвестен. Но правильное объяснение явления приходится слышать редко.

Один из рецензентов “Занимательной физики” писал мне по этому поводу:

“В следующем издании рассмотрите вопрос, отчего в обыкновенную лупу фотография кажется рельефной. Мое мнение, что все сложное объяснение стереоскопа не выдерживает критики. Попробуйте смотреть в стереоскоп одним глазом: рельефность сохраняется вопреки теории”.

Читателям, конечно, ясно теперь, что теория стереоскопа нисколько этим фактом не колеблется.

На том же основан любопытный эффект так называемых “панорам”, предающихся в игрушечных магазинах. В этих маленьких приборах обыкновенный снимок ландшафта или группы рассматривается через увеличительное стекло одним глазом. Этого уже достаточно для получения рельефа; иллюзию обыкновенно усиливают еще тем, что некоторые предметы переднего плана вырезаются отдельно и помещаются впереди фотографии; глаз наш очень чувствителен к рельефности ближайших предметов и не столь восприимчив к более далеким рельефам.

Увеличение фотографий

Нельзя ли изготовлять фотографии так, чтобы *нормальный* глаз мог правильно рассматривать их, не прибегая к увеличительным стеклам? Вполне возможно, — для этого достаточно только пользоваться камерами с длиннофокусными объективами. После сказанного раньше понятно, что снимок, полученный при помощи объектива с 25—30-сантиметровым фокусным расстоянием, можно рассматривать (одним глазом) на обычном расстоянии — он покажется достаточно рельефным.

Можно получать и такие снимки, которые не будут казаться плоскими при рассматривании даже двумя глазами с большого расстояния. Мы уже говорили, что когда оба глаза получают от какого-либо предмета два тождественных изображения, сознание сливает их в одну плоскую картину. Но эта склонность быстро ослабевает с увеличением расстояния. Практика показывает, что снимок, полученный с помощью объектива с 70-сантиметровым фокусным расстоянием, не утрачивает

рельефности, если рассматривать его обоими глазами.

Необходимость располагать длиннофокусным объективом опять-таки представляет неудобство. Поэтому укажем и другой способ: он состоит в том, что *увеличивают* снимок, полученный обыкновенным аппаратом. При таком увеличении соответственно удлиняется и правильное расстояние, с какого нужно снимок рассматривать. Если фотографию, снятую 15-сантиметровым объективом, увеличить в 4 или 5 раз, то этого уже достаточно для получения желаемого эффекта: увеличенную фотографию можно рассматривать обоими глазами с расстояния 60—75 см. Некоторая неясность снимка не мешает впечатлению, так как с большого расстояния она малозаметна. В смысле же рельефности снимок несомненно выигрывает.

Лучшее место в кинотеатре

Частые посетители кинотеатров заметили, вероятно, что некоторые картины отличаются необыкновенной рельефностью: фигуры отделяются от заднего плана и настолько выпуклы, что забываешь даже о существовании полотна и видишь словно подлинный ландшафт или живых артистов на сцене.

Такая рельефность изображений зависит не от свойства самой ленты, как часто думают, а от места, где помещается зритель. Кинематографические снимки хотя и производятся с помощью весьма короткофокусных камер, но проецируются на экран в сильно увеличенном виде, — раз в сто, — так что их можно рассматривать двумя глазами с большого расстояния ($10 \text{ см} \times 100 = 10 \text{ м}$). Наибольшая рельефность наблюдается тогда, когда мы смотрим на картины под тем же самым углом, под каким аппарат “смотрел” на свою натуру при съемке. Тогда перед нами будет естественная перспектива.

Как же найти расстояние, отвечающее такому наивыгоднейшему углу зрения? Для этого нужно выбрать место, во-первых, против середины картины, а во-вторых, на таком расстоянии от экрана, которое во столько же раз больше ширины картины, во сколько раз фокусное расстояние объектива больше ширины кинематографической ленты.

Для кинематографических снимков обыкновенно пользуются камерами с фокусным расстоянием 35, 50, 75, 100 мм, в зависимости от характера съемки. Стандартная

ширина ленты 24 мм. Для фокусного расстояния, например, в 75 мм имеем отношение

$$\frac{\text{и́скомое расстояние}}{\text{ширина картины}} = \frac{\text{фокусное расстояние}}{\text{ширина ленты}} = \frac{75}{24} \approx 3$$

Итак, чтобы найти, на каком расстоянии надо в этом случае сесть от экрана, достаточно ширину картины увеличить примерно в 3 раза. Если ширина кинематографического изображения 6 шагов, то лучшие места для рассматривания этих кадров расположены в 18 шагах от экрана.

Этого обстоятельства не следует упускать из виду при испытании различных предложений, имеющих целью придать кинокартинам стереоскопичность: легко приписать испытываемому изобретению то, что обусловлено указанными причинами.

Совет читателям иллюстрированных журналов

Воспроизведения фотографий в книгах и журналах имеют, конечно, те же свойства, что и оригинальные снимки: они тоже становятся рельефнее, если рассматривать их одним глазом и с надлежащего расстояния. Так как разные фотографии сняты аппаратами с различными фокусными расстояниями, то отыскивать надлежащие расстояния для рассматривания приходится испытанием. Закрыв один глаз, держите иллюстрацию на вытянутой руке так, чтобы плоскость ее была перпендикулярна к лучу зрения, а ваш открытый глаз приходился против середины снимка. Теперь приближайте постепенно снимок, не переставая всматриваться в него; вы легко уловите момент, когда он приобретет наибольшую рельефность.

Многие снимки, неотчетливые и плоские при обычном рассматривании, получают глубину и ясность, если смотреть на них описанным способом. Нередко при таком рассматривании становятся заметны блеск воды и другие чисто стереоскопические эффекты ⁴.

Надо удивляться, что столь простые факты мало известны, хотя почти все здесь сообщаемое излагалось в популярных книгах еще в прошлом веке. В “Основаниях физиологии ума” В. Карпентера — книге, изданной в русском переводе в 1877 г., — читаем о рассматривании фотографий следующее:

“Замечательно, что эффект этого способа рассматривания фотографических картин (одним глазом) не ограничивается выделением телесности предмета; другие особенности являются тоже с несравненно большей живостью и реальностью, дополняя иллюзию. Это относится главным образом к изображению стоячей воды — самой слабой стороны фотографических картин при обычных условиях. Именно, если смотреть на такое изображение воды *обоими* глазами, поверхность кажется восковой, но если смотреть *одним* глазом, в ней часто замечается поразительная прозрачность и глубина. То же можно сказать и относительно различных свойств поверхностей, отражающих свет, например бронзы и слоновой кости. Материал, из которого сделан предмет, изображенный на фотографии, узнается гораздо легче, если смотреть одним глазом, а не двумя.”

Обратим внимание еще на одно обстоятельство. Если снимки при увеличении выигрывают в жизненности, то при уменьшении они, напротив, проигрывают в этом отношении. Уменьшенные фотографии выходят, правда, резче и отчетливее, но они плоски, не дают впечатления глубины и рельефности. Причина после всего сказанного должна быть понятна: с уменьшением фотографий уменьшается и соответствующее “перспективное расстояние”, которое обыкновенно и без того чересчур мало.

Рассматривание картин

То, что мы сказали о фотографии, до известной степени применимо и к картинам, созданным рукой художника: их всего лучше рассматривать тоже с надлежащего расстояния. Только при этом условии ощутите вы перспективу и картина покажется не плоской, а глубокой и рельефной. Полезно смотреть также одним, а не двумя глазами, особенно на картины небольших размеров.

“Давно известно, — писал по этому поводу английский психолог В. Карпентер в упомянутом сочинении, — что при внимательном рассматривании картины, где перспективные условия, свет, тени и общее расположение деталей строго соответствуют изображаемой действительности, производимое впечатление гораздо живее, если смотреть *одним глазом*, а не *обоими*, и что эффект усиливается, когда мы смотрим через трубку, исключаящую всю постороннюю обстановку картины. Факт этот объясняли раньше совершенно ложно. ”Мы видим одним глазом лучше, чем двумя, — говорит Бэкон, — потому что жизненные духи сосредоточиваются при этом в одном месте и действуют с большей силой”.

В действительности же тут дело в том, что когда мы смотрим обоими глазами на картину в умеренном расстоянии, то принуждены признать ее плоской поверхностью; когда же мы смотрим только одним глазом, ум наш легче может поддаться впечатлению перспективы, света, теней и т.д. Отсюда, когда мы всматриваемся пристально, картина приобретает в скором времени рельефность и может даже достичь телесности реального ландшафта. Полнота иллюзии будет главным образом зависеть от верности, с которой воспроизведена на картине действительная проекция предметов на плоскости... Преимущество видения одним глазом зависит в этих случаях от того, что ум свободен истолковывать картину по своему произволу, когда ничто не заставляет его видеть в ней плоскую картину".

Уменьшенные снимки с больших картин дают нередко более полную иллюзию рельефности, нежели оригиналы. Вы поймете, отчего это происходит, если вспомните, что при уменьшении картины сокращается то обычно большое расстояние, с которого следует рассматривать изображение, поэтому снимок приобретает рельефность уже на близком расстоянии.

Что такое стереоскоп?

Переходя от картин к объемным предметам, зададим себе вопрос: почему, собственно, предметы кажутся нам объемными, а не плоскими? На сетчатке нашего глаза изображение получается ведь плоское. Каким же образом происходит то, что предметы представляются нам не в виде плоской картины, а телами трех измерений?

Здесь действуют несколько причин. Во-первых, различная степень освещения частей предметов позволяет нам судить об их форме. Во-вторых, играет роль напряжение, которое мы ощущаем, когда приспособляем глаза к ясному восприятию различно удаленных частей объемного предмета: все части плоской картины удалены от глаза одинаково, между тем как части пространственного объекта находятся на различном расстоянии, и, чтобы ясно видеть их, глаз должен не одинаково "настраиваться". Но самую большую услугу оказывает нам то, что здесь изображения, получаемые в каждом глазу от одного и того же предмета, не одинаковы. В этом легко убедиться, если смотреть на какой-нибудь близкий предмет, попеременно закрывая то правый, то левый глаз. Правый и левый глаз видят предметы не одинаково; в каждом рисуется иная картина, и это-то различие, истолковываемое нашим сознанием, дает нам впечатление рельефа (рис. 121).

Теперь представьте себе два рисунка одного и того же предмета: первый изображает предмет, каким он кажется левому глазу, второй — правому. Если смотреть на эти изображения так, чтобы каждый глаз видел только “свой” рисунок, то вместо двух плоских картин мы увидим один




Рис. 121. Стекланный куб с пятнами, рассматриваемый левым и правым глазом.

выпуклый, рельефный предмет, даже более рельефный, чем объемные предметы, видимые одним глазом. Рассматривают такие парные рисунки при помощи особого прибора — стереоскопа. Слияние обоих изображений достигалось в прежних стереоскопах при помощи зеркал, а в новейших — с помощью стеклянных выпуклых призм: они преломляют лучи так, что при мысленном их продолжении оба изображения (слегка увеличенные благодаря выпуклости призм) покрывают одно другое. Идея стереоскопа, как видим, необычайно проста, но тем поразительнее действие, достигаемое столь простыми средствами.

Большинству читателей, без сомнения, случалось видеть стереоскопические фотографии различных сцен и ландшафтов. Иные, быть может, рассматривали в стереоскоп и чертежи фигур, изготовленные с целью облегчить изучение стереометрии. В дальнейшем мы не будем говорить об этих более или менее общеизвестных применениях стереоскопа, а остановимся лишь на тех, с которыми многие читатели, вероятно, незнакомы.

Наш естественный стереоскоп

При рассматривании стереоскопических изображений можно обойтись и без какого-либо прибора: надо лишь приучить себя соответствующим образом направлять глаза.

Результат получается такой же, как и при помощи стереоскопа, с той лишь разницей, что изображение при этом не увеличивается. Изобретатель стереоскопа Уитстон первоначально пользовался именно этим естественным приемом.

Я прилагаю здесь целую серию стереоскопических рисунков постепенно возрастающей сложности, которые советую попытаться рассматривать непосредственно, без стереоскопа. Успех достигается лишь после ряда упражнений*.

Начните с рис. 122 — пары черных кружков. Держите их перед глазами и в течение нескольких секунд не сводите взгляда с промежутка между кружками; при этом сделайте такое усилие, словно бы желали рассмотреть предмет, расположенный далее, позади рисунка. Вы увидите скоро уже не два, а четыре кружка, — кружки раздвоятся. Но затем крайние кружки отплывут далеко, а внутренние сблизятся и сольются. Если вы повторите то же с рис. 123 и 124, то в последнем случае в момент




Рис. 122. Несколько секунд не сводите глаз с промежутка между кружками — оба черных кружка сольются в один.




Рис. 123. Повторите то же с этой парой рисунков. Добившись слияния, перейдите к следующему упражнению.




Рис. 124. Когда эти изображения сольются, вы увидите перед собой словно внутренность трубы, уходящей вдаль.

слияния увидите перед собой словно внутренность длинной трубы, уходящей вдаль.

* Надо заметить, что умение видеть стереоскопически — даже и в стереоскоп — дается не всем людям: некоторые (например, косоглазые или привыкшие работать только одним глазом) совершенно неспособны к нему; другим оно дается после продолжительного упражнения; наконец, третьи, преимущественно молодые люди, научаются этому очень быстро — в четверть часа.

Добившись этого, можете перейти к рис. 125; здесь вы должны увидеть висящие в воздухе геометрические тела. Рис. 126 представит вам длинный коридор каменного здания или туннель, а на рис. 127 вы можете восхищаться иллюзией прозрачного стекла в аквариуме. Наконец на рис. 128 перед нами уже целая картина — морской пейзаж.




Рис. 125. Эти четыре геометрических тела при слиянии изображений кажутся словно парящими в пространстве.

Научиться такому непосредственному рассматриванию парных изображений сравнительно нетрудно. Многие из моих знакомых овладевали этим искусством в короткий срок, после небольшого числа проб. Близорукие и дальновзоркие, носящие очки, могут не снимать их, а смотреть на изображения так, как рассматривают всякую картину. Пробуйте придвигать или отодвигать от глаз рисунки, пока не уловите надлежащего расстояния. Во всяком случае нужно проделывать опыты при хорошем освещении — это сильно способствует успеху.




Рис. 126. Длинный, уходящий вдаль коридор.

Научившись рассматривать без стереоскопа воспроизведенные здесь рисунки, можете воспользоваться приобретенным навыком для рассматривания вообще стереос-




Рис. 127. Рыбка в аквариуме.

копических фотографий, обходясь без специального прибора. Те стереоскопические снимки, которые приведены далее на рис. 129 и 132, тоже можно попытаться рассматривать простым глазом. Не надо только чрезмерно увлекаться этим упражнением, чтобы не утомить глаза.

Если вам не удастся приобрести способность управлять своими глазами, вы можете, за неимением стереоскопа, пользоваться стеклами очков для дальнозорких; надо подклеить их под отверстия в картоне так, чтобы смотреть только через внутренние края стекол; между рисунками следует поместить какую-нибудь перегородку. С помощью этого упрощенного стереоскопа вы вполне достигнете цели.




Рис. 128. Стереоскопический ландшафт моря.

Одним и двумя глазами

На рис. 129, *а* воспроизведены фотографии, изображающие три аптечные склянки как будто одинаковых размеров. Как бы внимательно вы ни рассматривали эти изображения, вы не обнаружите между склянками никакой разницы в размерах. А между тем разница существует, и весьма значительная. Склянки кажутся равными только потому, что находятся не на одинаковом расстоянии от глаза или от фотографического аппарата: крупная склянка удалена больше, чем мелкие. Но какие именно из трех изображенных склянок ближе, какие дальше? Это невозможно определить простым рассматриванием изображений.

Задача, однако, легко решается, если обратиться к услугам стереоскопа или к помощи того стереоскопического зрения без аппарата, о котором сейчас говорилось. Тогда вы отчетливо увидите, что из трех склянок крайняя левая ближе средней, которая в свою очередь ближе правой. Истинное соотношение размеров склянок показано на рис. 129, *б*.

Еще более поразительный случай имеем на рис. 129, *в*. Вы видите воспроизведение фотографий ваз, свечей и часов, причем обе вазы и обе свечи кажутся совершенно одинаковых размеров. В действительности же между ними огромная разница в размерах: левая ваза чуть не вдвое выше правой, а левая свеча гораздо ниже часов и правой свечи (рис. 129, *г*). При стереоскопическом рассматривании тех же снимков сразу обнаруживается причина метаморфозы: предметы не выстроены в одну шеренгу, а размещены на различных расстояниях: крупные — дальше, мелкие — ближе.

Преимущество стереоскопического, “двуглазого” (бинокулярного) зрения перед “одноглазым” выступает здесь с большой убедительностью ⁵.

Простой способ разоблачать подделки

Имеются два совершенно одинаковых рисунка, например два равных черных квадрата. Рассматривая их в стереоскоп, мы увидим один квадрат, ничем не отличающийся от каждого из двух в отдельности⁶. Если в центре каждого квадрата имеется белая точка, то и она, конечно, окажется в квадрате, видимом в стереоскопе. Но стоит эту точку на одном квадрате немного сдвинуть в сторону от центра,




Рис. 129. Что видно невооруженным глазом (а, б) и что видно с помощью стереоскопа (в, г).

чтобы получился довольно неожиданный эффект: в стереоскоп по-прежнему будет видна одна точка, но не на самом поле квадрата, а *впереди или позади* него! Достаточно ничтожной разницы в обеих картинах, чтобы вызвать с помощью стереоскопа впечатление глубины.

Это дает простой способ обнаруживать подделки банковских билетов и документов. Стоит поместить в стереоскоп подозреваемый банкнот рядом с подлинным, чтобы обнаружить подделку, как бы искусна она ни была: ничтожное различие в одной букве, в одном штрихе сразу бросится в глаза, так как буква эта или штрих будет казаться впереди или позади остального фона*.

Зрение великанов

Когда предмет находится очень далеко от нас, далее 450 м, то расстояние между нашими глазами не может уже влиять на различие зрительных впечатлений. Далекие здания, отдаленные горы, ландшафты кажутся нам поэтому плоскими. По той же причине и светила неба кажутся все на одном расстоянии, хотя Луна гораздо ближе, чем планеты, а последние неизмеримо ближе, чем неподвижные звезды.

Вообще, для всех предметов, которые расположены дальше 450 м, мы совершенно утрачиваем способность непосредственно воспринимать рельеф; они кажутся правому и левому глазу одинаковыми, так как те 6 см, которые отделяют зрачки глаз друг от друга, — слишком ничтожное расстояние по сравнению с 450 м. Понятно, что и стереоскопические фотографии, полученные при таких условиях, совершенно тождественны и не могут давать в стереоскопе иллюзии рельефа.

Но делу легко помочь: нужно сфотографировать далекие объекты с двух точек, взаимное удаление которых больше, нежели нормальное расстояние между глазами. Рассматривая подобные фотографии в стереоскоп, мы увидим ландшафт таким, каким видели бы его, если бы расстояние между нашими глазами значительно превышало обычное. В этом

* Мысль эта, впервые высказанная в середине XIX века Дове, применима не ко всем денежным знакам. Технические условия их печатания таковы, что получающиеся оттиски не дают в стереоскопе впечатления плоского изображения, даже если оба денежных знака подлинные. Зато прием Дове вполне пригоден для различения двух оттисков одного и того же книжного набора от оттиска, сделанного с заново набранного шрифта.

секрет получения стереоскопических снимков ландшафтов. Обыкновенно их рассматривают через увеличительные призмы (с выпуклыми боками), так что подобные рельефные стереоснимки нередко рисуются нам в натуральную величину; эффект получается поразительный.

Читатель, вероятно, догадался, что мыслимо устроить систему двух зрительных труб, через которые можно видеть рельеф данного ландшафта прямо в натуре, а не на фотографии. Такие приборы — *стереотрубы* — действительно существуют: две трубы отделены в них расстоянием большим, нежели нормальное расстояние между глазами, а оба изображения попадают в глаза посредством отражатель-




Рис. 130. Стереоскопическая зрительная труба.

ных призм (рис. 130). Трудно описать ощущения, которые испытываешь, когда смотришь в подобные инструменты, — до того они необычайны! Вся природа преобразается. Дальние горы становятся рельефными, деревья, скалы, здания, корабли на море — все круглится, все выпукло, расставлено на бесконечном просторе, а не лежит на плоском экране. Вы непосредственно видите, как движется далекое судно, которое в обыкновенные трубы кажется неподвижным. В таком виде должны были бы представляться наши земные ландшафты сказочным великанам.

Если увеличение труб 10-кратное, а расстояние между объективами в 6 раз превышает нормальное расстояние между зрачками (т.е. равно $6,5 \times 6 = 39$ см), то воспринимаемое при этом “изображение” в $6 \times 10 = 60$ раз “пластичнее”, чем при рассматривании невооруженными глазами. Это сказывается в том, что даже предметы, удаленные на 25 км, обнаруживают еще заметную рельефность.

Для землемеров, моряков, артиллеристов, путешественников подобные зрительные трубы положительно неза-




Рис. 131. Призменный бинокль.

менимы, особенно если они снабжены шкалой, при помощи которой можно измерить расстояние (стереоскопические дальномеры).

Призменный бинокль Цейса тоже дает стереозэффект, так как взаимное расстояние его объективов более, чем нормальное расстояние между нашими глазами (рис. 131). В театральных биноклях, наоборот, расстояние между объективами уменьшено — для ослабления рельефа (чтобы кулисы не казались расставленными).

Вселенная в стереоскопе

Если мы направим стереотрубу на Луну или какое-нибудь другое небесное тело, мы никакого рельефа не заметим. Этого и следовало ожидать, ибо небесные расстояния чересчур велики даже для стереотруб. Что значат те 30-50 см, которые отделяют друг от друга объективы прибора, по сравнению с расстоянием от Земли до планет? Если бы возможно было соорудить прибор с расстоянием между трубами даже в десятки и сотни километров, он и тогда не дал бы никакого эффекта при наблюдении планет, удаленных от нас на десятки миллионов километров.

Здесь опять приходит на помощь стереоскопическая фотография. Предположим, мы сфотографировали какую-нибудь планету вчера и затем вторично сегодня; обе фотографии будут сняты с одного пункта Земли, но с разных точек Солнечной системы, так как за сутки Земля успела передвинуться по орбите почти на три миллиона километров. Снимки, разумеется, не будут тождественны. И если такие снимки вы поместите в стереоскоп, то увидите уже не плоское, а рельефное изображение.

Мы можем, следовательно, пользуясь движением Земли по ее орбите, получать снимки небесных тел с двух весьма отдаленных точек; снимки эти будут стереоскопическими. Представьте себе великана с такой гигантской головой,

что расстояние между его глазами измеряется миллионами километров, и вы поймете, каких необычайных результатов достигают астрономы с помощью небесной стереофотографии.

Стереоскопом пользуются в настоящее время, чтобы открывать новые планеты, а именно те малые планетки (*астероиды*), которые во множестве кружатся между орбитами Марса и Юпитера. Еще недавно разыскание их было делом счастливого случая. Теперь же достаточно стереоскопически сравнить две фотографии данного участка неба, полученные в разное время; стереоскоп сразу выделит астероид, если он имеется, так как он будет выступать из общего фона.

Стереоскопом улавливается не только различие в положении точек, но и различие в их *яркости*. Это дает астроному удобный способ находить так называемые *переменные звезды*, периодически меняющие свой блеск. Если на двух снимках неба какая-нибудь звезда вышла неодинаково ярко, то стереоскоп сразу же укажет астроному эту изменившую свой блеск звезду.

Зрение тремя глазами

Не думайте, что третий глаз здесь такая же обмолвка, как третье ухо в устах взволнованного Ивана Игнатьевича из “Капитанской дочки”: “Он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье — и разойдитесь”. У нас речь в самом деле пойдет о том, чтобы видеть тремя глазами.

Видеть *три* глазами? Возможно разве приобрести себе третий глаз?

Представьте, мы будем говорить именно о таком зрении. Наука не в силах дать человеку третий глаз, но в ее власти дать возможность видеть предмет таким, каким он должен был бы казаться существу с тремя глазами.

Начнем с того, что человеку, лишившемуся одного глаза, вполне возможно рассматривать стереоскопические фотографии и получать от них то впечатление рельефности, которое воспринимать непосредственно он не может. Для этого нужно проектировать на экран, быстро сменяя один другим, снимки, предназначенные для правого и левого глаза; то, что человек двумя глазами рассматривает одновременно, одноглазый будет видеть здесь последовательно, в быстрой смене. Но результат получится один и тот же, потому что весьма быстро сменя-

ющиеся зрительные впечатления так же сливаются в один образ, как и одновременные

Но если так, то человеку с *двумя* глазами возможно одновременно видеть: одним глазом — две быстро сменяющиеся фотографии, а другим — еще одну фотографию, снятую с третьей точки зрения.

Иными словами, с одного предмета делаются три снимка, отвечающие трем различным точкам, как бы трем глазам. Затем два из этих снимков заставляют, быстро чередуясь, действовать на один глаз наблюдателя; при быстром их чередовании впечатления сливаются в один сложный *рельефный* образ. К этому образу присоединяется еще третье впечатление — от другого глаза, который смотрит на третий снимок.

При таких условиях мы хотя и смотрим только двумя глазами, но впечатление получаем совершенно такое же, как если бы смотрели тремя глазами. Рельефность при этом достигает высшей степени.

Что такое блеск?

Стереофотография, воспроизведенная у нас на рис. 132, изображает многогранники: один — черным по белому, другой — белым по черному. Что мы увидели бы, если бы взглянули на эти рисунки в стереоскоп? Трудно предугадать. Послушаем Гельмгольца:

“Когда на одной стереоскопической картинке какая-нибудь плоскость изображена белой, на другой — черной, то в соединенном изображении она кажется блестящей, даже когда для рисунка взята совершенно матовая бумага. Стереоскопические чертежи моделей кристаллов (так выполненные. — Я. П.) производят впечатление, как будто модель кристаллов сделана из блестящего графита. Еще лучше выходит, благодаря этому приему, на стереоскопических photographиях блеск воды, листьев и т. п.”.

В старой, но далеко еще не устаревшей книге нашего великого физиолога Сеченова “Физиология органов чувств. Зрение” (1867 г.) находим прекрасное объяснение этого явления. Вот оно:

* Возможно, что замечаемая иногда удивительная рельефность кинематографических картин объясняется, помимо указанных ранее причин, еще отчасти и тем эффектом, о котором сейчас говорится: если аппарат, производивший съемку, мерно покачивался при этом (как часто бывает вследствие работы механизма, движущего ленту), то снимки получались нетождественные; при быстрой же смене этих снимков на экране они сливаются в нашем сознании в рельефный образ.




Рис. 132. Сливаясь при рассматривании в стереоскоп, эти рисунки дают изображение блестящего кристалла на черном фоне.

“В опытах искусственного стереоскопического слияния различно освещенных или различно окрашенных поверхностей повторяются действительные условия видения блестящих тел. Чем отличается в самом деле матовая поверхность от блестящей (полированной)? Первая отражает свет рассеянно во все стороны, поэтому кажется глазу всегда одинаково освещенной, с какой бы стороны он ни смотрел на нее; полированная же поверхность отражает свет лишь в определенном направлении; поэтому возможны даже такие случаи, когда один глаз человека, смотрящего на такую поверхность, получает от нее много отраженных лучей, а другой почти нисколько (эти условия и соответствуют именно случаю стереоскопического слияния белой поверхности с черной); случаи же неравного распределения отраженного света между глазами наблюдателя (т.е. случаи, когда в один глаз попадает больше, чем в другой) при рассматривании блестящих полированных поверхностей, очевидно неизбежны.

Читатель видит, таким образом, что стереоскопический блеск представляет доказательство в пользу мысли, что опыт играет первенствующую роль в акте телесного слияния образов. Борьба полей зрения тотчас уступает место прочному представлению, как только зрительному аппарату, воспитанному опытом, дается возможность отнести различия их к какому-нибудь знакомому случаю действительного видения”.

Итак, причина того, что мы видим *блеск* (по крайней мере одна из причин), состоит в неодинаковой яркости изображений, получаемых правым и левым глазом. Без стереоскопа эта причина едва ли могла бы нам открыться.

Зрение при быстром движении

Раньше мы говорили, что различные изображения одного и того же предмета, сливаясь в нашем глазу при быстром чередовании, создают зрительное впечатление рельефности.

Возникает вопрос: будет ли это только тогда, когда подвижные изображения воспринимаются неподвижным глазом, или то же будет наблюдаться и в равносильном случае, когда неподвижные изображения воспринимаются быстро перемещающимся глазом?

Оказывается, как и следовало ожидать, что стереоскопический эффект получается и в таком случае. Вероятно, многим читателям случалось замечать, что кинематографические картины, снятые с быстро движущегося поезда, обнаруживают необыкновенную рельефность, но уступающую той, какая достигается в стереоскопе. Мы и непосредственно можем убедиться в этом при внимательном отношении к тем зрительным впечатлениям, которые воспринимаем при быстрой езде в вагоне или в автомобиле: ландшафты, так наблюдаемые, отличаются стереоскопичностью, отчетливым отделением переднего плана от заднего. Ощущение *глубины* заметно возрастает, простирается вдаль больше тех 450 м, которые являются пределом стереоскопического зрения для неподвижного глаза.

Не в этом ли кроется причина приятного впечатления, которое производит на нас ландшафт, рассматриваемый из окна быстро мчащегося вагона? Даль уходит назад, и мы отчетливо различаем огромность расстилающейся кругом картины природы. Когда на быстро движущемся автомобиле мы проезжаем через лес, то — по той же причине — каждое дерево, ветка, листок воспринимаются нами отчетливо отграниченными в пространстве, заметно отделяясь друг от друга, а не сливаясь в одно целое, как для наблюдателя неподвижного.

А при быстрой езде по горному шоссе весь рельеф почвы воспринимается непосредственно глазом, горы и долины ощущаются с осязательной пластичностью.

Все это доступно и одноглазым людям, для которых описываемые ощущения являются совершенно новыми, неизведанными. Мы уже отмечали, что для рельефного видения вовсе не необходимо, как обычно думают, одновременное восприятие разных картин непременно *двумя* глазами: стереоскопическое зрение осуществляется и одним

глазом, если *разные* картины сливаются при достаточно быстром чередовании*.

Нет ничего легче, как проверить сказанное: для этого потребуется лишь немного внимания к тому, что мы воспринимаем, сидя в вагоне поезда или в автобусе. При этом вы заметите, быть может, и другое поразительное явление, о котором писал еще Дове в первой половине XIX века (поистине, ново то, что хорошо забыто!): мелькающие мимо окна близкие предметы кажутся *уменьшенными*. Факт этот объясняется причиной, имеющей мало общего со стереоскопическим зрением, а именно тем, что, видя столь быстро движущиеся предметы, мы ошибочно заключаем об их близости; если же предмет ближе к нам, — как бы бессознательно рассуждаем мы, — то он должен быть в натуре мельче обычного, чтобы казаться такой же величины, как всегда. Это объяснение принадлежит Гельмгольцу.

Сквозь цветные очки

Если вы станете смотреть через красное стекло на надпись, сделанную *красным по белому*, то увидите ровный красный фон, — и только. Никаких следов надписи вы не заметите, так как красные буквы сливаются с красным же фоном. Глядя через то же стекло на надпись, сделанную *голубым по белому*, вы отчетливо увидите *черные* буквы на красном фоне. Почему черные — легко понять: красное стекло не пропускает голубых лучей (оттого оно и красное, что пропускает только красные лучи); следовательно, на месте голубых букв вы должны увидеть отсутствие света, т.е. черные буквы.

На этом свойстве цветных стекол основано действие так называемых *анаглифов* — картин, напечатанных особым образом и дающих тот же эффект, что и стереоскопические фотографии. В анаглифах оба изображения, соответствующие правому и левому глазу, печатаются *одно на другом*, но разными красками: голубой и красной.

Чтобы увидеть вместо двух цветных одно черное, но рельефное изображение, достаточно смотреть на них через

* Этим объясняется заметная стереоскопичность кинематографических картин, если они засняты с поезда, огибающего кривую; причем снимаемые предметы лежали в направлении радиуса кривой. “Железнодорожный эффект”, который мы здесь имеем в виду, хорошо известен кинооператорам.

цветные очки. Правый глаз через *красное стекло* видит только *голубой* отпечаток, т.е. именно тот, который отвечает правому глазу (причем он представляется глазу не цветным, а черным). Левый глаз через *голубое стекло* видит только соответствующий ему *красный отпечаток*. Каждый глаз видит лишь одно изображение — именно то, которое ему соответствует. Мы имеем здесь те же условия, что и в стереоскопе, и, следовательно, результат должен быть тот же: получается впечатление рельефа.

“Чудеса теней”

На рассмотренном сейчас принципе основан и эффект тех “чудес теней”, которые показывались иногда в кино.

“Чудеса теней” состоят в том, что отбрасываемые на экран тени движущихся фигур представляются зрителям (вооруженным двухцветными очками) в виде объемных образов, выпукло выступающих впереди экрана. Иллюзия достигается здесь использованием эффекта двухцветной стереоскопии. Предмет, тень которого желательно показать, помещается между экраном и двумя поставленными рядом источниками света — красным и зеленым. На экране получаются две окрашенные тени — красная и зеленая, частично покрывающие друг друга. Зрители смотрят на эти тени не непосредственно, а сквозь очки с плоскими стеклами — красным и зеленым.




Рис. 133. Секрет “чудес теней”

Сейчас было объяснено, что при таких условиях порождается иллюзия объемного образа, выступающего впереди

экранной плоскости. Иллюзии, достигаемые “чудесами теней”, чрезвычайно забавны: порой кажется, что брошенный предмет летит прямо в зрителя; какой-нибудь исполинский паук шагает по воздуху в публику, заставляя некоторых невольно вскрикивать и отворачиваться. Аппаратура здесь крайне проста; она понятна из рис. 133, где *Зл* и *Кр* означают зеленую и красную лампы (слева); *P* и *Q* — предметы, помещенные между лампами и экраном; *p* и *q* со значками *Зл* и *Кр* — окрашенные тени этих предметов на экране; *P₁* и *Q₁* — места, в которых видит эти предметы зритель, смотрящий через окрашенные стекла — зеленое (*Зл*) и красное (*Кр*). Когда бутафорский “паук” за экраном переносится из *Q* в *P*, зрителю кажется, что он перебегает из *Q₁* в *P₁*.

Вообще, приближение предмета за экраном к источнику света, обуславливая увеличение тени на экране, создает иллюзию надвигания предмета от экрана на зрителя. Все, что зрителям кажется летящим на них с экрана, движется на самом деле в обратном направлении — от экрана назад к источнику света.

Неожиданные превращения окраски

Здесь уместно рассказать о серии опытов, очень нравившихся посетителям “Павильона занимательной науки” в Ленинградском ЦПКО на Кировских островах. Один из уголков помещения обставлен, как гостиная. Вы видите мебель в темно-оранжевых чехлах; стол, покрытый зеленой скатертью; на нем — графин с клюквенным морсом и цветы; полка уставлена книгами с цветными надписями на корешках. Сначала все это показывается при обычном белом электрическом освещении. Затем — поворотом выключателя — белое освещение заменяется красным. Это порождает в гостиной неожиданную перемену: мебель становится розовой, зеленая скатерть превращается в темно-лиловую; морс делается бесцветным, как вода; цветы меняют окраску и кажутся совершенно другими; часть надписей на книжных корешках бесследно исчезает...

При новом повороте выключателя уголок заливается зеленым светом — и облик гостиной опять неузнаваемо изменяется.

Все эти занимательные метаморфозы хорошо иллюстрируют ньютоново учение об окраске тел. Сущность учения в том, что поверхность тела имеет всегда цвет не тех лучей,

которые она поглощает, а тех, которые она рассеивает, т.е. отбрасывает в глаз наблюдателя. Знаменитый соотечественник Ньютона, английский физик Тиндаль сформулировал это положение так:

“Когда мы освещаем предметы белым светом, то красный цвет образуется от поглощения зеленых лучей, а зеленый — от поглощения красных, между тем как остальные цвета в обоих случаях проявляются. Значит, тела приобретают свой цвет отрицательным способом: окраска — следствие не прибавления, а исключения”

Зеленая скатерть, следовательно, оттого зеленого цвета при белом освещении, что она способна рассеивать преимущественно лучи зеленые и примыкающие к ним в спектре; прочие лучи она рассеивает в незначительном количестве большую же их часть поглощает. Если направить на такую скатерть смесь красных лучей с фиолетовыми, то скатерть будет рассеивать почти одни только фиолетовые, поглощая большую часть красных. Глаз получит впечатление темно-лиловой окраски.

Примерно такова же причина и всех прочих цветовых метаморфоз в уголке гостиной. Загадочным представляется лишь обесцвечивание морса: почему красная жидкость при красном же освещении кажется бесцветной? Разгадка в том, что графин с морсом стоит на белой салфетке, разостланной на зеленой скатерти. Если снять графин с салфетки, сразу обнаруживается, что в красных лучах жидкость в графине не бесцветная, а красная. Бесцветной кажется она только рядом с салфеткой, которая в красном освещении делается красной, но которую мы по привычке и по контрасту с темной цветной скатертью *продолжаем считать белой*. А так как цвет жидкости в графине одинаков с цветом мнимой белой салфетки, то мы невольно приписываем и морсу белый цвет; он становится в наших глазах уже не морсом, а бесцветной водой

Опыты, подобные описанным, можно проделать и в упрощенной обстановке: достаточно, раздобыв цветные стекла, рассматривать сквозь них окружающие предметы*.

Высота книги

Предложите гостю указать пальцем на стене, какой высоты достигнет книга, которую он держит в руках, если

* Подобные эффекты описаны в моей книге “Знаете ли вы физику?”

поместить ее стоя на полу. Когда он сделает это, поставьте в самом деле книгу на пол: окажется, что высота ее чуть не вдвое ниже указанной.

Особенно хорошо удастся опыт, если спрошенный сам не нагибается для указания высоты, а лишь на словах объясняет вам, в каком месте стены надо сделать пометку. Разумеется, опыт можно продельывать не только с книгой, но и с лампой, шляпой и другими предметами, которые мы обычно привыкли видеть близ уровня наших глаз.

Причина ошибки кроется в том, что все предметы “сокращаются”, когда мы смотрим вдоль них.

Размеры башенных часов

Ту ошибку, которую сделал ваш гость при оценке высоты книги, мы делаем постоянно и при определении величины предметов, помещенных очень высоко. Особенно характерна ошибка, которую мы совершаем при определении размеров башенных часов. Мы знаем, конечно, что такие часы очень велики, — и все же представление наше об их величине значительно уступает действительности. Прилагаемый рис. 134 изображает циферблат знаменитых часов Вестминстерского аббатства в Лондоне, перенесенный на мостовую улицы.

Люди кажутся букашками по сравнению с ним. И, взглянув на рисующуюся вдаль часовую башню, вы отказываетесь верить, что виднеющиеся на башне отверстия равны этим часам по размерам.




Рис. 134. Размеры башенных часов Вестминстерского аббатства.

Белое и черное

Взгляните *издали* на рис. 135 и скажите: сколько черных кружков могло бы поместиться в свободном промежутке между нижним кружком и одним из верхних кружков — четыре или пять? Скорее всего вы ответите, что четыре кружка уместятся свободно, но для пятого, пожалуй, места уже не останется.



Рис. 135. Пустой промежуток между нижним кружком и каждым из верхних кажется больше, нежели расстояние между наружными краями верхних кружков. В действительности же расстояния равны.

Когда же вам скажут, что в промежутке помещается ровно три кружка, не более, — вы не поверите. Возьмите же бумажку, циркуль или линейку и убедитесь, что вы неправы.

Эта странная иллюзия, в силу которой черные участки кажутся нашему глазу меньше, нежели белые такой же величины, носят название “иррадиации”. Она зависит от несовершенства нашего глаза, который как оптический аппарат не вполне отвечает строгим требованиям оптики. Его прелом-

ляющие среды не дают на сетчатке тех резких контуров, которые получаются на матовом стекле хорошо наставленного фотографического аппарата: вследствие так называемой *сферической аберрации* каждый светлый контур окружается светлой каймой, которая увеличивает его размеры на сетчатой оболочке глаза⁷. В итоге светлые участки всегда кажутся нам больше, чем равные им черные.

В своем “Учении о цветах” великий поэт Гете, который был зорким наблюдателем природы (хотя и не всегда достаточно осмотрительным физиком-теоретиком), пишет об этом явлении так:

“Темный предмет кажется меньше светлого той же величины. Если рассматривать одновременно белый круг на черном фоне и черный круг того же диаметра на белом фоне, то последний нам покажется примерно на $\frac{1}{5}$ меньше первого. Если черный круг сделать соответственно больше, они покажутся равными. Молодой серп Луны кажется принадлежащим кругу большего диаметра, чем остальная темная часть Луны, которая иногда бывает при этом различима (“пепельный свет” Луны. — Я. П.). В темном платье люди кажутся тоньше, чем в светлом.

Источники света, видимые из-за края, производят в нем кажущийся вырез. Линейка, из-за которой появляется пламя свечи, представляется с зарубкой в этом месте. Восходящее и заходящее Солнце делает словно выемку в горизонте".

В этих наблюдениях все верно, кроме утверждения, будто белый кружок кажется больше равного черного всегда на одну и ту же долю. Прибавка зависит от расстояния, с какого кружки рассматриваются. Сейчас станет понятно, почему это так.




Рис. 136. На некотором расстоянии кружки кажутся шестиугольниками.




Рис. 137. Черные кружки кажутся издали шестиугольниками.

Отодвиньте рис. 135 от глаз подальше, — иллюзия станет еще сильнее, еще поразительнее. Объясняется это тем, что ширина добавочной каймы всегда остается одинаковой; если поэтому в близком расстоянии она увеличивала ширину светлого участка всего на 10%, то на далеком расстоянии, когда само изображение уменьшится, та же добавка будет составлять уже не 10%, а, скажем, 30% или даже 50% его ширины. Указанной особенностью нашего глаза обычно объясняют также странное свойство рис. 136. Рассматривая его вблизи, вы видите множество белых кружков на черном поле. Но отодвиньте книгу подальше и взгляните на рисунок с расстояния 2—3 шагов, а если у вас очень хорошее зрение, то с расстояния шагов 6—8; фигура заметно изменит свой вид: вы увидите в ней вместо кружков белые шестиугольники, наподобие пчелиных ячеек.

Меня не вполне удовлетворяет объяснение этой иллюзии иррадиацией, с тех пор как я заметил, что *черные* кружки на белом фоне также кажутся издали шестиугольниками (рис. 137), хотя иррадиация здесь не увеличивает, а *сокращает*

кружки. Надо сказать, что вообще существующие объяснения зрительных иллюзий нельзя считать окончательными; большинство же иллюзий и вовсе не имеет еще объяснения*.

Какая буква чернее?

Рис. 138 дает возможность познакомиться с другим несовершенством нашего глаза — *астигматизмом*. Если взглянете на него одним глазом, то из черных букв этой надписи не все, вероятно, покажутся вам одинаково черными. Заметьте, какая буква всего чернее, и поверните рисунок боком. Произойдет неожиданная перемена: самая черная



Рис. 138. Смотрите на эту надпись одним глазом. Одна из букв представится вам более черной, нежели остальные.

буква станет серой и чернее прочих покажется теперь уже другая буква.

На самом же деле все четыре буквы одинаково черны, они только заштрихованы в различных направлениях. Если бы глаз был так же безупречно устроен, как дорогие стеклянные

объективы, то направление штрихов не отражалось бы на черноте букв. Но глаз наш по различным направлениям не вполне одинаково преломляет лучи, и потому мы не можем сразу видеть одинаково отчетливо и вертикальные, и горизонтальные, и косые линии.

Редко у кого глаза совершенно свободны от этого недостатка, а у некоторых людей астигматизм достигает такой степени, что заметно мешает зрению, понижая его остроту. Таким лицам приходится, чтобы ясно видеть, употреблять специальные очки.

У глаза есть и другие органические недостатки, которых при изготовлении оптических приборов мастера умеют избегать. Знаменитый Гельмгольц выразился по поводу этих недостатков так: “Если бы какой-нибудь оптик вздумал продать мне инструмент, обладающий такими недостатками, я счел бы себя вправе самым резким образом

* Подробнее об этом см. мою книгу “Обманы зрения” — альбом оптических иллюзий.

выразиться о небрежности его работы и возвратить ему его прибор с протестом”.

Но и кроме этих иллюзий, которые обусловлены известными недостатками строения, глаз наш поддается также целому ряду обманов, имеющих совершенно иные причины.

“Живые” портреты

Всем, вероятно, приходилось видеть портреты, которые не только смотрят прямо на нас, но даже следят за нами глазами, обращая их в ту сторону, куда мы переходим. Эта любопытная особенность таких портретов издавна подмечена и всегда казалась многим загадочной; нервных людей она положительно пугает. У Гоголя в “Портрете” прекрасно описан подобный случай:

“Глаза... вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него... Портрет... глядит мимо всего, что ни есть вокруг, прямо в него, — глядит просто к нему вовнутрь...”

Немало суеверных легенд связано с этой таинственной особенностью глаз на портретах (вспомните тот же “Портрет”), а между тем разгадка ее сводится к простому обману зрения.

Все объясняется тем, что зрачок на этих портретах помещен *в середине глаза*. Именно такими мы видим глаза человека, который смотрит прямо на нас; когда же он смотрит в сторону, мимо нас, то зрачок и вся радужная оболочка кажутся нам находящимися не посередине глаза, но несколько перемещенными к краю. Когда мы отходим в сторону от портрета, зрачки, разумеется, своего положения не меняют — остаются посередине глаза. А так как, кроме того, и все лицо мы продолжаем видеть в прежнем положении по отношению к нам, то нам, естественно, кажется, будто портрет повернул голову в нашу сторону и следит за нами.

Таким же образом объясняются и другие озадачивающие особенности некоторых картин: лошадь едет прямо на нас, куда бы мы ни отходили от картины; человек указывает на



Рис. 139. Загадочный портрет.

нас: его протянутая вперед рука направлена прямо к нам, и т. п. Образец подобной картины вы видите на рис. 139. Такого рода плакатами нередко пользуются для агитационных или рекламных целей.

Если вдуматься хорошенько в причину подобных иллюзий, то становится ясным, что в них не только нет ничего удивительного, но даже наоборот: удивительно было бы, если бы такой особенностью картины не обладали.

“Воткнутые линии” и другие обманы зрения

Начерченная на рис. 140 группа булавок не представляет на первый взгляд ничего особенного. Но поднимите книгу на уровень глаз и, закрыв один глаз, смотрите на эти линии так, чтобы луч зрения скользил вдоль них. (Глаз нужно поместить в той точке, где пересекаются продолжения этих




Рис. 140. Поместите один глаз (закрыв другой) приблизительно в точке, где пересекаются продолжения этих линий. Вы увидите ряд булавок, словно воткнутых в бумагу. При легком перемещении рисунка из стороны в сторону булавки кажутся качающимися.

прямых.) При таком рассматривании вам покажется, что булавки не начерчены на бумаге, а воткнуты в нее стоя. Отводя голову немного в сторону, вы увидите, что булавки словно наклоняются в ту же самую сторону.

Эта иллюзия объясняется законами перспективы: линии начерчены так, как должны были бы проектироваться на бумагу отвесно торчащие воткнутые булавки, когда на них смотрят описанным выше образом.

Способность нашу поддаваться зрительным обманам вовсе не следует рассматривать только как недостаток зрения. Она имеет и свою весьма выгодную сторону, о которой часто забывают. Дело в том, что, если бы глаз наш




Рис. 141. Буквы поставлены прямо.




Рис. 142. Кривые линии этой фигуры кажутся спиралью; между тем это окружности, в чем легко убедиться, водя по ним заостренной спичкой или циркулем.

неспособен был поддаваться никаким обманам, не существовало бы живописи и мы лишены были бы всех наслаждений изобразительных искусств. Художники широко пользуются этими недостатками зрения. В своих знаменитых “Письмах о разных физических материях”^{*} гениальный ученый XVIII века Эйлер писал:

“На сей обманчивости все живописное искусство основано. Ежели бы мы привыкли судить о вещах по самой истине, то бы сие искусство (т.е. художество. — *Я. П.*) не могло иметь места, равно как когда бы мы были слепы. Всуе художник истощил бы все свое искусство на смешение цветов; мы бы сказали: вот на сей доске красное пятно; вот голубое, здесь черное и там несколько беловатых линий, все находится на одной поверхности, не видно на ней никакого в расстоянии различия, и не можно бы было изобразить ни единого предмета. Что бы на картине ни написано было, так бы вам казалось, как письмо на бумаге... При сем совершенстве не были ли бы мы сожаления достойны, лишены будучи удовольствия, которое приносит нам ежедневно столь приятное и полезное художество?”

Оптических обманов очень много, можно наполнить целый альбом различными примерами таких иллюзий^{**}. Многие из них общеизвестны, другие менее знакомы. Привожу здесь еще несколько любопытных примеров оптических обманов из числа менее известных. Особенно эффектны иллюзии рис. 141 и 142 с линиями на сетчатом фоне: глаз положительно отказывается верить, что буквы на рис. 141 поставлены прямо. Еще труднее поверить тому, что на рис. 142 перед нами не спираль. Приходится убеждать




Рис. 143. Расстояния AB и AC равны, хотя первое кажется большим.

себя в этом непосредственным испытанием: поставив острое карандаша на одну из ветвей мнимой спирали, кружить по дугам, не приближаясь и не удаляясь от центра. Точно так же, только с помощью циркуля, можем мы убедиться, что на рис. 143 прямая AC не короче AB . Сущ-

^{*} Издано в С.-Петербурге в 1774 г. в переводе С. Румовского.

^{**} В упомянутой выше моей книге “Обманы зрения” собрано более 60 примеров оптических иллюзий.

ность остальных оптических иллюзий, порождаемых рис. 144—147, объяснена в подписях под ними. До какой степени сильна иллюзия рис. 147, показывает следующий курьезный случай: редактор одного из предыдущих изданий моей книги, получив из цинкографии оттиск этого клише, счел клише недоделанным и готовился было уже возвратить его в мастерскую, чтобы счистить серые пятна на пересе-




Рис. 144 Косая линия, пересекающая полосы, кажется изломанной.




Рис. 145 Белый и черный квадраты равны, так же как и круги.




Рис. 146. На пересечении черных полос появляются сероватые пятна.




Рис. 147 На пересечении белых полос этой фигуры появляются и исчезают, словно вспыхивая, сероватые квадратные пятнышки. В действительности же полосы совершенно белы по всей длине, в чем легко убедиться, закрыв бумагой прилегающие ряды черных квадратов. Это — следствие контраста.

чении белых полос, когда я, случайно войдя в комнату, объяснил ему, в чем дело.

Как видят близорукие

Близорукий без очков видит плохо; но что, собственно, он видит и какими именно представляются ему предметы— об этом люди с нормальным зрением имеют весьма смутное представление. Между тем близоруких людей довольно много, и полезно познакомиться с тем, как рисуется им окружающий мир.

Прежде всего, близорукий (разумеется, без очков) никогда не видит резких контуров: все предметы для него имеют расплывчатые очертания. Человек с нормальным зрением, глядя на дерево, различает отдельные листья и веточки, отчетливо вырисовывающиеся на фоне неба. Близорукий же видит лишь бесформенную зеленую массу неясных, фантастических очертаний; мелкие детали для него пропадают.

Для близоруких людей человеческие лица кажутся, в общем, моложе и привлекательнее, чем для человека с нормальным зрением; морщины и другие мелкие изъяны лица ими не замечаются; грубо-красный цвет кожи (натуральный или искусственный) кажется им нежно-румяным. Мы удивляемся наивности иных своих знакомых, ошибающихся чуть не на 20 лет в определении возраста людей, поражаемся их странным вкусом в оценке красоты, виним их в неучтивости, когда они смотрят нам прямо в лицо и словно не желают узнать... Все это часто происходит просто от близорукости.

“В лицее, — вспоминает поэт Дельвиг, современник и друг Пушкина, — мне запрещали носить очки, зато все женщины казались мне прекрасны; как я разочаровался после выпуска!” Когда близорукий (без очков) беседует с вами, он вовсе не видит вашего лица, — во всяком случае видит не то, что вы предполагаете: перед ним расплывчатый образ, и нет ничего удивительного, что, встретив вас вторично через час, он уже не узнает вас. Большей частью близорукий узнает людей не столько по внешнему облику, сколько по звуку голоса: недостаток зрения восполняется изощренностью слуха.

Интересно также проследить за тем, каким рисуется близоруким людям мир ночью. При ночном освещении все яркие предметы— фонари, лампы, освещенные окна и т. п.—

разрастаются для близорукого до огромных размеров, превращая картину в хаос бесформенных ярких пятен, темных и туманных силуэтов. Вместо линий фонарей на улице близорукие видят два-три огромных ярких пятна, которые заслоняют для них всю остальную часть улицы. Приближающегося автомобиля они не различают, вместо него они видят только два ярких ореола (фары), а сзади них темную массу.

Даже ночное небо имеет для близоруких далеко не тот вид, что для нормального глаза. Близорукий видит лишь звезды первых трех-четырех величин; следовательно, вместо нескольких тысяч звезд ему доступны всего несколько сотен. Зато эти немногие звезды кажутся ему крупными комьями света. Луна представляется близорукому огромной и очень близкой; полумесяц же принимает для него замысловатую, фантастическую форму.

Причина всех этих искажений и кажущегося увеличения размеров предметов кроется, конечно, в устройстве глаза близорукого. Близорукий глаз слишком глубок — настолько, что преломленные лучи от наружных предметов собираются не на самой сетчатке, а несколько впереди нее. До сетчатки же, устилающей глазное дно, доходят пучки расходящихся лучей, которые дают здесь расплывчатые, размытые изображения.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ЗВУК И СЛУХ

Как разыскивать эхо?

Никто его не видывал,
А слышать—всякий слыхивал,
Без тела, а живет оно,
Без языка — кричит.

Некрасов

Среди рассказов американского юмориста Марка Твена есть смешная выдумка о злоключениях коллекционера, возымевшего мысль составить себе коллекцию... чего бы вы думали? Эхо! Чудак неутомимо скупал все те участки земли, где воспроизводились многократные или чем-либо иным замечательные эхо.

“Прежде всего он купил эхо в штате Джорджия, которое повторялось четыре раза, потом шестикратное в Мэриленде, затем 13-кратное в Мэне. Следующей покупкой было 9-кратное эхо в Канзасе, дальнейшей — 12-кратное в Теннесси, дешево приобретенное, потому что нуждалось в ремонте: часть утеса обвалилась. Он думал, что его можно починить достройкой; но архитектор, который взялся за это дело, никогда еще не страивал эха и потому испортил его в конец, — после обработки оно могло годиться разве лишь для приюта глухонемых...”

Это, конечно, шутка; однако замечательные многократные эхо существуют в различных, преимущественно горных, местностях земного шара, и некоторые издавна приобрели всесветную известность.

Перечислим несколько знаменитых эхо. В замке Вудсток в Англии эхо отчетливо повторяет 17 слогов. Развалины замка Деренбург возле Гальберштадта давали 27-сложное эхо, которое, однако, умолкло с тех пор, как одна стена была взорвана. Скалы, раскнутые в форме круга возле Адерсбаха в Чехословакии, повторяют, в определенном месте, троек-

ратно 7 слогов; но в нескольких шагах от этой точки даже звук выстрела не дает никакого эха. Весьма многократное эхо наблюдалось в одном (ныне несуществующем) замке близ Милана: выстрел, произведенный из окна флигеля, повторялся эхом 40—50 раз, а громкое слово — раз 30.

Не так просто отыскать место, где эхо отчетливо слышно и один раз. В России, впрочем, найти подобные места сравнительно легко. Есть много равнин, окруженных лесами, много полян в лесах; стоит громко крикнуть на такой поляне, чтобы от стены леса донеслось более или менее отчетливое эхо.

В горах эхо бывает разнообразнее, чем на равнинах, зато встречается гораздо реже. Услышать эхо в горной местности труднее, чем на окаймленной лесом равнине.

Вы сейчас поймете, почему это происходит. Эхо — не что иное, как возвращение звуковых волн, отразившихся от какого-либо препятствия; как и при отражении света, угол падения “звукового луча” равняется углу его отражения. (Звуковой луч — направление, по которому бегут звуковые волны.)

Теперь вообразите, что вы находитесь у подножия горы (рис. 148), а препятствие, которое должно отразить звук, расположено выше вас, например в *AB*. Легко видеть, что звуковые волны, распространяющиеся по линиям *Ca*, *Cb*, *Cc*, отразившись, не достигнут вашего уха, а рассеются в пространстве по направлениям *aa*, *bb*, *cc*. Другое дело, если вы поместитесь на уровне препятствия или даже чуть выше него (рис. 149). Звук, идущий вниз по направлениям *Ca*, *Cb*, возвратится к вам по ломаным линиям *SaaC* или *CbbbC*, отразившись от почвы один или два раза. Углубление почвы между обоими пунктами еще более способствует отчетливости эха, действуя как вогнутое зеркало. Напротив, если почва между точками *C* и *B* выпукла, эхо будет слабое




Рис. 148. Эхо отсутствует.

и даже совсем не достигнет вашего уха: такая поверхность рассеивает лучи звука, как выпуклое зеркало.

Разыскивание эха на неровной местности требует известной сноровки. Даже найдя благоприятное место, надо еще уметь эхо вызвать. Прежде всего, не следует помещаться чересчур близко к препятствию: надо, чтобы звук прошел достаточно длинный путь, иначе эхо вернется слишком рано и сольется с самим звуком. Зная, что звук проходит около 340 м в секунду, легко понять, что, поместившись на расстоянии 85 м от препятствия, мы должны услышать эхо через полсекунды после звука.




Рис. 149. Отчетливое эхо.

Хотя эхо порождает “на всякий звук свой отклик в воздухе пустом”, но не на все звуки откликается оно одинаково отчетливо. Эхо не одинаково, “ревет ли зверь в лесу глухом, трубят ли рог, гремит ли гром, поет ли дева за холмом”. Чем резче, отрывистее звук, тем эхо отчетливее. Лучше всего вызвать эхо хлопаньем в ладоши. Звук человеческого голоса для этого менее пригоден, особенно голос мужчины; высокие тона женских и детских голосов дают более отчетливое эхо.

Звук вместо мерной ленты

Знанием скорости распространения звука в воздухе можно иной раз пользоваться для измерения расстояния до недоступного предмета. Такой случай описан Жюлем Верном в романе “Путешествие к центру Земли”. Во время подземных странствий два путешественника — профессор и его племянник — потеряли друг друга. Когда, наконец,

им удалось издали обменяться голосами, между ними произошел такой разговор:

— Дядя! — крикнул я (рассказ ведет племянник. — Я. П.).

— Что, дитя мое — услышал я спустя некоторое время.

— Прежде всего, как далеко мы друг от друга?

— Это не трудно узнать.

— Ваш хронометр цел?

— Да.

— Возьмите его в руки. Произнесите мое имя и точно заметьте секунду, когда начнете говорить. Я повторю имя, как только звук дойдет до меня, и вы тоже заметьте момент, когда до вас дойдет мой ответ

— Хорошо. Тогда половина времени, прошедшего между сигналами и ответом, покажет, сколько секунд употребляет звук, чтобы дойти до тебя. Ты готов?

— Да.

— Внимание! Я произношу твое имя.

Я приложил ухо к стене. Как только слово “Аксель” (имя рассказчика. — Я. П.) достигло моего слуха, я немедленно повторил его и стал ждать.

— Сорок секунд, — сказал дядя, — следовательно, звук дошел до меня в 20 секунд. А так как звук проходит в секунду одну треть километра, то это отвечает расстоянию почти в семь километров”.

Если вы хорошо поняли то, что рассказано в этом отрывке, вам легко будет самостоятельно решить такую задачу: я услышал свисток отдаленного паровоза спустя полторы секунды после того, как заметил белый дымок, которым был вызван этот звук; на каком расстоянии я находился от паровоза?

Звуковые зеркала

Стена леса, высокий забор, строение, гора — вообще всякая преграда, отражающая эхо, есть не что иное, как *зеркало* для звука; она отражает звук так же, как плоское зеркало отражает свет.

Звуковые зеркала бывают не только плоские, но и кривые. Вогнутое звуковое




Рис. 150. Вогнутые звуковые зеркала.

зеркало действует как рефлектор: сосредоточивает “звуковые лучи” в своем фокусе.

Две глубокие тарелки дают возможность проделать любопытный опыт этого рода. Поставьте одну тарелку на стол и в нескольких сантиметрах от ее дна поместите карманные часы. Другую тарелку держите у головы, близ уха, как изображено на рис. 150. Если положение часов, уха и тарелок найдено правильно (это удастся после ряда проб), вы услышите тиканье часов, словно исходящее от той тарелки, которую вы держите у головы. Иллюзия усиливается, если закрыть глаза: тогда положительно нельзя определить по слуху, где находятся часы.




Рис 151 Звуковые диковинки в древнем замке — говорящие бюсты.

Строители средневековых замков нередко создавали такие звуковые курьезы, помещая бюсты либо в фокусе вогнутого звукового зеркала, либо у конца переговорной трубы, искусно скрытой в стене. На рис. 151, заимствованном из старинной книги XVI века, можно видеть эти хитроумные приспособления: потолок в форме свода направляет к губам бюста звуки, приносимые извне трубой; огромные переговорные трубы, замурованные в здании, приносят разнообразные звуки со двора к каменным бюстам, размещенным у стен одного из залов. Посетителю такой галереи казалось, что мраморные бюсты шепчут, напевают и т. п.

Звуки в театральном зале

Кто много раз посещал различные театры и концертные залы, тому хорошо известно, что в смысле слышимости залы бывают с хорошей акустикой и с плохой акустикой; в одних помещениях голоса артистов и звуки музыкальных инструментов внятно слышны на далеком расстоянии, в других — звуки даже вблизи воспринимаются неотчетливо. Причина этого явления очень хорошо изложена в книге американского физика Вуда “Звуковые волны и их применения”^{*}.

“Любой звук, произведенный в здании, довольно долго раздастся по окончании звучания источника; вследствие многократных отражений он несколько раз обходит кругом здания, — а тем временем раздаются другие звуки, и слушатель часто не в состоянии уловить их в надлежащем порядке и в них разобраться. Так, например, если звук длится 3 секунды и оратор говорит со скоростью трех слогов в секунду, то звуковые волны, соответствующие 9 слогам, будут двигаться по комнате все вместе и создадут полную неразбериху и шум, из-за которого слушатель не сможет понимать оратора.

Оказавшемуся в таких условиях оратору остается говорить очень разборчиво и не слишком громко. Но обычно ораторы, как раз наоборот, стараются говорить громко и этим только усиливают шум”.

Еще не так давно сооружение театра с хорошей акустикой считалось делом счастливой случайности. В настоящее время найдены приемы успешной борьбы с нежелательной длительностью звука (называемой “реверберацией”), которая портит слышимость. В этой книге не место входить в подробности, интересные только для архитекторов. Отмечу лишь, что борьба с плохой акустикой состоит в создании поверхностей, поглощающих излишние звуки. Самым лучшим поглотителем звука является открытое окно (как лучшим поглотителем света служит отверстие); квадратный метр открытого окна принят даже за единицу, которой измеряется поглощение звука. Очень хорошо — хотя и вдвое хуже, нежели открытое окно, — поглощают звуки сами посетители театра: каждый человек равнозначен в этом отношении примерно половине квадратного метра открытого окна. И если правильно замечание одного физика, что “аудитория поглощает речь оратора в самом прямом смысле слова”, то не менее верно, что пустой зал неприятен для оратора также в непосредственном смысле слова.

^{*} Эта превосходная книга вышла в 1934 г. в русском переводе.

Если поглощение звука *слишком* велико, это также создает ухудшенную слышимость. Во-первых, чрезмерное поглощение приглушает звуки, во-вторых, уменьшает реверберацию до такой степени, что звуки слышатся как бы обрванными и производят впечатление некоторой сухости. Поэтому, если следует избегать слишком длительной реверберации, то и слишком короткая реверберация также нежелательна. Наилучшая величина реверберации для различных залов не одинакова и должна быть установлена при проектировании каждого зала.

В театре имеется и другой предмет, интересный с точки зрения физики: суфлёрская будка. Обратили ли вы внимание на то, что во всех театрах она имеет одну и ту же форму? Это оттого, что суфлёрская будка — своего рода физический прибор. Свод будки представляет собой вогнутое звуковое зеркало, имеющее двоякое назначение: задерживать звуковые волны, идущие из уст суфлёра в сторону публики, а кроме того, отражать эти волны по направлению к сцене.

Эхо со дна моря

Долгое время человек не извлекал из эха никакой пользы, пока не продуман был способ измерять с помощью эго глубину морей и океанов. Изобретение это возникло случайно. В 1912 г. затонул почти со всеми пассажирами огромный океанский пароход “Титаник”, — затонул от случайного столкновения с большой льдиной. Чтобы предупредить подобные катастрофы, пытались в туман или в ночное время пользоваться эхом для обнаружения присутствия ледяной преграды впереди судна. Способ на практике себя не оправдал, зато натолкнул на другую мысль: измерять глубину морей с помощью отражения звука от морского дна. Мысль оказалась очень удачной.

На рис. 152 вы видите схему установки. У одного борта корабля помещается в трюме, близ днища, патрон, порождающий при зажигании резкий звук. Звуковые волны несутся сквозь водную толщу, достигают дна моря, отражаются и бегут обратно, неся с собой эхо. Оно улавливается чувствительным прибором, установленным, как и патрон, у днища корабля. Точные часы измеряют промежуток времени между возникновением звука и приходом эха. Зная скорость звука в воде, легко вычислить расстояние до отражающей преграды, т.е. определить глубину моря или океана.

Эхолот, как называли эту установку, совершил настоящий переворот в практике измерения морских глубин. Пользование глубомерами прежних систем возможно было лишь с неподвижного судна и требовало много времени. Лотлинь приходится спускать с колеса, на котором он намотан, довольно медленно (150 м в минуту); почти так же медленно производится и обратный подъем. Измерение глубины в 3 км этим способом отнимает $3/4$ часа. С помощью эхолота то же измерение можно произвести в несколько секунд, на полном ходу корабля, получая при этом результат, несравненно более надежный и точный. Ошибка в этих измерениях не превосходит четверти метра (для чего промежутки времени определяются с точностью до 3000-й доли секунды).

Если точное измерение больших глубин имеет важное значение для науки океанографии, то возможность быстро, надежно и точно определять глубину в мелких местах является существенным подспорьем в мореплавании, обеспечивая его безопасность: благодаря эхолоту судно может смело и быстрым ходом приближаться к берегу.

В современных эхолотах применяются не обычные звуки, а чрезвычайно интенсивные “ультразвуки”, неслышимые человеческим ухом, с частотой порядка нескольких миллионов колебаний в секунду. Такие звуки создаются колебаниями кварцевой пластинки (пьезокварца), помещенной в быстропеременное электрическое поле ¹.




Рис. 152. Схема действия эхолота.

Жужжание насекомых

Почему насекомые часто издают жужжащие звуки? В большинстве случаев у них вовсе не имеется для этого никаких особых органов; жужжание, слышимое только при полете, обусловлено просто тем, что, летая, насекомые взмахивают крылышками несколько сотен раз в секунду. Крылышко — это колеблющаяся пластинка, а мы знаем, что всякая достаточно часто (чаще 16 раз в секунду) колеблющаяся пластинка порождает тон определенной высоты.

Теперь вы поймете, каким образом удалось узнать, сколько именно взмахов делает в секунду при полете то или иное насекомое. Для этого достаточно лишь определить по слуху высоту издаваемого насекомым тона, потому что каждому тону отвечает своя частота колебаний. С помощью “лупы времени” (см. гл. 1) удалось установить, что частота взмахов крыльев у каждого насекомого почти неизменна; регулируя полет, насекомое изменяет лишь величину взмаха (“амплитуду” колебаний) и наклон крыльев; число взмахов в секунду увеличивается лишь под влиянием холода. Вот почему и тон, издаваемый насекомым при полете, остается неизменным...²

Найдено, например, что комнатная муха (издающая при полете тон *Г*) делает в секунду 352 взмаха крылышками. Шмель взмахивает 220 раз в секунду. Пчела, издающая тон *А*, взмахивает крыльями 440 раз в секунду, когда она летит свободно, и всего 330 раз (тон *В*), когда летит нагруженная медом. Жуки, порождающие при полете более низкие тона, движут крыльями менее проворно. Напротив, комар делает крылышками 500—600 колебаний в секунду. Для сравнения заметим, что пропеллер самолета делает не более 40 оборотов в секунду.

Слуховые обманы

Если мы почему-либо вообразили, что источник легкого шума находится не вблизи нас, а значительно дальше, то звук покажется нам *гораздо громче*. Подобные иллюзии слуха случаются с нами довольно часто; мы только не всегда обращаем на них внимание.

Вот любопытный случай, который описал в своей “Психологии” американский ученый Уильям Джеймс:

“Однажды поздно ночью я сидел и читал; вдруг из верхней части дома раздался страшный шум, прекратился и затем, через минуту, снова возобновился. Я вышел в зал, чтобы прислушаться к шуму, но он там не повторился. Как только я успел вернуться к себе в комнату и сесть за книгу, снова поднялся тревожный, сильный шум, точно перед началом бури. Он доносился отовсюду. Крайне встревоженный, я снова вышел в зал, и снова шум прекратился.

Вернувшись во второй раз к себе в комнату, я вдруг открыл, что шум производила своим храпом маленькая собачка, спавшая на полу!..

При этом любопытно то, что, раз обнаружив истинную причину шума, я уже не мог, несмотря на все усилия, возобновить прежнюю иллюзию”.

Вероятно, читатель сможет припомнить подобные же примеры из своей жизни. Мне случалось наблюдать их неоднократно.

Где стрекочет кузнечик?

Очень часто мы ошибочно определяем не расстояние, а направление, в каком находится звучащий предмет.




Рис. 153. Где произведен выстрел: справа или слева?

Уши наши довольно хорошо различают, раздался ли звук выстрела справа или слева от нас (рис. 153). Но они зачастую бессильны определить положение источника звука, если он находится прямо впереди или позади нас (рис. 154): выстрел, произведенный впереди, нередко слышится как донесшийся сзади.

Мы способны в таких случаях отличать лишь — по силе звука — отдаленный выстрел от близкого.

Вот опыт, который может нас многому научить. Посадите кого-нибудь на стул посреди комнаты с завязанными глазами и попросите его сидеть спокойно, не поворачивая головы. Затем, взяв в руки две монеты, ударяйте ими одну о другую, оставаясь все время в той отвесной плоскости, которая “рассекает” голову вашего гостя пополам, между его глазами. Пусть испытуемый попробует угадать место, где щелкнули монеты. Результат получается прямо невероятный: звук произведен в одном углу комнаты, а испытуемый указывает на совершенно противоположную точку!



Рис. 154.
Где
произведен
выстрел?

Если вы отойдете от упомянутой плоскости симметрии головы в сторону, ошибки будут уже не так грубы. Это и понятно: теперь звук в ближайшем ухе вашего гостя слышен немного раньше и громче; благодаря этому испытуемый может определить, откуда исходит звук.

Этот опыт объясняет, между прочим, почему так трудно заметить стрекочащего в траве кузнечика. Резкий звук раздается в двух шагах от вас, справа от дорожки. Вы смотрите туда, но ничего не видите; звук доносится уже слева. Поворачиваете голову туда, но звук уже доносится из какого-нибудь третьего места. Чем быстрее поворачиваетесь вы в сторону стрекочащего звука, тем проворнее совершаются эти прыжки невидимого музыканта. На самом деле, однако, насекомое сидит на одном месте; его изумительные прыжки — плод вашего воображения, следствие обмана слуха. Ошибка ваша в том, что вы поворачиваете голову, помещая ее при этом как раз так, что кузнечик находится в плоскости симметрии вашей головы. При этом условии, как мы знаем, легко ошибиться в направлении звука: стрекотание кузнечика раздается впереди вас, но вы по ошибке относите его в противоположную сторону³.

Отсюда практический вывод: если хотите определить, откуда доносится звук кузнечика, пение кукушки и тому подобные отдаленные звуки, не поворачивайте лица на звук, а, напротив, отворачивайте его в сторону. Впрочем, мы это и делаем, когда, как говорится, “настораживаемся”.

СТО ВОПРОСОВ К ПЕРВОЙ КНИГЕ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА»

1. Во сколько раз улитка движется медленнее пешехода?
2. Какой рекордной скорости удалось достигнуть человеку?
3. Может ли человек перегнать Солнце в его суточном движении по небу?
4. Откуда произошло слово “миг”?
5. Как достигается то, что на киноэкране движение неестественно замедляется?
6. Когда обитатели земного шара движутся быстрее вокруг Солнца — в полдень или в полночь?
7. Почему верхние спицы катящегося колеса иногда сливаются для глаз, в то время как нижние видны отчетливо?
8. Какие точки движущегося паровоза перемещаются медленнее? Какие части движутся обратно?
9. Почему звезды кажутся нам перемещенными вперед по направлению движения Земли по ее орбите?
10. Почему, вставая со стула, мы либо подаемся туловищем вперед, либо пододвигаем под стул ноги?
11. Как объясняется особая походка старых моряков?
12. Чем отличается бег от ходьбы?
13. Как в случае необходимости надо прыгать из движущегося вагона? Приведите обоснование ответа.
14. Прославленный лгун Мюнхгаузен рассказывал, что он ловил летящие пушечные ядра. Является ли это безусловно невозможным?
15. Находясь в быстро мчащемся автомобиле, можно ли безнаказанно ловить бросаемые в него предметы?
16. Весит ли падающее тело больше или меньше, нежели покоящееся?

17. Всякий ли брошенный вверх предмет должен упасть обратно на Землю?

18. Правильно ли описано в романе Жюль Верна “Из пушки на Луну” то, что происходило внутри летящего снаряда?

19. Можно ли верно взвесить на неверных весах, имея верные гири? А на верных весах, имея неверные гири?

20. Выгодно ли для нас то, что кости скелета работают как рычаги в условиях, когда большой силой преодолевается малое сопротивление?

21. Почему лыжник не проваливается на рыхлом снегу?

22. Почему не жестко лежать в веревочном гамаке?

23. Как была осуществлена немцами стрельба на 115 километров во время первой мировой войны?

24. Почему поднимается вверх бумажный змей?

25. Когда камень падает в воздухе с большой высоты, летит ли он все время с возрастающей скоростью?

26. Какой наибольшей скорости достигает тело человека, падающего с нераскрытым парашютом?

27. Чем объясняется причудливый полет бумеранга?

28. Можно ли, не разбивая скорлупы яйца, узнать, сырое оно или вареное?

29. Где вещи тяжелее: в местах, близких к экватору или близких к полюсу?

30. Когда семя прорастает на ободке вращающегося колеса, в какую сторону направляется корешок ростка?

31. Есть ли различие между “вечным движением” и “вечным двигателем”?

32. Были ли успешные попытки построить вечный двигатель?

33. С какой стороны погруженное в жидкость тело испытывает наибольшее давление: сверху, с боков или снизу?

34. Становится ли озеро тяжелее, когда по нему плавает лодка?

35. Какую форму должна принять жидкость, не имеющая веса? Можно ли проверить ответ на опыте?

36. Почему капли дождя круглые?

37 Верно ли, что керосин просачивается сквозь стекло и металлы? Почему возникло такое убеждение?

38. Можно ли добиться того, чтобы стальная игла плавала на воде?

39. Что такое флотация?

40. Почему мыло смывает грязь?

41. Почему мыльный пузырь взлетает вверх? В каком помещении он поднимается быстрее — в холодном или теплом?

42. Что тоньше и примерно во сколько раз: человеческий волос или стенка мыльного пузыря?

43. Если на тарелку с водой поставить вверх дном стакан с зажженной в нем бумажкой, то вода скоро соберется под стакан. Почему?

44. Почему вода поднимается вверх, когда ее втягивают через соломинку?

45 На весах уравновешены кусок дерева и гири. Сохранится ли равновесие, если поместить эти веса под колокол воздушного насоса и откачать воздух?

46. Есть ли различие между вечным и даровым двигателями? Удавалось ли кому-либо построить даровой двигатель?

47. Какое повреждение угрожает рельсовому пути в сильный зной? А в сильный мороз? Как удастся ликвидировать опасность?

48. В какое время года телеграфные и телефонные провода сильнее всего провисают?

49 Какие стаканы чаще растрескиваются от горячей воды — толстостенные или тонкостенные? А от холода?

50 Почему стаканы с толстым дном не годятся для чая?

51. Из какого прозрачного материала лучше всего делать посуду, чтобы она не трескалась от тепла и от холода?

52. Почему трудно надеть сапог на разгоряченную ногу?

53 Возможно ли сделать часы, которые не приходилось бы заводить?

54 Можно ли на том же принципе делать крупные механизмы?

55 Почему дым поднимается вверх?

56. Как поступите вы, если пожелаете охладить льдом бутылку лимонада?

57. Ускорится ли таяние льда, если обернуть его мехом?

58. Верно ли, что снег греет землю?

59. Почему в подземных трубах вода зимой не замерзает?

60. Где в Ленинградской области бывает в июле зима?

61. Почему в паяной посуде можно кипятить воду и посуда не распаивается от огня?

62. Почему в сильный мороз сани по снегу плохо скользят?

63. Почему в оттепель снежки получаются хорошие, а в мороз рассыпаются?

64. Почему на крышах неотапливаемых зданий образуются ледяные сосульки?

65. Отчего в экваториальных странах теплее, чем в полярных?

66. Как изменился бы момент восхода Солнца, если бы свет распространялся мгновенно?

67. Изменилось бы действие телескопов и микроскопов, если бы свет во всякой среде распространялся мгновенно?

68. С какой силой давят солнечные лучи на перпендикулярную к ним поверхность площадью в 1 гектар?

69. Можно ли заставить лучи света обходить преграды?

70. Чтобы лучше видеть свое лицо в зеркале, куда надо поместить лампу: впереди себя или позади себя?

71. Есть ли полное сходство между нашим лицом и его отражением в плоском зеркале?

72. Можно ли извлечь практическую пользу из калейдоскопа?

73. Как с помощью льда добыть огонь?

74. Случается ли наблюдать миражи в наших широтах?

75. Что такое "зеленый луч"?

76. Как надо рассматривать фотоснимки?

77. Почему фотоснимки приобретают рельефность и глубину при рассматривании через выпуклое стекло или в вогнутом зеркале?

78. Почему в кинотеатре картины лучше всего видны из средних рядов?

79. Почему на картины живописцев лучше смотреть, закрыв один глаз?

80. Каков принцип действия стереоскопа?

81. Можно ли уподобить свое зрение зрению сказочного великана?

82. Что такое стереотруба?

83. Чем обусловлен блеск?

84. Почему ландшафт кажется более рельефным, если рассматривать его из окна мчащегося вагона?

85. Придумайте опыт, в котором можно было бы видеть цветные тени.

86. На чем основан эффект, называемый “чудеса теней”?

87. Какого цвета кажется красный флаг при синем освещении?

88. Объясните значение слов “иррадиация” и “астигматизм”.

89. Бывают портреты, которые словно следят за вами глазами. Как это объясняется?

90. Яркие звезды кажутся крупнее: нормальному глазу или близорукому?

91. Вы услышали эхо спустя 1,5 секунды после того, как вы хлопнули в ладоши. Как далеко от вас преграда?

92. Существуют ли звуковые зеркала?

93. Где звук распространяется быстрее: в воздухе или в воде?

94. Укажите техническое применение эха.

95. Почему жужжит пчела?

96. Почему трудно разыскать стрекочащего возле нас кузнечика?

97. Передается ли звук в безвоздушном пространстве?

98. Что такое звуковой стереоэффект?

99. Что общего между звуком и светом?

100. Зачем человеку два уха?

ДОПОЛНЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА

К главе первой

¹ Скорость бега тренированного человека, зависящая, конечно, от дистанции, может в несколько раз превышать скорость пешехода. Например, на стометровке спортсмен развивает скорость, почти в шесть-семь раз большую (около 10 м в секунду), чем у пешехода. Удивительными являются результаты бега людей на большие расстояния. Так, в 1981 г. французский спортсмен 33-летний Роман Забало пробежал 506 км — расстояние между городами Флоранс и Монпелье. Для этого ему понадобилось немногим более 61 часа (средняя скорость — около 2,3 м в секунду). После финиша марафонец сказал, что рад был доказать возможность человека бегом преодолеть дистанцию, превышающую 500 км.

² Богата история рекордов скорости, установленных человеком на различных машинах и аппаратах. Но среди всех рекордов есть один особый: 12 апреля 1961 г. наш соотечественник Юрий Гагарин совершил первое в мире космическое путешествие вокруг Земли, двигаясь в безвоздушном пространстве по орбите искусственного спутника со скоростью около 8 км в секунду, т. е. со скоростью, почти в 24 раза превышающей скорость звука в воздухе (около 330 м в секунду). Так быстро до Гагарина не летал ни один человек.

³ Города не лежат на одной параллели. Нетрудно показать, что линейная скорость вращения Земли на широте 45° примерно равна скорости звука в воздухе (при 0 °С). В более высоких широтах можно “перегнать Солнце” на самолете, не преодолевая звуковой барьер.

⁴ Мелкие комарики цератоногониды делают и 1000 взмахов в секунду.

⁵ Удобнее эту величину записать как 10^{-10} с = 0,1 нс. Измерения интервалов времени и исследования событий в

наносекундном диапазоне ($1 \text{ нс} = 10^{-9} \text{ с}$) уже давно проводятся в науке и технике. В настоящее время экспериментаторы осваивают так называемый пикосекундный диапазон ($1 \text{ пс} = 10^{-12} \text{ с}$). По сравнению с пикосекундой тысячная доля секунды — это все равно что целая “вечность” для одной секунды: ведь один век длится примерно $\pi \cdot 10^9 \text{ с}$.

⁶ Плоскость земного экватора наклонена к плоскости орбиты под углом $23,5^\circ$. Поэтому, строго говоря, линейные скорости орбитального движения и вращения поверхности Земли могут складываться точно по абсолютной величине только два раза в году: в определенное время в дни летнего и зимнего солнцестояния. В другие дни при сложении скоростей надо учитывать, что вектора скоростей образуют между собой некоторый угол, изменяющийся не только в течение суток, но и при смене времен года.

⁷ На самом деле не только нижние точки края, но и все точки колеса, расположенные ниже уровня рельса, имеют горизонтальную составляющую скорости, направленную против движения. Любители математики легко могут проверить это.

К главе второй

¹ Вдумчивый читатель должен помнить, что эта статья написана Я. И. Перельманом еще в начале XX века, когда скорость движущегося вагона была соизмеримой со скоростью бега тренированного спортсмена на короткие дистанции. В наше время не рекомендуется прыгать из вагона на ходу, так как скорость транспорта с тех пор существенно возросла.

² А импульс арбуза (в системе координат, связанной с автомобилем) на порядок больше импульса пули:

$$p_{\text{арбуз}} \approx 10^2 \text{ кг} \cdot \text{м/с}, \quad p_{\text{пули}} \approx 10 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$$

³ Столкновения самолетов с птицами, приводящие иногда к катастрофам, — одна из проблем современной авиации. О пернатых “бомбах” подробно написано в рассказе “Пилот, берегись птиц!” (см.: *Акимушкин И.* Причуды природы. — М.: Мысль, 1981).

⁴ Весом тела P называется сила, с которой это тело действует на подставку (чашку весов), на которой оно лежит, или на подвес, к которому оно подвешено. При этом предполагается, что тело и подставка (или подвес) покоятся относительно той системы отсчета, в которой производится взвешивание, — обычно относительно Земли. Так определяется вес во многих учебниках, и Я. И. Перельман в своих рассуждениях следует именно такой формулировке.

Тело давит на опору (или натягивает подвес) вследствие гравитационного притяжения тела к Земле под действием силы тяжести. Из-за вращения Земли (или любого другого вида движения с ускорением) и архимедовой выталкивающей силы (при взвешивании тела в воде или в воздухе) вес тела отличается от силы тяжести. Если же не учитывать этих поправок к весу, то вес неподвижного тела численно равен силе тяжести. (Не следует только забывать, что по определению эти две силы приложены к разным объектам: сила тяжести действует на тело, а вес — на подставку (или подвес)!) Вот почему иногда в литературе под весом тела имеют в виду силу притяжения тела к Земле, а не силу, действующую на подставку (см., например, книгу: *Эллиот Л., Уилкоккс У. Физика.*— М.: Наука, 1975). Однако такое определение веса не является в настоящее время общепринятым.

⁵ Почти ровно через 100 лет после публикации романа Жюль Верна “Из пушки на Луну” американский космонавт Нейл Армстронг первым из жителей Земли коснулся лунного грунта (июль 1969 г.). Теперь, после запуска искусственных спутников Земли, полетов человека в космос, успешных лунных миссий кораблей “Аполлон” и длительных экспедиций космонавтов на орбитальных станциях, стало очевидно, что для космических путешествий будут использоваться ракеты, а не снаряды. Однако движение ракеты с выключенным двигателем в космосе подчиняется тем же законам, что и движение артиллерийского снаряда Жюль Верна.

⁶ В настоящее время технически возможно вывести на земную орбиту снаряд выстрелом из сверхдальнобойного орудия — электромагнитной пушки.

⁷ Условия работы и быта в невесомости сейчас хорошо известны из рассказов космонавтов, из кинофильмов, заснятых в космосе. Явления в состоянии невесомости многие читатели наблюдали на телевизионных экранах во время прямых передач с борта космических кораблей. Специальному рассмотрению проблемы невесомости посвящены книги *Хайкин С. Э.* Силы инерции и невесомость — М. Наука, 1967, *Левантовский В. И.* Тяжесть, невесомость, перегрузка.— М. Знание, 1965; *Варваров Н. А.* Популярная космонавтика.— М. Машиностроение, 1981

К главе третьей

¹ Летом 1918 г. известный русский артиллерист-ученый В. М. Трофимов представил командованию Красной Армии несколько докладов, в которых были рассмотрены принципы стрельбы на сверхдальные расстояния. Как стало известно после войны, расчеты нашего ученого совпадали с данными немецкого орудия

² Строго говоря, сила аэродинамического давления *ОС*, действующая на змею, не перпендикулярна его плоскости. Горизонтальную составляющую этой силы *ОД* авиаторы называют обычно лобовым сопротивлением, а вертикальную *ОР* — подъемной силой. В равновесии, когда змея летит на одной и той же высоте с постоянной скоростью (как в ветреную, так и в безветренную погоду), лобовое сопротивление, подъемная сила, натяжение шнура и сила тяжести змея уравновешены, т. е. векторная сумма этих сил равна нулю.

³ Используя восходящие потоки теплого воздуха, тагуан пролетает над лесными долинами почти полверсты, т. е. несколько сот метров (см. книгу: *Акимушкин И.* Причуды природы.— М.: Мысль, 1981).

⁴ Интересующиеся этим вопросом см. книгу: *Кайтанов К.* Повесть о парашюте.— М.: Детская литература, 1981

⁵ Установившаяся скорость падения в действительности даже уменьшается со временем из-за увеличения плотности воздуха при приближении тела к Земле.

⁶ Строго говоря, боевой или охотничий бумеранг в случае промаха не возвращается. О разных типах буме-

рангов, их форме и полете читатель может узнать из статьи Гесс Ф. Бумеранг — В кн. Опыты в домашней лаборатории / Под ред. И. К. Кикоина, — М.: Наука, 1980 — (Библиотечка “Квант”, вып. 4)

К главе четвертой

¹ Быстро вращающееся вареное яйцо может “развернуться”, встав вертикально на один из острых концов. Впрочем, вы можете даже сразу заставить крутое яйцо вращаться в таком положении. Но с яйцом сырым вам вряд ли удастся это проделать.

² Для любителей экспериментировать отметим, что в опыте вместо резинового колечка удобно использовать липкую ленту.

³ Взрослое растение на быстро вращающемся колесе ведет себя иначе. Для больших растений, соизмеримых с радиусом колеса, становится существенной неоднородность искусственной силы тяжести, что приводит к тем же явлениям, которые уже рассматривались в этой главе (когда речь шла о центробежном эффекте). Кроме того, на растение может оказывать влияние искусственный ветер, возникающий при быстром вращении колеса. Поэтому рис. 41 следует рассматривать лишь как условный, который, однако, вполне соответствует действительности, когда растение мало.

⁴ В наше время возникла новая экспериментальная наука — космическая ботаника, изучающая влияние искусственной тяжести и невесомости на рост растений. Нашими учеными и космонавтами был проведен целый цикл исследований на центрифугах и в условиях длительной невесомости на орбитальных станциях, доказавший фундаментальное значение гравитации в жизни растений на всех этапах его развития. Уже на уровне клетки протекающие в ней процессы могут зависеть от силы тяжести.

⁵ Что касается вечного движения, то под этим выражением подразумевается непрекращающееся движение без совершения работы.

⁶ Невозможность устройства вечного двигателя обсуждалась Леонардо да Винчи, Кардано, Стевином,

Галилеем, Декартом, Гюйгенсом и другими учеными. Многовековой спор о вечном двигателе и неудачные попытки его создания оказали плодотворное влияние на установление закона сохранения энергии.

К главе пятой

¹ Можно предложить другое объяснение факта, почему древние римляне строили такие “дорогие” акведуки. У них просто не было подходящих труб! Сообщающиеся сосуды с большим перепадом высот — это водопровод с толстыми герметическими трубами (и уплотнениями), способными выдерживать относительно большое давление воды. Водопровод каменной кладки “дешевле” в эксплуатации, когда вода течет по желобу или трубе на поверхности, образуя искусственный сток из-за перепада высот.

² Для опыта можно использовать любую жесткую трубку с ровными краями на торце.

³ Речь идет об известной задаче, которая имеет собственное название “гидростатический парадокс”.

⁴ Для опыта Плато подойдет также подсолнечное масло, если под рукой нет оливкового. Обратите внимание на то, что если маленький стакан (вместо него можно использовать наперсток) не сполоснуть водой, то опыт может не удался. И наоборот, эксперимент легче выполнить, если налить в маленький стакан чуть-чуть воды, а потом уже добавить масло.

При некоторых условиях в этом опыте наблюдается граница раздела воды и спирта, когда две жидкости не перемешаны. В этом случае все плавающие в большом стакане масляные капли как бы зависают на одной глубине, а большой масляный шар приобретает сплюснутую форму. Без принудительного перемешивания граница раздела воды и спирта исчезает медленно.

Если нет чистого спирта, опыт Плато можно проделать с каким-либо готовым спиртовым раствором. В таком случае лучше использовать касторовое масло, плотность которого не так сильно отличается от плотности воды, как подсолнечного.

⁵ При комнатной температуре анилин всплывает в растворе, приготовленном из 40 г поваренной соли на 1 л воды. Опыт с анилином надо проводить осторожно. Пары этого вещества вредные.

⁶ При равномерном движении сила тяжести капли уравновешивается силой сопротивления воздуха, которая является функцией скорости, размера капли и плотности воздуха. Более детальное рассмотрение задачи требует учета изменения массы капли, падающей во влажной атмосфере.

⁷ Большой температурный коэффициент расширения — это особенность многих горючих жидкостей, а не только керосина.

⁸ Можно воспользоваться тонкой полимерной пленкой, например кусочком целлофана.

⁹ Проще всего опыт получается с монетой из алюминиевого сплава.

¹⁰ Закон Архимеда в обычной форме при действии на тело капиллярных сил не применим. Под плавающей иглой, которая не смачивается водой, поверхность жидкости прогибается, и выталкивающая сила (результат гидростатического давления) определяется глубиной, на которую погружается плавающая игла.

¹¹ Много интересных и красивых опытов с мыльными пленками описано в книге: *Курант Р., Роббинс Г.* Что такое математика. — М.; Л.: ОГИЗ, 1947. Заинтересованный читатель найдет там также еще один рецепт жидкости для изготовления прочных пузырей.

¹² Эффект в значительной степени определяется температурной зависимостью поверхностного натяжения раствора. При сильном морозе пузырь лопается.

¹³ Современные воронки из прессованной пластмассы, которые используются в быту, сделаны как раз с учетом этих пожеланий

¹⁴ Соответственно на 2,5 кг масса дерева больше массы железа, хотя в воздухе вес этих тел одинаков и равен 1 тс. Это последнее обстоятельство и подразумевалось в условии задачи. Если бы говорилось о равенстве масс железа и дерева, то при взвешивании в воздухе вес дерева оказался бы меньше веса железа. Действительно, дерево

имеет больший объем. Следовательно, выталкивающая сила воздуха, уменьшающая вес, для дерева больше, чем для железа. И тонна дерева в такой постановке задачи оказалась бы легче тонны железа.

К главе шестой

¹ Существующий сейчас способ укладки рельсов на железобетонные шпалы позволяет реализовать так называемое “бесстыковое” железнодорожное полотно: рельсы длиной в сотни метров и без стыков. (К месту будет сказано, что на Октябрьской железной дороге полотно уложено именно таким образом.) Почему же такая дорога не разрушается в жаркий день? А просто потому, что нагретые рельсы, которые бы удлинились, будь они “свободными” (т. е. с зазорами между рельсами), теперь не удлиняются, а находятся вместе со шпалами в напряженном состоянии. При этом нагрузки, которые “принимает” на себя железнодорожное полотно, не превышают критическую величину, или так называемый предел устойчивости. При существующем перепаде температур линейные деформации полотна (изгибы) еще малы и не служат помехой движению поездов. Если представить, что каким-либо образом шпалы на “бесстыковой” железной дороге удалось бы убрать, то в жаркий день рельсы, находясь в напряженном состоянии, “сыграли” бы, образовав в некоторых местах волнистую “змейку”.

² Серебряная ложка обжигает пальцы не потому, что теплопроводность серебра больше, чем меди (разница меньше 10 %), а потому, что теплоемкость серебра почти в 2 раза меньше, чем меди, поэтому при одном и том же потоке тепла (а это условие для одинаковых ложек приблизительно выполняется) серебро нагревается до более высоких температур, чем медь. Заметим, что старые медные ложки, иногда еще встречающиеся в обиходе, покрыты тонким слоем олова и поэтому по виду напоминают серебряные.

³ Если огонь потухает, воздух охлаждается и сжимается, вода из ведра выливается в сосуд, и дверь под действием противовеса опять закрывается. На рис. 73 это обстоятельство не отмечено.

⁴ Известно много образцов самозаводящихся часов, сходных с описанным механизмом или же построенных по другому принципу. Сейчас выпускаются наручные часы с подзаводом маятникового типа. Неравномерность движения человека при обычных его перемещениях вполне достаточна для завода таких часов.

⁵ Из-за того, что у вертушки есть складки (т. е. она не плоская), геометрический центр (центр симметрии) не совпадает с центром тяжести, который находится вне бумажки. Поэтому, строго говоря, следует написать так:

“Перегните листок по средним линиям и снова расправьте, оставив небольшие изломы на складках: вы будете знать, где находится геометрический центр вашей фигуры (центр симметрии).

...Бумажка останется в равновесии: ее центр тяжести и точка опоры находятся на одной вертикали, причем, как бывает всегда при устойчивом равновесии, центр тяжести бумажки ниже точки опоры. Но от малейшего дуновения бумажка начнет вращаться на острие”.

⁶ Если вращение почему-либо не наблюдается, то, вероятнее всего, вы взяли слишком толстую и тяжелую бумажку для этого эксперимента. Попробуйте приготовить другую вертушку.

⁷ На рис. 82 показан верх одной из наиболее популярных в прошлом моделей керосиновой лампы с абажуром.

⁸ Обычные сорта бумаги обугливаются при такой температуре. Поэтому опыт рекомендуется проводить с оловом (температура плавления 232 °С) или каким-либо легкоплавким припоем.

⁹ Детальный анализ задачи о скольжении конькобежца по льду в морозную погоду должен проводиться с учетом важного механизма теплопередачи от замерзающей воды к полозьям коньков, так как при замерзании воды при атмосферном давлении ее температура повышается до 0 °С и тепло (скрытая теплота плавления льда) передается стальным полозьям коньков, сравнительно хорошо проводящим тепло. Поэтому температура полозьев выше, чем температура окружающего воздуха. Ссылку на этот эффект заинтересованный читатель может найти, например, в книге: *Уокер Дж. Физический фейерверк.* — М.: Мир,

1979.

¹⁰ Аналогичным свойством обладают висмут, галлий, сурьма и германий, а также некоторые сплавы, например чугун, у которых, как и у льда, температура плавления понижается с ростом давления.

¹¹ Протоптаные дорожки покрываются льдом не из-за добавочного давления пешеходов (оно сравнительно мало!), а по другой причине. Чистый спрессованный снег — это еще не лед, сколько бы по нему ни ходили люди. Но в оттепель верхний слой дорожки тает. Вода легко впитывается снегом, и потом уже, при морозе, образуется прочный ледяной наст. Таяние снега на дорожке может происходить не при 0 °С, а при более низкой температуре воздуха. Дело в том, что дорожки часто бывают более “грязными”, чем окружающий снег. В таком случае под солнцем темные участки легко прогреваются, и снег тает даже на морозе (см. гл. 8, с. 162). При этом сразу же образуется ледяная корка. Когда мы лепим снежок, то в какой-то степени воспроизводим этот процесс. Только роль солнца теперь выполняют наши теплые ладони.

К главе седьмой

¹ Искусство силуэта было известно с древности в Китае, Японии и других странах Азии.

² Писатель-фантаст Артур Ч. Кларк, хорошо известный нашим читателям, написал в 1965 г. рассказ “Солнечные паруса”, в котором реализована идея путешествия человека в межпланетном пространстве на необычном “паруснике”, приводимом в движение давлением солнечного света. Выгодное отношение площади поверхности к массе корабля, по замыслу Кларка, достигается применением “парусов” из сверхтонкого (почти невесомого!) металлизированного пластика площадью в несколько квадратных километров.

К главе восьмой

¹ Деление поверхностей на зеркальные и матовые является условным и зависит от многих обстоятельств, и прежде всего от величины угла падения света. При скольжении падения матовая поверхность может отражать свет

как зеркальная. По известной характерной высоте неровностей на поверхности для монохроматического излучения с известной длиной волны удастся приближенно определить критический угол, при котором матовое (или, как говорят, диффузное) отражение сменяется зеркальным, если угол падения увеличивается.

² Рассказ о пленнике, который был подвергнут этой ухищренной пытке, приводится в первых изданиях “Занимательной физики”.

³ Участники одной из антарктических экспедиций наблюдали зеленый луч в течение 35 мин, когда Солнце, впервые появившееся в конце долгой полярной зимы, двигалось почти параллельно по линии горизонта. Этот случай описан в книге: *Уокер Дж.* Физический фейерверк.— М.: Мир, 1979. Много интересного о миражах и зеленом луче читатель может узнать из книги: *Миннарт М.* Свет и цвет в природе.— М.: Физматгиз, 1958.

К главе девятой

¹ Здесь мы рекомендуем обратиться к произведению Ч. Диккенса в переводе А. В. Кривцовой и Е. Ланна.— Собр. соч., т. 3, с. 134.

² Об истории изобретения фотографии можно прочесть в книге *Кравец Т. П.* От Ньютона до Вавилова.— М.: Наука, 1967.

³ В последующем тексте автор имеет в виду фотокамеры таких типов, которые были распространены в период создания “Занимательной физики”. Сейчас встретить такие камеры у фотолюбителей— большая редкость.

⁴ Это явление носит название монокулярного стереоэффекта.

⁵ Для первого знакомства со стереоэффектом качество стереопар должно быть достаточно высоким. Фотографические стереопары, которые любой фотолюбитель может изготовить самостоятельно, производят несравненно большее впечатление, чем рис. 128 и 129 (см., например, книгу: *Власенко В. И.* Техника объемной фотографии.— М.: Искусство, 1978).

⁶ Интересно отметить, что при рассматривании каждым глазом по отдельности (например, с помощью стереоско-

па) двух совершенно идентичных плоских картин или фотографий у наблюдателя появляется некоторое ощущение глубины образа. Это ощущение псевдообъема неодинаково у разных людей и, видимо, определяется прежде всего некоторой асимметрией зрения правого и левого глаза. Играть роль также способ освещения “стереопар”.

⁷ Другое объяснение этой иллюзии читатель найдет в книге: *Толанский С.* Оптические иллюзии.— М.: Мир, 1967.

К главе десятой

¹ Первый такой передатчик ультразвука сконструировал Поль Ланжевен в 1916 г.

² О том, как издают звуки насекомые, и о многом другом интересном из области акустики читатель может узнать из книги: *Брэгг У.* Мир света. Мир звука.— М.: Наука, 1967.

³ “Способность” людей ошибаться в определении направления распространения звука и расстояния до звучащего тела используют иногда некоторые иллюзионисты в своих выступлениях перед публикой.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА

**КНИГА
2**

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ТРИНАДЦАТОМУ ИЗДАНИЮ

Эта книга представляет собой самостоятельный сборник, не являющийся прямым продолжением первой книги “Занимательная физика”. Успех первого сборника побудил автора обработать остальной накопившийся у него материал, и таким образом составила эта вторая или, вернее, другая книга, охватывающая те же разделы физики.

В предлагаемой книге, как и в первой, составитель стремится не столько сообщить новые знания, сколько оживить и освежить те простейшие сведения по физике, которые у читателя уже имеются. Цель книги — возбудить деятельность научного воображения, приучить мыслить в духе физики и развить привычку к разностороннему применению своих знаний. Поэтому в “Занимательной физике” отводится описанию эффектных опытов второстепенное место; на первый же план выдвигаются физические головоломки, интересные задачи, поучительные парадоксы, замысловатые вопросы, неожиданные сопоставления из области физических явлений и т. п. В поисках такого материала составитель обращается к кругу явлений обиходной жизни, к области техники, к природе, к страницам научно-фантастических романов, — словом, ко всему, что, находясь за пределами учебника и физического кабинета, способно привлечь внимание любознательного читателя.

Предназначая книгу не для изучения, а для чтения, составитель старался, насколько умел, придать изложению и внешне интересную форму, исходя из того, что интерес к предмету повышает внимание, усиливает работу мысли и, следовательно, способствует более сознательному усвоению.

Для оживления интереса к физическим расчетам в некоторые статьи этого сборника введен вычислительный материал (чего в первой книге почти не делалось).

В общем, настоящий сборник по подбору материала предназначается для несколько более подготовленного читателя, нежели первая книга “Занимательная физика”

хотя различие в этом отношении между обеими книгами настолько незначительно, что их можно читать в любой последовательности и независимо одну от другой.

Третьей книги “Занимательная физика” не существует. Взамен ее автором составлены следующие книги: “Занимательная механика”, “Знаете ли вы физику” и, кроме того, отдельная книга, посвященная вопросам астрономии: “Занимательная астрономия”.

1936 г.

Я. Перельман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ

Самый дешевый способ путешествовать

Остроумный французский писатель XVII века Сирано де Бержерак в своей сатирической “Истории государств на Луне и Солнце” рассказывает, между прочим, о таком будто бы происшедшем с ним удивительном случае. Занимаясь физическими опытами, он однажды непостижимым образом был поднят вместе со своими склянками высоко в воздух. Когда же через несколько часов ему удалось спуститься вновь на Землю, то, к изумлению, очутился он уже не в родной Франции и даже не в Европе, а на материке Северной Америки, в Канаде! Свой неожиданный перелет через Атлантический океан французский писатель, однако, находит вполне естественным. Он объясняет его тем, что, пока невольный путешественник был отделен от земной поверхности, планета наша продолжала по-прежнему вращаться на восток; вот почему, когда он опустился, под ногами его вместо Франции оказался уже материк Америки.

Казалось бы, какой дешевый и простой способ путешествовать! Стоит только подняться над Землей и продержаться в воздухе хотя бы несколько минут, чтобы опуститься уже совершенно в другом месте, далеко к западу. Вместо того чтобы предпринимать утомительные путешествия через материки и океаны, можно неподвижно висеть над Землей и выжидать, пока она сама подставит путнику место назначения.

К сожалению, удивительный способ этот — не более как фантазия. Во-первых, поднявшись в воздух, мы, в сущности, не отделяемся еще от земного шара: мы остаемся связанными с его газообразной оболочкой, висим в его атмосфере, которая тоже ведь участвует во вращении Земли вокруг оси (рис. 1). Воздух (вернее, его нижние более плотные слои) вращается вместе с Землей, увлекая с собой все, что в нем находится: облака, самолеты, летящих птиц, насекомых и т. д. Если бы воздух не участвовал во вращении

земного шара, то, стоя на Земле, мы постоянно чувствовали бы сильнейший ветер, по сравнению с которым самый страшный ураган казался бы нежным дуновением *. Ведь совершенно безразлично: стоим ли мы на месте, а воздух движется мимо нас, или же, наоборот, воздух неподвижен, а мы перемещаемся в нем; в обоих случаях мы ощущаем одинаково сильный ветер. Мотоциклист, движущийся со скоростью 100 км/ч, чувствует сильнейший встречный ветер даже в совершенно тихую погоду.

Это во-первых. Во-вторых, если бы даже мы могли поднять-




Рис. 1 Можно ли с аэростата видеть, как вращается земной шар?

ся в верхние слои атмосферы или если бы Земля вовсе не была окружена воздухом, нам и тогда не удалось бы воспользоваться тем дешевым способом путешествовать, о котором фантазировал французский сатирик. В самом деле, отделяясь от поверхности вращающейся Земли, мы продолжаем по инерции двигаться с прежней скоростью, т. е. с той же, с какой перемещается под нами Земля. Когда же мы снова опускаемся вниз, мы оказываемся в том самом месте, от которого раньше отделились, подобно тому как, подпрыгнув в вагоне движущегося поезда, мы опускаемся на прежнее место. Правда, мы будем двигаться по инерции прямолинейно (по касательной), а “место под нами” — по дуге; но для небольших промежутков времени это не меняет дела.

* Скорость урагана 40 м/с (144 км/ч)¹. Земной же шар на широте, например, Ленинграда проносил бы мимо нас воздух со скоростью 230 м/с (828 км/ч)!

“Земля, остановись!”

У известного английского писателя Герберта Уэллса есть фантастический рассказ о том, как некий конторщик творил чудеса. Весьма недалекий молодой человек оказался волей судьбы обладателем удивительного дара: стоило ему высказать какое-нибудь пожелание, и оно немедленно исполнялось. Однако заманчивый дар, как оказалось, не принес ни его обладателю, ни другим людям ничего, кроме неприятностей. Для нас поучителен конец этой истории.

После затянувшейся ночной попойки конторщик-чудодей, опасаясь явиться домой на рассвете, вздумал воспользоваться своим даром, чтобы продлить ночь. Как это сделать? Надо приказать светилам неба приостановить свой бег. Конторщик не сразу решился на такой необычайный подвиг, и когда приятель посоветовал ему остановить Луну, он, внимательно поглядев на нее, сказал в раздумье:

— Мне кажется, она слишком далеко для этого... Как вы полагаете?

— Но почему же не попробовать? — настаивал Мейдиг (так звали приятеля. — *Я. П.*). — Она, конечно, не остановится, вы только прекратите вращение Земли. Надеюсь, это никому не повредит!

— Гм, — сказав Фотерингей (конторщик. — *Я. П.*). — Хорошо, попробую. Ну...

Он стал в повелительную позу, простер руки над миром и торжественно произнес:

— Земля, остановись! Перестань вращаться!

Не успел он договорить эти слова, как приятели уже летели в пространство со скоростью нескольких дюжин миль в минуту.

Несмотря на это, он продолжал думать. Меньше чем в секунду он успел и подумать и высказать про себя следующее пожелание:

— Что бы ни случилось, пусть я буду жив и невредим!

Нельзя не признать, что желание это было высказано вовремя.

Еще несколько секунд, — и он упал на какую-то свежевырытую землю, а вокруг него, не принося ему никакого вреда, неслись камни, обломки зданий, металлические предметы разного рода; летела и какая-то несчастная корова, разбившаяся при ударе о землю. Ветер дул со страшной силой; он не мог даже приподнять голову, чтобы оглянуться вокруг.

— Непостижимо, — воскликнул он прерывающимся голосом. — Что случилось? Буря, что ли? Должно быть, я что-нибудь не так сделал.

Осмотревшись, насколько позволял ему ветер и развевавшиеся фалды пиджака, он продолжал:

— На небе-то, кажется, все в порядке. Вот и Луна. Ну, а все остальное... Где же город? Где дома и улицы? Откуда взялся ветер? Я не приказывал быть ветру.

Фотерингей попробовал встать на ноги, но это оказалось совершенно невозможным, и потому он подвигался вперед на четвереньках, придерживаясь за камни и выступы почвы. Идти, впрочем, было некуда, так как, насколько можно было видеть из-под фалд пиджака, закинутых ветром на голову пресмыкающегося чудодея, все кругом представляло собой одну картину разрушения.

— Что-то такое во Вселенной серьезно испортилось, — подумал он, — а что именно — неизвестно.

Действительно, испортилось. Ни домов, ни деревьев, ни каких-либо живых существ — ничего не было видно. Только бесформенные развалины да разнородные обломки валялись кругом, едва видные среди целого урагана пыли.

Винючник всего этого не понимал, конечно, в чем дело. А между тем оно объяснялось очень просто. Остановив Землю сразу, Фотерингей не подумал об инерции, а между тем она при внезапной остановке кругового движения неминуемо должна была сбросить с поверхности Земли все на ней находящееся. Вот почему дома, люди, деревья, животные — вообще все, что только не было неразрывно связано с главной массой земного шара, полетело по касательной к его поверхности со скоростью пули. А затем все это вновь падало на Землю, разбиваясь вдребезги.

Фотерингей понял, что чудо, им совершенное, не особенно удачно. А потому им овладело глубокое отвращение ко всяким чудесам, и он дал себе слово не творить их больше. Но прежде нужно было поправить беду, которую он наделал. Беда эта оказалась немалой. Буря свирепела, облака пыли закрыли Луну, и вдали слышен был шум приближающейся воды; Фотерингей видел при свете молнии целую водяную стену, со страшной скоростью подвигавшуюся к тому месту, на котором он лежал. Он стал решительным.

— Стой! — вскричал он, обращаясь к воде. — Ни шагу далее!

Затем повторил то же распоряжение грому, молнии и ветру. Все затихло. Присев ни корточкой, он задумался.

— Как бы это опять не наделать какой-нибудь кутерьмы, — подумал он и затем сказал: — Во-первых, когда исполнится все, что я сейчас прикажу, пусть я потеряю способность творить чудеса и буду таким же, как обыкновенные люди. Не надо чудес. Слишком опасная игрушка. А во-вторых, пусть все будет по-старому: тот же город, те же люди, такие же дома, и я сам такой же, каким был тогда.”

Письмо с самолета

Вообразите, что вы находитесь в самолете, который быстро летит над Землей. Внизу — знакомые места. Сейчас вы пролетите над домом, где живет ваш приятель. “Хорошо бы послать ему привет”, — мелькает у вас в уме. Быстро пишете вы несколько слов на листке записной книжки, привязываете записку к какому-либо тяжелому предмету, который мы в дальнейшем будем называть “груз”, и, выждав момент, когда дом оказывается как раз под вами, выпускаете груз из

рук. Вы в полной уверенности, конечно, что груз упадет в сад у дома. Однако он падает вовсе не туда, хотя сад и дом расположены прямо под вами!

Следя за его падением с самолета, вы увидели бы странное явление: груз опускается вниз, но в то же время *продолжает оставаться под самолетом*, словно скользя по привязанной к нему невидимой нити. И когда груз достигнет Земли, он будет находиться далеко впереди того места, которое вы наметили.

Здесь проявляется тот же закон инерции, который мешает




Рис 2 Груз, брошенный с летящего самолета, падает не отвесно, а по кривой

воспользоваться соблазнительным советом путешествовать по способу Бергерака. Пока груз был в самолете, он двигался вместе с машиной. Вы отпустили его. Но, отделившись от самолета и падая вниз, груз не утрачивает своей первоначальной скорости, а, падая, продолжает в то же время совершать движение в воздухе в прежнем направлении. Оба движения, отвесное и горизонтальное, складываются, и в результате груз летит вниз по кривой линии, оставаясь все время под самолетом (если, конечно, сам самолет не изменяет направления или скорости полета). Груз летит, в сущности, так же, как летит горизонтально брошенное тело, например пуля, выброшенная из горизонтально направленного ружья: тело описывает дугобразный

путь, оканчивающийся в конце концов на Земле.

Заметим, что все сказанное здесь было бы совершенно верно, если бы не было сопротивления воздуха. На самом деле это сопротивление тормозит и вертикальное и горизонтальное перемещения груза, вследствие чего груз не остается все время прямо под самолетом, а несколько отстает от него.

Уклонение от отвесной линии может быть очень значительно, если самолет летит высоко и с большой ско-

ростью. В безветренную погоду груз, падающий с самолета, который на высоте 1000 м летит со скоростью 180 км/ч, упадет на 700 м впереди места, лежащего отвесно под самолетом (рис. 2).

Расчет (если пренебречь сопротивлением воздуха) несложен. Из формулы для пути при равномерно ускоренном движении

$$S = g t^2 / 2$$

мы получим, что

$$t = \sqrt{2S/g}$$

Значит, с высоты 1000 м груз должен падать в течение времени

$$t = \sqrt{\frac{2 \cdot 1000 \text{ м}}{9.8 \text{ м/с}^2}} \approx 14$$

За это время он успеет переместиться в горизонтальном направлении на расстояние

$$l = \frac{180000 \text{ м/с}}{3600} \cdot 14 \text{ с} = 700 \text{ м.}$$

Бомбометание

После сказанного становится ясным, как трудна задача военного летчика, которому поручено сбросить бомбу на определенное место: ему приходится принимать в расчет и скорость самолета, и влияние воздуха на падающее тело и, кроме того, еще скорость ветра. На рис. 3 схематически представлены различные пути, описываемые сброшенной бомбой при тех или иных условиях. Если ветра нет, сброшенная бомба летит по кривой AF ; почему так — мы объяснили выше. При попутном ветре бомбу




Рис. 3. Путь, по которому падают бомбы, сброшенные с самолета.

относит вперед и она движется по кривой *AG*. При встречном ветре умеренной силы бомба падает по кривой *AD*, если ветер вверх и вниз одинаков. Если же, как часто бывает, ветер вниз имеет направление, противоположное верхнему ветру (наверху — встречный, внизу — попутный), кривая падения изменяет свой вид и принимает форму линии *AE*.

Безостановочная железная дорога

Когда вы стоите на неподвижной платформе вокзала и мимо нее проносится курьерский поезд, то вскочить в вагон на ходу, конечно, мудрено. Но представьте себе, что и платформа под вами тоже движется, притом с такой же скоростью и в ту же сторону, как и поезд. Трудно ли будет вам тогда войти в вагон?

Нисколько: вы войдете так же спокойно, как если бы вагон стоял неподвижно. Раз и вы, и поезд движетесь в одну сторону с одинаковой скоростью, то *по отношению к вам поезд находится в полном покое*.




Рис. 4. Схема устройства безостановочной железной дороги.

Правда, колеса его вращаются, но вам будет казаться, что они вертятся на месте. Строго говоря, все те предметы, которые мы обычно считаем неподвижными (например,

поезд, стоящий у вокзала), движутся вместе с нами вокруг оси земного шара и вокруг Солнца; однако практически мы можем не учитывать это движение, так как оно нам нисколько не мешает.

Следовательно, вполне мыслимо устроить так, чтобы поезд, проходя мимо станций, принимал и высаживал пассажиров на полном ходу, не останавливаясь.

Приспособления такого рода нередко устраиваются на выставках, чтобы дать публике возможность быстро и удобно осматривать их достопримечательности, раскинутые на обширном пространстве. Крайние пункты выставочной площадки, словно бесконечной лентой, соединяются железной дорогой; пассажиры могут в любой момент и в любом месте входить в вагоны и выходить из них на полном ходу поезда.

Это любопытное устройство показано на рис. 4. На каждой станции помещается круглая неподвижная площадка, окруженная большим вращающимся кольцообразным диском. Вокруг вращающихся дисков обеих станций про-

ходит канат, к которому прицеплены вагоны. Теперь последите, что происходит при вращении диска. Вагоны движутся вокруг дисков с такой же скоростью, с какой вращаются их внешние края; следовательно, пассажиры без малейшей опасности могут переходить с дисков в вагоны или; наоборот, покидать поезд. Выйдя из вагона, пассажир идет по вращающемуся диску к центру круга, пока не дойдет до неподвижной площадки; а перейти с внутреннего края подвижного диска на неподвижную площадку уже нетрудно, так как здесь, при малом радиусе круга, весьма мала и круговая скорость*. Достигнув внутренней неподвижной площадки, пассажиру остается лишь перебраться по мостику на землю вне железной дороги (рис. 5).

Отсутствие частых остановок дает огромный выигрыш во




Рис. 5. Станция безостановочной железной дороги.

времени и затрате энергии. В городских трамваях, например, большая часть времени и почти две трети всей энергии тратится на постепенное ускорение движения при отходе со станции и на замедление при остановках**.

На станциях железных дорог можно было бы обойтись даже без специальных подвижных платформ, чтобы принимать и высаживать пассажиров на полном ходу поезда. Вообразите, что мимо обыкновенной неподвижной станции проносится курьерский поезд; мы желаем, чтобы он, не останавливаясь, принял здесь новых пассажиров. Пусть же эти пассажиры займут пока места в другом поезде,

* Легко понять, что точки внутреннего края диска движутся значительно медленнее, нежели точки наружного края, так как в одно и то же время описывают гораздо меньший круговой путь.

** Потери энергии на торможение можно избежать, если при торможении переключать электромоторы вагона таким образом, чтобы они работали как динамомашины, возвращая ток в сеть. В Шарлоттенбурге (предместье Берлина) благодаря этому расход энергии на трамвайное движение удалось снизить на 30%¹.

стоящем на запасном параллельном пути, и пусть этот поезд начнет двигаться вперед, развивая ту же скорость, что и курьерский. Когда оба поезда окажутся рядом, они будут неподвижны *один относительно другого*: достаточно перекинуть мостки, которые соединяли бы вагоны обоих поездов, — и пассажиры вспомогательного поезда смогут спокойно перейти в курьерский. Остановки на станциях сделаются, как видите, излишними.

“Предупреждение катастроф”

Интересным примером использования закона относительно движения может служить запатентованное на Западе приспособление, с помощью которого изобретатель надеялся предотвращать столкновения автомобилей с поездами в местах пересечения шоссе с железнодорожным полотном. У переездов устраивается особая въездная площадка, настил которой при приближении поезда начинает автоматически двигаться назад на роликах, подобно бесконечному ремню. Скорость движения настила превышает наибольшую скорость автомобиля; поэтому автомобиль, оказавшийся на такой движущейся площадке, будет отнесен ею назад, как бы ни была велика его скорость. После прохода поезда движение настила прекращается — и автомобиль беспрепятственно проносится через полотно.

Движущиеся тротуары

На принципе относительности движения основано и другое приспособление, применявшееся на выставках: так называемые “движущиеся тротуары”. Впервые они были осуществлены на выставке в Чикаго в 1893 г., затем на Парижской Всемирной выставке в 1900 г. Вот схема такого устройства (рис. 6). Вы видите пять замкнутых полос-тротуаров, движущихся посредством особого механизма одна внутри другой с различной скоростью.

Самая крайняя полоса идет довольно медленно — со скоростью всего 5 км/ч; это обыкновенная скорость пешехода, и вступить на такую медленно ползущую полосу нетрудно. Рядом с ней, внутри, бежит вторая полоса, со скоростью 10 км/ч. Вскочить на нее прямо с неподвижной улицы было бы опасно, но перейти на нее с первой полосы ничего не стоит. В самом деле: по отношению к первой полосе, ползущей со скоростью 5 км/ч, вторая, бегущая со скоростью 10 км/ч, делает всего только 5 км/ч; значит,

перейти с первой на вторую столь же легко, как перейти с улицы на первую. Третья полоса движется уже со скоростью 15 км/ч, но перейти на нее со второй полосы, конечно, не




Рис. 6. Движущиеся тротуары.

трудно. Так же легко перейти с третьей полосы на следующую, четвертую, бегущую со скоростью 20 км/ч, и, наконец, с нее на пятую, мчащуюся уже со скоростью 25 км/ч. Эта пятая полоса доставляет пассажира до того пункта, который ему нужен; отсюда, последовательно переходя обратно с полосы на полосу, он высаживается на неподвижную улицу.

Трудный закон

Ни один из трех основных законов механики не вызывает, вероятно, столько недоумений, как знаменитый “третий закон Ньютона” — закон действия и противодействия. Все его знают, умеют даже в иных случаях правильно применять, — и однако мало кто свободен от некоторых неясностей в его понимании. Может быть, читатель, вам посчастливилось сразу понять его, — но я, сознаюсь, вполне постиг его лишь десяток лет спустя после первого с ним знакомства.

Беседуя с разными лицами, я не раз убеждался, что многие готовы признать правильность этого закона лишь с существенными оговорками. Охотно допускают, что он верен для тел неподвижных, но не понимают, как можно применять его к взаимодействию тел движущихся... Действие, — гласит закон, — всегда равно и противоположно противодействию. Это значит, что, если лошадь тянет телегу, то и телега тянет лошадь назад с такой же силой. Но

ведь тогда телега должна оставаться на месте: почему же все-таки она движется? Почему эти силы не уравновешивают одна другую, если они равны?

Таковы обычные недоумения, связанные с этим законом. Значит, закон неверен? Нет, он безусловно верен; мы только неправильно понимаем его. Силы не уравновешивают друг друга просто потому, что приложены к *разным* телам: одна — к телеге, другая — к лошади. Силы равны, да, — но разве одинаковые силы всегда производят одинаковые действия? Разве равные силы сообщают всем телам равные ускорения? Разве действие силы на тело не зависит от тела, от того “сопротивления”, которое само тело оказывает силе?

Если подумать об этом, станет ясно, почему лошадь увлекает телегу, хотя телега тянет ее обратно с такой же силой. Сила, действующая на телегу, и сила, действующая на лошадь, в каждый момент равны; но так как телега свободно перемещается на колесах, а лошадь упирается в землю, то понятно, почему телега катится в сторону лошади. Подумайте и о том, что если бы телега не оказывала противодействия движущей силе лошади, то... можно было бы обойтись и без лошади: самая слабая сила должна была бы привести телегу в движение. Лошадь затем и нужна, чтобы преодолевать противодействие телеги³.

Все это усваивалось бы лучше и порождало бы меньше недоумений, если бы закон высказывался не в обычной краткой форме: “действие равно противодействию”, а, например, так: “сила противодействующая равна силе действующей”. Ведь равны здесь только *силы*, — действия же (если понимать, как обычно понимают, под “действием силы” перемещение тела) различны, потому что силы приложены к *разным телам*.

Точно так же, когда полярные льды сдавливали корпус “Челюскина”, его борта давили на лед с равной силой. Катастрофа произошла оттого, что мощный лед оказался способным выдержать такой напор, не разрушаясь; корпус же судна, хотя и стальной, но не представляющий собой сплошного тела, поддавался этой силе, был смят и раздавлен. (Подробнее о физических причинах гибели “Челюскина” рассказано далее, на с. 274.)

Даже падение тел подчиняется закону противодействия. Яблоко падает на Землю оттого, что его притягивает земной шар; *но точно с такой же силой и яблоко притягивает к себе нашу планету*. Строго говоря, яблоко и Земля падают друг на друга, но скорость этого падения различна для яблока и

для Земли. Равные силы взаимного притяжения сообщают яблоку ускорение 10 м/с^2 , а земному шару — во столько раз меньшее, во сколько раз масса Земли превышает массу яблока. Конечно, масса земного шара в неимоверное число раз больше массы яблока, и потому Земля получает перемещение настолько ничтожное, что практически его можно считать равным нулю. Оттого-то мы и говорим, что яблоко падает на Землю, вместо того чтобы сказать: “яблоко и Земля падают друг на друга”^{*}.

Отчего погиб Святогор-богатырь?

Помните народную былинку о Святогоре-богатыре, который вздумал поднять Землю? Архимед, если верить преданию, тоже готов был совершить такой подвиг и требовал точки опоры для своего рычага. Но Святогор был силен и без рычага. Он искал лишь, за что ухватиться, к чему приложить богатырские руки. “Как бы я тяги нашел, так бы всю землю поднял”! Случай представился: богатырь нашел на земле “сумочку переметную”, которая “не скрянется, не сворохнется, не подыметса”:

Слезает Святогор с добра коня,
Ухватил он сумочку обема руками,
Поднял сумочку повыше колен:
И по колена Святогор в землю угрыз,
А по белу лицу не слезы, а кровь течет,
Где Святогор угрыз, тут и встать не мог.
Тут и ему было кончение.

Если бы Святогору был известен закон действия и противодействия, он сообразил бы, что богатырская сила его, приложенная к Земле, вызовет равную, а следовательно, столь же колоссальную противодействующую силу, которая может втянуть его самого в землю.

Во всяком случае, из былины видно, что народная наблюдательность давно подметила противодействие, оказываемое землей, когда на нее опираются. Люди бессознательно применяли закон противодействия за тысячелетия до того, как Ньютон впервые провозгласил его в своей бессмертной книге “Математические основы натуральной философии” (т. е. физики).

^{*} О законе противодействия см. также в гл. 1 моей “Занимательной механики”.

Можно ли двигаться без опоры?

При ходьбе мы отталкиваемся ногами от земли или от пола; по очень гладкому полу или по льду, от которого нога не может оттолкнуться, ходить нельзя. Паровоз при движении отталкивается “ведущими” колесами от рельсов: если рельсы смазать маслом, паровоз останется на месте. Иногда даже (в гололедицу), для того чтобы сдвинуть поезд с места, рельсы перед ведущими колесами паровоза посыпают песком из специального приспособления. Когда колеса и рельсы (на заре железных дорог) делали зубчатыми, исходили именно из того, что колеса должны отталкиваться от рельсов. Пароход отталкивается от воды лопастями бортового колеса или гребного винта. Самолет отталкивается от воздуха также при помощи винта — пропеллера. Словом, в какой бы среде ни двигался предмет, он опирается на нее при своем перемещении. Но может ли тело начать двигаться, не имея *никакой опоры*?

Казалось бы, стремиться осуществить такое движение — все равно, что пытаться самого себя поднять за волосы. Как известно, такая попытка до сих пор удалась лишь барону Мюнхгаузену. Между тем, именно такое будто бы невозможное движение часто происходит на наших глазах. Правда, тело не может привести себя *целиком* в движение одними внутренними силами, но оно может заставить некоторую часть своего вещества двигаться в одну сторону, остальную же — в противоположную. Сколько раз видели вы летящую ракету, а задумались ли над вопросом: почему она летит? В ракете мы имеем наглядный пример как раз того рода движения, которое нас сейчас интересует.

Почему взлетает ракета?

Даже среди людей, изучавших физику, случается нередко слышать совершенно превратное объяснение полета ракеты: она летит потому будто бы, что своими газами, образующимися при горении в ней пороха, *отталкивается от воздуха*. Так думали в старину (ракеты — давнее изобретение) ⁴. Однако если пустить ракету в безвоздушное пространство, она полетела бы не хуже, а даже лучше, чем в воздухе. Истинная причина движения ракеты совершенно иная. Очень понятно и просто изложил ее революционер-первомартовец Кибальчич в предсмертной своей записке об

изобретенной им летательной машине. Объясняя устройство боевых ракет, он писал:

“В жестяной цилиндр, закрытый с одного основания и открытый с другого, вставляется плотно цилиндр из прессованного пороха, имеющий по оси свободный канал. Горение пороха начинается с поверхности этого канала и распространяется в течение определенного промежутка времени до наружной поверхности прессованного пороха, образующиеся при горении газы производят давление во все стороны, но боковые давления газов взаимно уравниваются, давление же на дно жестяной оболочки пороха, не уравновешенное противоположным давлением (так как в эту сторону газы имеют свободный выход), толкает ракету вперед”

Здесь происходит то же, что и при выстреле из пушки: снаряд летит вперед, а сама пушка отталкивается назад. Вспомните “отдачу” ружья в всякого вообще огнестрельного оружия! Если бы пушка висела в воздухе, ни на что не опираясь, она после выстрела двигалась бы назад с некоторой скоростью, которая во столько раз меньше скорости снаряда, во сколько раз снаряд легче самой пушки. В фантастическом романе Жюль Верна “Вверх дном” американцы задумали даже воспользоваться силой отдачи исполинской пушки для выполнения грандиозной затеи — “выпрямить земную ось”.

Ракета — та же пушка, только извергает она не снаряды, а пороховые газы. По той же причине вертится и так называемое “китайское колесо”, которым, вероятно, случалось вам любоваться при устройстве фейерверков: при горении пороха в трубках, прикрепленных к колесу, газы вытекают в одну сторону, сами же трубки (а с ними и колесо) получают обратное движение. В сущности, это лишь видоизменение общеизвестного физического прибора — “сегнерова колеса”.

Интересно отметить, что до изобретения парохода существовал проект механического судна, основанный на том же начале; запас воды на судне предполагалось выбрасывать с помощью




Рис. 7 Самая древняя паровая турбина, приписываемая Герону Александрийскому

сильного нагнетательного насоса в кормовой части, вследствие этого корабль должен был двигаться вперед. Проект этот (предложенный Ремзи) не был осуществлен⁵, однако он сыграл известную роль в изобретении парохода, так как натолкнул Фултона на его идею.

Мы знаем также, что самая древняя паровая турбина, изобретенная Героном Александрийским еще во II веке до нашей эры, была устроена по тому же принципу: пар из котла (рис. 7) поступал по трубке в шар, укрепленный на горизонтальной оси; вытекая затем из коленчато-изогнутых трубок, пар толкал эти трубки в обратном направлении, и шар начинал вращаться. К сожалению, геронова паровая турбина в древности оставалась только любопытной игрушкой, так как дешевизна труда рабов никого не побуждала к практическому использованию машин. Но сам принцип не заброшен техникой: он применяется при устройстве реактивных турбин.

Ньютону — автору закона действия и противодействия — приписывают один из самых ранних проектов парового автомобиля, основанный на том же начале: пар из котла, поставленного на колеса, вырывается в одну сторону, а сам котел в силу отдачи катится в противоположную (рис. 8).




Рис. 8. Паровой автомобиль, приписываемый Ньютону.

Ракетные автомобили, об опытах с которыми в 1928 г. много писали в газетах и журналах, представляли собой видоизменение ньютоновой повозки.

Для любителей мастерить на рис. 9 показан бумажный пароходик⁶, также очень похожий на ньютонову повозку: в паровом котле из опорожненного яйца, нагреваемом намоченной в спирте ваткой в наперстке, образуется пар; вырываясь струей в одну сторону, он застав-




Рис. 9. Игрушечный парходик из бумаги и яичной скорлупы.

ляет весь парходик двигаться в противоположную сторону. Для сооружения этой поучительной игрушки нужны, однако, очень искусные руки.

Как движется каракатица?

Вам странно будет услышать, что есть немало живых существ, для которых мнимое “поднятие самого себя за волосы” является обычным способом их перемещения в воде.

Каракатица (рис. 10) и вообще большинство головоногих моллюсков движутся в воде таким образом: забирают воду в жаберную полость через боковую щель и особую воронку впереди тела, а затем энергично выбрасывают струю воды через упомянутую воронку; при этом они — по закону противодействия — получают обратный толчок, достаточ-




Рис. 10. Плавательное движение каракатицы.

ный для того, чтобы довольно быстро плавать задней частью тела вперед. Каракатица может, впрочем, направить трубку воронки вбок или назад и, стремительно выдавливая из нее воду, двигаться в любом направлении.

На том же основано и движение медузы: сокращением мускулов она выталкивает из-под своего колоколообразного тела воду, получая толчок в обратном направлении. Сходным приемом пользуются при движении сальпы, личинки стрекоз и другие водные животные. А мы еще сомневались, можно ли так двигаться ⁷!

К звездам на ракете ⁸

Что может быть заманчивее, чем покинуть земной шар и путешествовать по необъятной Вселенной, перелетать с Земли на Луну, с планеты на планету? Сколько фантастических романов написано на эту тему! Кто только не увлекал нас в воображаемое путешествие по небесным светилам! Вольтер в “Микромегасе”, Жюль Верн в “Путешествии на Луну” и “Гекторе Сервадаке”, Уэллс в “Первых людях на Луне” и множество их подражателей совершили интереснейшие путешествия на небесные светила, — конечно, в мечтах.

Неужели же нет возможности осуществить эту давнишнюю мечту? Неужели все остроумные проекты, с таким заманчивым правдоподобием изображенные в романах, на самом деле неисполнимы? В дальнейшем мы будем еще беседовать о фантастических проектах межпланетных путешествий; теперь же познакомимся с реальным проектом подобных перелетов, впервые предложенным нашим соотечественником К. Э. Циолковским.

Можно ли долететь до Луны на самолете? Конечно, нет: самолеты движутся только потому, что опираются о воздух, отталкиваются от него, а между Землей и Луной воздуха нет. В мировом пространстве вообще нет достаточно плотной среды, на которую мог бы опереться “межпланетный самолет”. Значит, надо придумать такой аппарат, который способен был бы двигаться и управляться, ни на что не опираясь.

Мы знакомы уже с подобным снарядами в виде игрушки — с ракетой. Отчего бы не устроить огромную ракету, с особым помещением для людей, съестных припасов, баллонов с воздухом и всем прочим? Вообразите, что люди в ракете везут с собой большой запас горючих веществ и могут направлять истечение взрывных газов в любую сторону. Вы получите настоящий управляемый межпланетный корабль, на котором можно плыть в океане мирового пространства, полететь на Луну, на планеты... Пассажиры смогут, управляя взрывами, увеличивать скорость этого межпланетного ко-

рабля с необходимой постепенностью, чтобы возрастание скорости было для них безвредно. При желании спуститься на какую-нибудь планету они смогут, повернув свой корабль, постепенно уменьшить скорость снаряда и тем ослабить падение. Наконец, пассажиры смогут таким же способом возвратиться и на Землю.

ГЛАВА ВТОРАЯ

СИЛА. РАБОТА. ТРЕНИЕ

Задача о лебеде, раке и щуке

История о том, как “лебедь, рак да щука везти с поклажей воз взялись”, известна всем. Но едва ли кто пробовал рассматривать эту басню с точки зрения механики. Результат получается вовсе не похожий на вывод баснописца Крылова.

Перед нами задача на сложение нескольких сил, действующих под углом одна к другой. Направления сил определены в басне так:

Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а щука тянет в воду

Это значит (рис 111), что одна сила, тяга лебедя (OA), направлена вверх; другая, тяга щуки (OB), — вбок; третья, тяга рака (OC), — назад. Не забудем, что существует еще четвертая сила, сила тяжести, которая направлена отвесно вниз¹. Басня утверждает, что “воз и ныне там”, другими словами, что равнодействующая всех приложенных к возу сил равна нулю.

Так ли это? Посмотрим. Лебедь, рвущийся к облакам, не мешает работе рака и щуки, даже помогает им: тяга лебедя, направленная против силы тяжести, уменьшает трение колес о землю и об оси, облегчая тем вес воза, а может быть, даже вполне уравновешивая его, — ведь груз невелик (“поклажа бы для них казалась и легка”). Допустив для простоты последний случай, мы видим, что остаются только две силы: тяга рака и тяга щуки. О направлении этих сил говорится, что “рак пятится назад, а щука тянет в воду”. Само собой разумеется, что вода находилась не впереди воза, а где-нибудь сбоку (не потопить же воз собрались крыловские труженики!). Значит, силы рака и щуки направлены под углом одна к другой. Если приложенные силы не лежат на одной прямой, то равнодействующая их никак не может равняться нулю.

Поступая по правилам механики, строим на силах OB и OC параллелограмм сил, диагональ его OD дает равнодействующую силу. Ясно, что эта равнодействующая должна сдвинуть воз с места, тем более, что вес его полностью или частично уравновешивается тягой лебедя. Другой вопрос — в какую сторону сдвинется воз: вперед, назад или вбок? Это зависит уже от соотношения сил и от угла между ними.




Рис. 11. Задача о крыловских лебедь, раке и щуке. Равнодействующая сила (OD) должна увлечь воз в реку.

Читатели, имеющие некоторую практику в сложении и разложении сил, легко разберутся и в том случае, когда сила лебедя не уравновешивает веса воза; они убедятся, что воз и тогда не может оставаться неподвижным. При одном только условии воз может не сдвинуться под действием этих трех сил: если трение у его осей и о полотно дороги больше, чем приложенные усилия. Но это не согласуется с утверждением, что “поклажа бы для них казалась и легка”.

Во всяком случае, Крылов не мог с уверенностью утверждать, что “возу все нет ходу”, что “воз и ныне там”. Это, впрочем, не меняет смысла басни.

Вопреки Крылову

Мы только что видели, что житейское правило Крылова: “когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдёт” — не всегда применимо в механике. Силы могут быть направлены не в одну сторону и, несмотря на это, давать известный результат.

Мало кто знает, что усердные труженики — муравьи, которых тот же Крылов восхвалял как образцовых работников, трудятся совместно именно по способу, осмеянному баснописцем. И дело у них в общем идет на лад. Выручает опять закон сложения сил. Внимательно следя за муравьями во время работы, вы скоро убедитесь, что разумное сотрудничество их — только кажущееся: на деле каждый муравей работает сам для себя, вовсе не думая помогать другим.

Вот как описывает работу муравьев зоолог Е. Елачич в книге “Инстинкт”:

“Если крупную добычу тащит десяток муравьев по ровному месту, то все действуют одинаково, и получается внешность сотрудничества. Но вот добыча — например гусеница — зацепилась за какое-либо препятствие, за стебель травы, за камешек. Дальше вперед тащить




Рис. 12. Как муравьи волокут гусеницу.




Рис. 13. Как муравьи тянут добычу.

нельзя, надо обогнуть. И тут с ясностью обнаруживается, что каждый муравей по-своему и ни с кем из товарищей не сообразуясь старается справиться с препятствием (рис. 12 и 13). Один тащит направо, другой налево; один толкает вперед, другой тянет назад. Переходят с места на место, хватаются за гусеницу в другом месте, и каждый толкает или тянет по-своему. Когда случится, что силы работающих сложатся так, что в одну сторону будут двигать гусеницу четыре муравья, а в другую шесть, то гусеница в конце концов движется именно в сторону этих шести муравьев, несмотря на противодействие четырех”.

Приведем (заимствованный у другого исследователя) еще поучительный пример, наглядно иллюстрирующий это мнимое сотрудничество муравьев. На рис. 14 изображен

прямоугольный кусочек сыра, за который ухватилось двадцать пять муравьев. Сыр медленно продвигался к муравейнику, расположенному в направлении, указанном стрелкой *A*, и можно было бы думать, что передняя шеренга муравьев тянет ношу к себе, задняя — толкает ее вперед, боковые же муравьи помогают тем и другим. Однако это не так, в чем нетрудно убедиться: отделите ножом всю заднюю шеренгу, — ноша поползет гораздо быстрее! Ясно, что эти одиннадцать муравьев тянули назад, а не вперед: каждый из них старался повернуть ношу так, чтобы, пятясь назад, волочить ее к гнезду. Значит, задние муравьи не только не помогали передним, но усердно мешали им, уничтожая их усилия. Чтобы волочить этот кусочек сыра, достаточно было бы усилий всего четырех муравьев, но несогласованность действий приводит к тому, что ношу тащат двадцать пять муравьев.




Рис. 14. Как муравьи двигают кусочек сыра к муравейнику, расположенному в направлении стрелки *A*.

Эта особенность совместных действий муравьев давно уже была замечена Марком Твеном. Рассказывая о встрече двух муравьев, из которых один нашел ножку кузнечика, он говорит:

“Они берут ногу за оба конца и тянут изо всех сил в противоположные стороны. Оба видят, что что-то неладно, но что — не могут понять. Начинаются взаимные пререкания; спор переходит в драку... Происходит примирение, и снова начинается совместная и бессмысленная работа, причем раненый в драке товарищ является только помехой. Стараясь изо всей мочи, здоровый товарищ тащит ношу, а с ней и раненого друга, который вместо того, чтобы уступить добычу, висит на ней”.

Шутя, Твен бросает совершенно правильное замечание, что “муравей хорошо работает только тогда, когда за ним наблюдает неопытный натуралист, делающий неверные выводы”.

Легко ли сломать яичную скорлупу?

В числе философских вопросов, над которыми ломал свою мудрую голову глубокомысленный Кифа Мокиевич из “Мертвых душ”, была такая проблема: “Ну, а если бы слон

родился в яйце, ведь скорлупа, чай, сильно бы толста была, — пушкой не прошибешь; нужно какое-нибудь новое огнестрельное орудие выдумать.”

Гоголевский философ был бы, вероятно, не мало изумлен, если бы узнал, что и обыкновенная *яичная* скорлупа, несмотря на тонкость, — тоже далеко не нежная вещь. Раздавить яйцо между ладонями, напирая на его концы, не так-то легко; нужно немалое усилие, чтобы сломать скорлупу при подобных условиях (рис. 15)*. Столь необычайная крепость яичной скорлупы зависит исключительно от ее выпуклой формы и объясняется так же, как и прочность всякого рода сводов и арок².

На рис. 16 изображен небольшой каменный свод над окном. Груз S (т. е. вышележащие части кладки), напирający на клинообразный средний камень свода M , давит вниз с силой, которая обозначена на рисунке стрелкой A . Но сдвинуться вниз камень M не может вследствие



Рис. 15. Чтобы раздавить яйцо в таком положении, требуется значительное усилие.




Рис. 16. Причина прочности свода.

своей клинообразной формы; он только давит на соседние камни. При этом сила A разлагается по правилу параллелограмма на две силы, обозначенные стрелками C и B ; они уравниваются сопротивлением прилегающих камней, в свою очередь зажатых между соседними. Таким образом, сила, давящая на свод снаружи, не может его разрушить. Зато сравнительно легко разрушить его силой, действующей

* Опыт представляет некоторую опасность (скорлупа может вонзиться в руку) и требует осмотрительности.

изнутри. Это и понятно, так как клинообразная форма камней, мешающая им *опускаться*, нисколько не препятствует им *подниматься*.

Скорлупа яйца — тот же свод, только сплошной, а не составленный из отдельных частей. При давлении *снаружи* он разрушается не так легко, как можно было бы ожидать от такого хрупкого материала. Можно поставить довольно тяжелый стол ножками на четыре сырых яйца — и они не раздавятся. (Для устойчивости яиц и увеличения площади давления надо снабдить яйца на концах гипсовыми подставками; гипс легко пристает к известковой скорлупе.)

Теперь вы понимаете, почему наседка не опасается сломать скорлупу яиц тяжестью своего тела. И в то же время слабый птенчик, желая выйти из природной темницы, без труда пробивает клювиком скорлупу *изнутри*.

С легкостью разламывая скорлупу яйца боковым ударом чайной ложечки, мы и не подозреваем, как прочна она, когда давление действует на нее при естественных условиях, и какой надежной броней защитила природа развивающееся в ней живое существо.

Загадочная прочность электрических лампочек, казалось бы столь нежных и хрупких, объясняется так же, как и прочность яичной скорлупы. Их крепость покажется еще поразительнее, если вспомнить, что многие из них (вакуумные, а не газополные) — почти *абсолютно пусты* и ничто *изнутри* не противодействует давлению внешнего воздуха. А сила давления воздуха на электрическую лампочку немалая: при поперечнике в 10 см лампочка сдавливается с обеих сторон силой более 75 кгс (вес человека). Опыт показывает, что вакуумная электрическая лампочка способна выдержать даже в 2, 5 раза большее давление.

Под парусами против ветра

Трудно представить себе, как могут парусные суда идти “против ветра” — или, по выражению моряков, идти “в бейдевинд”. Правда, моряк скажет вам, что прямо против ветра идти под парусами нельзя, а можно двигаться лишь под острым углом к направлению ветра³. Но угол этот мал — около четверти прямого угла, — и представляется, пожалуй, одинаково непонятным: плыть ли прямо против ветра или под углом к нему в 22°.

Да деле это, однако, не безразлично, и мы сейчас объясним, каким образом можно силой ветра идти навстречу ему под

небольшим углом. Сначала рассмотрим, как вообще действует ветер на парус, т. е. куда он толкает парус, когда дует на него. Вы, вероятно думаете, что ветер всегда толкает парус в ту сторону, куда сам дует. Но это не так: куда бы ветер ни дул, он толкает парус перпендикулярно к плоскости паруса.




Рис. 17. Ветер толкает парус всегда под прямым углом к его плоскости

В самом деле. Пусть ветер дует в направлении, указанном стрелками на рис. 17, линия AB изображает парус. Так как ветер напирает равномерно на всю поверхность паруса, то заменяем силу давления ветра силой R , приложенной к середине паруса. Эту силу разложим на две: силу Q , перпендикулярную к парусу, и силу P , направленную вдоль него вперед. Сила P никуда не толкает парус, так как трение ветра о холст незначительно. Остается сила Q , которая толкает парус под

прямым углом к нему.

Зная это, мы легко поймем, как может парусное судно




Рис. 18. Как можно идти на парусах против ветра.




Рис. 19 Лавировка парусного судна.

идти под острым углом навстречу ветру. Пусть линия KK' (рис. 18) изображает килевую линию судна. Ветер дует под острым углом к этой линии в направлении, указанном

стрелками. Линия AB изображает парус; его помещают так, чтобы плоскость его делила пополам угол между направлением киля и направлением ветра. Проследите на рис. 18 за разложением сил. Напор ветра на парус мы изображаем силой Q , которая, мы знаем, должна быть перпендикулярна к парусу. Силу эту разложим на две: силу R , перпендикулярную к килю, и силу S , направленную вперед, вдоль килевой линии судна. Так как движение судна в направлении R встречает сильное сопротивление воды (киль в парусных судах делается очень глубоким), то сила R почти полностью уравнивается сопротивлением воды. Остается одна лишь сила S , которая, как видите, направлена вперед и, следовательно, двигает судно под углом, как бы навстречу ветру

Мог ли Архимед поднять Землю?

“Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю!” — такое восклицание легенда приписывает Архимеду, гениальному механику древности, открывшему законы рычага. “Однажды Архимед, — читаем мы у Плутарха, — написал сиракузскому царю Гиерону, которому он был родственник и друг, что данной силой можно подвинуть какой угодно груз. Увлеченный силой доказательств, он прибавил, что если бы была другая Земля, он, перейдя на нее, сдвинул бы с места нашу”.

Архимед знал, что нет такого груза, который нельзя было бы поднять самой слабой силой, если воспользоваться рычагом: стоит только приложить эту силу к очень длинному плечу рычага, а короткое плечо заставить действовать на груз. Поэтому он и думал, что, напирая на чрезвычайно длинное плечо рычага, можно силой рук поднять и груз, масса которого равна массе земного шара (рис. 20)**.

Но если бы великий механик древности знал, как огромна масса земного шара, он, вероятно, воздержался бы от

* Можно доказать, что сила S получает наибольшее значение тогда, когда плоскость паруса делит пополам угол между направлениями киля и ветра.

** Под выражением “поднять Землю” мы будем подразумевать — чтобы внести определенность в задачу — поднятие *на земной поверхности* такого груза, масса которого равна массе нашей планеты.

своего горделивого восклицания. Вообразим на мгновение, что Архимеду дана та “другая Земля”, та точка опоры, которую он искал; вообразим далее, что он изготовил рычаг нужной длины. Знаете ли, сколько времени понадобилось бы ему, чтобы груз, равный по массе земному шару, поднять хотя бы на 1 см?

Не менее тридцати тысяч биллионов лет!

В самом деле. Масса Земли известна*; тело с такой массой весило бы на Земле круглым счетом

$$6 \cdot 10^{24} \text{ кгс}$$




Рис. 20. “Архимед рычагом поднимает Землю” (гравюра из книги Варионьона (1787 г.) о механике).

Если человек может непосредственно поднять груз весом 60 кгс, то, чтобы “поднять Землю”, ему понадобится приложить свои руки к длинному плечу рычага, которое больше короткого в

$$10^{23} \text{ раз!}$$

Простой расчет убедит вас, что, пока конец короткого плеча поднимается на 1 см, другой конец опишет во Вселенной огромную дугу в

$$10^{18} \text{ км.}$$

Такой невообразимо длинный путь должна была бы пройти рука Архимеда, налегающая на рычаг, чтобы “поднять Землю” только на 1 см! Сколько же времени понадобится для этого? Если считать, что Архимед способен был

* О том, как она была определена, см. “Занимательную астрономию”.

поднять груз весом 60 кгс на высоту 1 м за 1 секунду, то и тогда для “поднятия Земли” на 1 см потребуется

10^{21} секунд.

или тридцать тысяч биллионов лет! За всю свою долгую жизнь Архимед, напирая на рычаг, не “поднял бы Земли” даже на толщину тончайшего волоса...

Никакие ухищрения гениального изобретателя не помогли бы ему заметно сократить этот срок. “Золотое правило механики” гласит, что на всякой машине выигрыш в силе неизбежно сопровождается соответствующей потерей в длине перемещения, т. е. во времени. Если бы даже Архимед довел быстроту своей руки до величайшей скорости, какая возможна в природе, — до 300 000 км/с (скорость света), то и при таком фантастическом допущении он “поднял бы Землю” на 1 см лишь после десяти миллионов лет работы.

Жюль-верновский силач и формула Эйлера

Вы помните у Жюля Верна силача-атлета Матифу? “Великолепная голова, пропорциональная исполинскому росту; грудь, похожая на кузнечный мех; ноги — как хорошие бревна, руки — настоящие подъемные краны, с кулаками, похожими на молоты...” Вероятно, из подвигов этого силача, описанных в романе “Матис Сандорф”, вам памятен поразительный случай с судном “Трабоколо”, когда наш гигант силой могучих рук задержал спуск целого корабля.

Вот как рассказывает романист об этом подвиге:

“Судно, освобожденное уже от подпорок, которые поддерживали его по бокам, было готово к спуску. Достаточно было отнять швартов, чтобы судно начало скользить вниз. Уже с полдюжины плотников возились под килем судна. Зрители с живым любопытством следили за операцией. В этот момент, обогнув береговой выступ, появилась увеселительная яхта. Чтобы войти в порт, яхта должна была пройти перед верфью, где готовили спуск “Трабоколо”, и, как только она подала сигнал, пришлось, во избежание всяких случайностей, задержать спуск, чтобы снова приняться за дело после прохода яхты в канал. Если бы суда, — одно, стоявшее поперек, другое, подвигающееся с большой быстротой, — столкнулись, яхта погибла бы.

Рабочие перестали стучать молотками. Все взоры были устремлены на грациозное судно, белые паруса которого казались позолоченными в косых лучах солнца. Скоро яхта очутилась как раз против верфи, где замерла тысячная толпа любопытных. Вдруг раздался крик ужаса: “Трабоколо” закачалось и пришло в движение в тот самый момент,

когда яхта повернулась к нему штирбортом! Оба судна готовы были столкнуться: не было ни времени, ни возможности помешать этому столкновению “Трабоколо” быстро скользило вниз по наклону... Белый дымок, появившийся вследствие трения, закрутился перед его носом, тогда как корма погрузилась уже в воду бухты (судно спускалось кормой вперед.— Я. П.).

Вдруг появляется человек, схватывает швартов, висящий у передней части “Трабоколо”, и старается удержать его, пригнувшись к земле. В одну минуту он наматывает швартов на вбитую в землю железную трубу и, рискуя быть раздавленным, держит с нечеловеческой силой в руках канат в продолжение 10 секунд. Наконец швартов обрывается. Но этих 10 секунд было достаточно: “Трабоколо”, погрузившись в воду, только слегка задело яхту и пронеслось вперед.

Яхта была спасена. Что касается человека, которому никто не успел даже прийти на помощь,— так быстро и неожиданно все произошло,— то это был Матифу”.

Как изумился бы автор романа, если бы ему сказали, что для совершения подобного подвига не нужно вовсе быть великаном и обладать, как Матифу, “силой тигра”. Каждый находчивый человек мог бы сделать то же самое!

Механика учит, что при скольжении каната, навитого на тумбу, сила трения достигает большой величины. Чем больше число оборотов каната, тем трение больше; правило возрастания трения таково, что, с увеличением числа оборотов в прогрессии арифметической, трение растет в прогрессии геометрической. Поэтому даже слабый ребенок, держа за свободный конец каната, 3— 4 раза навитый на неподвижную тумбу, может уравновесить огромную силу.

На речных пароходных пристанях подростки оставляют этим приемом подходящие к пристаням пароходы с сотней пассажиров. Помогает им не феноменальная сила их рук, а трение каната о тумбу.

Знаменитый математик XVIII века Эйлер установил зависимость силы трения от числа оборотов веревки вокруг сваи. Для тех, кого не пугает сжатый язык алгебраических выражений, приводим эту поучительную формулу Эйлера:

$$F = fe^{k\alpha}$$

Здесь F — сила, против которой направлено наше усилие f , $e=2,718...$ — основание натуральных логарифмов, k — коэффициент трения между веревкой и свайей, α — “угол навивания”, т. е. отношение длины дуги, охваченной веревкой, к радиусу этой дуги.

Применим формулу к случаю, который описан у Жюль Верна. Результат получится поразительный. Силой F в дан-

ном случае является сила тяги судна, скользящего по доку. Вес судна из романа известен: 50 тс. Пусть наклон стапеля $1/10$; тогда на канат действовал не полный вес судна, а $1/10$ его, т. е. 5 тс, или 5000 кгс.

Далее, коэффициент трения каната о железную тумбу k будем считать равным $1/3$. Угол α легко определим, если примем, что Матифу обвил канат вокруг тумбы всего три раза. Тогда

$$\alpha = \frac{3 \cdot 2\pi r}{r} = 6\pi,$$

где r — радиус тумбы. Подставив все эти значения в приведенную выше формулу Эйлера, получим уравнение

$$5000 = f \cdot 2.72^{6\pi/3} = f \cdot 2.72^{2\pi}.$$

Неизвестное f (т. е. необходимое усилие) можно определить из этого уравнения, прибегнув к помощи логарифмов:

$$\lg 5000 = \lg f + 2\pi \lg 2.72, \text{ откуда } f = 9,3 \text{ кгс.}$$

Итак, чтобы совершить подвиг, великану достаточно было тянуть канат с силой лишь 10 кгс!

Не думайте, что эта цифра — 10 кгс — только теоретическая и что на деле потребуется усилие гораздо большее. Напротив, наш результат даже преувеличен: при пеньковом канате и деревянной тумбе, когда коэффициент трения k больше, усилие потребуется до смешного ничтожное, лишь бы тумба была прочной и канат был достаточно крепким и мог выдержать натяжение. Вот почему даже слабый ребенок мог бы, навив канат 3–4 раза, не только повторить подвиг жюль-верновского богатыря, но и превзойти его.

От чего зависит крепость узлов?

В обыденной жизни мы, сами не подозревая, часто пользуемся выгодой, на которую указывает нам формула Эйлера. Что такое узел, как не бечевка, навитая на валик, роль которого в данном случае играет другая часть той же бечевки? Крепость всякого рода узлов — обыкновенных, “беседочных”, “морских”, завязок, бантов и т. п. — зависит исключительно от трения, которое здесь во много раз усиливается вследствие того, что бечевка обвивается вокруг себя, как канат вокруг тумбы. В этом нетрудно убедиться, проследив за изгибами шнура в узле. Чем больше изгибов,

чем больше раз шнурок обвивается вокруг себя — тем больше “угол навивания” и, следовательно, тем крепче узел.

Бессознательно пользуется тем же обстоятельством и портной, пришивая пуговицу. Он много раз обматывает нитку вокруг захваченного стежком участка материи и затем обрывает ее; если только нитка крепка, пуговица не отпорется. Здесь применяется уже знакомое нам правило: с увеличением числа оборотов нитки в прогрессии арифметической крепость шитья возрастает в прогрессии геометрической.

Если бы не было трения, мы не могли бы пользоваться пуговицами: нитки размотались бы под их тяжестью и пуговицы отвалились бы.

Если бы не было трения

Вы видите, как разнообразно и порой неожиданно проявляется трение в окружающей нас обстановке. Трение принимает участие, и притом весьма существенное, там, где мы о нем даже и не подозреваем. Если бы трение внезапно исчезло из мира, множество обычных явлений протекало бы совершенно иным образом ⁵.

Очень красочно пишет о роли трения французский физик Гильом:

“Всем нам случалось выходить в гололедицу: сколько усилий стоило нам удерживаться от падения, сколько смешных движений приходилось нам проделывать, чтобы устоять! Это заставляет нас признать, что обычно земля, по которой мы ходим, обладает драгоценным свойством, благодаря которому мы сохраняем равновесие без особых усилий. Та же мысль возникает у нас, когда мы едем на велосипеде по скользкой мостовой или когда лошадь скользит по асфальту и падает. Изучая подобные явления, мы приходим к открытию тех следствий, к которым приводит трение. Инженеры стремятся по возможности устранить его в машинах — и хорошо делают. В прикладной механике о трении говорится как о крайне нежелательном явлении, и это правильно, — однако лишь в узкой, специальной области. Во всех прочих случаях мы должны быть благодарны трению: оно дает вам возможность ходить, сидеть и работать без опасения, что книги и чернильница упадут на пол, что стол будет скользить, пока не упрется в угол, а перо выскользнет из пальцев.

Трение — это настолько распространенное явление, что нам, за редкими исключениями, не приходится призывать его на помощь: оно является к нам само.

Трение способствует устойчивости. Плотники выравнивают пол так, что столы и стулья остаются там, куда их поставили. Блюда, тарелки, стаканы, поставленные на стол, остаются неподвижными без

особых забот с нашей стороны, если только дело не происходит на пароходе во время качки.

Вообразим, что трение может быть устранено совершенно. Тогда никакие тела, будь они величиной с каменную глыбу или малы, как песчинки, никогда не удержатся одно на другом: все будет скользить и катиться, пока не окажется на одном уровне. Не будь трения, Земля представляла бы шар без неровностей, подобно жидкому"

К этому можно прибавить, что при отсутствии трения гвозди и винты выскальзывали бы из стен, ни одной вещи нельзя было бы удержать в руках, никакой вихрь никогда бы не прекращался, никакой звук не умолкал бы, а звучал бы бесконечным эхом, неослабно отражаясь, например, от стен комнаты.




Рис 21 Нагруженные сани на ледяной дороге *A*—колея, *B*—полоз, *C*—уплотненный снег, *D*—земляное основание дороги

Наглядный урок, убеждающий нас в огромной важности трения, дает нам всякий раз гололедица. Застигнутые ею на улице, мы оказываемся беспомощными и все время рискуем упасть. Вот поучительные выдержки из газет (декабрь 1927г.):

“Лондон, 21 Вследствие сильной гололедицы уличное и трамвайное движение в Лондоне заметно затруднено. Около 1400 человек поступило в больницы с переломами рук, ног...”

“При столкновении вблизи Гайд-Парка трех автомобилей и двух трамвайных вагонов машины были совершенно уничтожены из-за

взрыва бензина... ”

– “Париж, 21. Гололедица в Париже и его пригородах вызвала многочисленные несчастные случаи...”

Однако ничтожное трение на льду может быть успешно использовано технически. Уже обыкновенные сани служат тому примером. Еще лучше свидетельствуют об этом так называемые ледяные дороги, которые устраивали для вывозки леса с места рубки к железной дороге или к пунктам сплава. На такой дороге, имеющей гладкие ледяные рельсы, две лошади тащат сани, нагруженные 70 тоннами бревен (рис. 21).

Физическая причина катастрофы “Челюскина”

Из сказанного выше не следует делать поспешного вывода, что трение о лед ничтожно при всяких обстоятельствах. Даже при температуре, близкой к нулю, трение о лед бывает нередко довольно значительным. В связи с работой ледоколов тщательно изучалось трение льда полярных морей о стальную обшивку корабля. Оказалось, что оно неожиданно велико, не меньше трения железа по железу: коэффициент трения новой стальной судовой обшивки о лед равен 0,2.

Чтобы понять, какое значение имеет эта цифра для судов при плавании во льдах, разберемся в силах, действующих на борт MN судна при напоре льда (рис. 22). Сила P давления льда разлагается на две: силу R , перпендикулярную к борту, и силу F , направленную по касательной к борту. Угол между P и R равен углу наклона борта к вертикали. Сила Q трения льда о борт равна силе R , умноженной на коэффициент трения, т. е. на 0,2: $Q = 0,2R$. Если сила трения Q меньше F , сила F увлекает напиральный лед под воду⁶; лед скользит вдоль борта, не успевая причинить судну вред. Если же сила Q больше F , трение мешает скольжению льдины, и лед при продолжительном напоре может смять и продавить борт.

Когда же $Q < F$? Легко видеть, что $F = R \operatorname{tg} \alpha$; следовательно, должно существовать неравенство $Q < R \operatorname{tg} \alpha$; а так как $Q = 0,2R$, то неравенство $Q < F$ приводит к другому:

$$0,2R < R \operatorname{tg} \alpha, \text{ или } \operatorname{tg} \alpha > 0,2$$

По таблицам отыскиваем угол, тангенс которого 0,2; он равен 11° . Значит, $Q < F$ тогда, когда $\alpha > 11^\circ$. Тем самым определяется, какой наклон бортов корабля к вертикали обеспечивает безопасное плавание во льдах: наклон должен быть не меньше 11° .

Обратимся теперь к гибели “Челюскина”. Этот пароход (не ледокол) успешно прошел весь северный морской путь, но в Беринговом проливе оказался зажатый во льдах. Льды унесли “Челюскин” далеко на север и раздавили (в феврале 1934 г.). Двухмесячное героическое пребывание челюскинцев на льдине и спасение их героями-летчиками сохранилось у многих в памяти. Вот описание самой катастрофы:




Рис. 22. “Челюскин”, затертый во льдах. Внизу: силы, действующие на борт MN судна при напоре льда.

“Крепкий металл корпуса сдал не сразу,— сообщал по радио начальник экспедиции О. Ю. Шмидт.— Видно было, как льдина вдавливалась в борт и как над ней листы обшивки пучатся, изгибаясь наружу. Лед продолжал медленное, но неотразимое наступление. Вспученные железные листы обшивки корпуса разорвались по шву. С треском летели заклепки. В одно мгновение левый борт парохода был оторван от носового трюма до кормового конца палубы...”

После того, что сказано было в этой статье, читателю должна быть понятна физическая причина катастрофы.

Отсюда вытекают и практические следствия: при сооружении судов, предназначенных для плавания во льдах, не-

обходимо придать бортам их надлежащий уклон, а именно не менее 11° .

Самоуравновешивающаяся палка

На указательные пальцы расставленных рук положите гладкую палку, как показано на рис. 23. Теперь двигайте пальцы навстречу друг другу, пока они сойдутся вплотную




Рис. 23. Опыт с палкой.


Странная вещь! Окажется, что в этом окончательном положении палка не опрокидывается, а сохраняет равновесие. Вы проделываете опыт много раз, меняя первоначальное положение пальцев, но результат неизменно тот же: палка оказывается уравновешенной. Заменяв палку чертежной линейкой, тростью с набалдашником, бильярдным кием, половой щеткой, — вы заметите ту же особенность. В чем разгадка неожиданного финала?

Прежде всего ясно следующее: раз палка оказывается уравновешенной на примкнутых пальцах, то ясно, что пальцы сошлись под центром тяжести палки. (Тело остается в равновесии, если отвесная линия, проведенная из центра тяжести, проходит внутри границ опоры.)

Когда пальцы раздвинуты, большая нагрузка приходится на тот палец, который ближе к центру тяжести палки. С давлением растет и трение: палец, более близкий

к центру тяжести, испытывает большее трение, чем удаленный. Поэтому близкий к центру тяжести палец не скользит под палкой; двигается всегда тот палец, который дальше от этой точки. Как только двигавшийся палец окажется ближе к центру тяжести, нежели другой, пальцы меняются ролями; такой обмен совершается несколько раз, пока пальцы не сойдутся вплотную. И так как движется каждый раз только один из пальцев, именно тот, который дальше от центра тяжести, то естественно, что в конечном положении оба пальца сходятся под центром тяжести палки.

Рис. 24. Тот же опыт с половой щеткой. Почему весы не в равновесии?



Прежде чем с этим опытом покончить, повторите его с половой щеткой (рис. 24) и поставьте перед собой такой вопрос: если разрезать щетку в том месте, где она подпирается пальцами, и положить обе части на разные чашки весов, то какая чашка перетянет— с палкой или со щеткой?

Казалось бы, раз обе части щетки уравнивались одна другую на пальцах, они должны уравниваться и на чашках весов. В действительности же чашка со щеткой перетянет. О причине нетрудно догадаться, если принять в расчет, что, когда щетка уравнивалась на пальцах, силы веса обеих частей были приложены к неравным плечам рычага; в случае же весов те же силы приложены к концам равноплечего рычага.

Для “Павильона занимательной науки” ⁷ в Ленинградском парке культуры мною был заказан набор палок с различными положениями центра тяжести; палки разнимались на две обычно неравные части как раз в том месте, где находился центр тяжести. Кладя эти части на весы, посетители с удивлением убеждались, что короткая часть тяжелее длинной.

КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

Почему не падает вращающийся волчок?

Из тысяч людей, забавлявшихся в детстве с волчком, не многие смогут правильно ответить на этот вопрос. Как, в самом деле, объяснить то, что вращающийся волчок, поставленный отвесно или даже наклонно, не опрокидывается, вопреки ожиданиям? Какая сила удерживает его в таком, казалось бы, неустойчивом положении? Разве сила тяжести на него не действует?

Здесь имеет место весьма любопытное взаимодействие сил. Теория волчка не проста, и углубляться в нее мы не станем. Укажем лишь основную причину, вследствие которой вращающийся волчок не падает.

На рис. 25 изображен волчок, вращающийся в направлении стрелок. Обратите внимание на часть *A* его ободка и на часть *B*, противоположную ей. Часть *A* стремится двигаться *от вас*, часть *B* — *к вам*. Проследите теперь, какое движение получают эти части, когда вы наклоняете ось волчка *к себе* (рис. 26). Толчком вы заставляете часть *A* двигаться вверх, часть *B* — вниз; обе части получают толчок под прямым углом к их собственному движению. Но так как при быстром вращении волчка круговая скорость частей диска очень велика, то сообщаемая вами незначительная скорость,




Рис. 25. Почему волчок не падает?




Рис. 26. Вращающийся волчок, будучи подброшен, сохраняет первоначальное направление своей оси.

складываясь с большой круговой скоростью точки дает равнодействующую, весьма близкую к этой круговой,— и движение волчка почти не меняется. Отсюда понятно, почему волчок как бы сопротивляется попытке его опрокинуть. Чем массивнее волчок и чем быстрее он вращается, тем упорнее противодействует он опрокидыванию.

Сущность этого объяснения непосредственно связана с законом инерции. Каждая частица волчка движется по окружности в плоскости, перпендикулярной к оси вращения. По закону инерции частица в каждый момент стремится сойти с окружности на прямую линию, касательную к окружности. Но всякая касательная расположена в той же плоскости, что и сама окружность; поэтому каждая частица стремится двигаться так, чтобы все время оставаться в плоскости, перпендикулярной к оси вращения. Отсюда следует, что все плоскости в волчке, перпендикулярные к оси вращения, стремятся сохранить свое положение в пространстве, а поэтому и общий перпендикуляр к ним, т. е. сама ось вращения, также стремится сохранить свое направление.

Не будем рассматривать всех движений волчка, которые возникают при действии на него посторонней силы. Это потребовало бы чересчур подробных объяснений. Я хотел лишь разъяснить причину стремления всякого вращающегося тела сохранять неизменным направление оси вращения. Этим свойством широко пользуются в технике. Различные гироскопические (основанные на свойстве волчка) приборы— компасы, стабилизаторы и др.— устанавливаются на кораблях и самолетах ¹.

Таково полезное использование простой, казалось бы, игрушки.

Искусство жонглеров

Многие удивительные фокусы разнообразной программы жонглеров основаны тоже на свойстве вращающихся тел сохранять направление оси вращения (рис. 27 и 28). Позволю себе привести выдержку из увлекательной книги английского физика Джона Перри “Вращающийся волчок” ²:

“Однажды я показывал некоторые из моих опытов перед публикой, пившей кофе и курившей табак в великолепном помещении концертного зала “Виктория” в Лондоне, я старался заинтересовать моих слушателей, насколько мог, и рассказывал о том, что плоскому кольцу надо сообщить вращение, если его желают бросить так, чтобы можно было наперед указать, куда оно упадет; точно так же поступают, если

хотят кому-нибудь бросить шляпу так (рис. 29), чтобы он мог поймать этот предмет палкой. Всегда можно полагаться на сопротивление, которое оказывает вращающееся тело, когда изменяют направление его оси. Далее я объяснял моим слушателям, что, отполировав гладко дуло пушки, никогда нельзя рассчитывать на точность прицела; вследствие этого теперь делают нарезные дула, т. е. вырезают на внутренней стороне дула пушек спиралеобразные желоба, в которые приходится выступать ядра или снаряда, так что последний должен получить вращательное движение, когда сила взрыва пороха заставляет его двигаться по каналу пушки. Благодаря этому снаряд покидает пушку с точно определенным вращательным движением.



Рис. 27. Как летит монета, подброшенная с вращением.




Рис. 28. Монета, подброшенная без вращения, падает в случайном положении.

Это было все, что я мог сделать во время этой лекции, так как я не обладаю ловкостью в метании шляп или дисков. Но после того, как я закончил свою лекцию, на подмостки выступили два жонглера,— и я не мог пожелать лучшей иллюстрации упомянутых выше законов, нежели та, которую давал каждый отдельный фокус, показанный этими двумя артистами. Они бросали друг другу вращающиеся шляпы, обручи, тарелки, зонтики... Один из жонглеров бросал в воздух целый ряд ножей, ловил их опять и снова подбрасывал с большой точностью вверх; моя аудитория, только что прослушав объяснение этих явлений, ликовала от удовольствия; она замечала вращение, которое жонглер сообщал каждому ножу, выпуская его из рук так, что мог наверное знать, в каком положении нож снова вернется к нему. Я был тогда поражен, что почти все без исключения жонглерские фоку-




Рис. 29. Подброшенную шляпу легче поймать, если ей было сообщено вращение.

сы, показанные в тот вечер, представляли иллюстрацию изложенного выше принципа".

Новое решение колумбовой задачи

Свою знаменитую задачу о том, как поставить яйцо, Колумб решил чересчур просто: надломив его скорлупу*.

Такое решение, в сущности, неверно: надломив скорлупу яйца, Колумб изменил его *форму* и, значит, поставил не яйцо, а другое тело; ведь вся суть задачи в форме яйца: изменяя форму, мы заменяем яйцо другим телом³. Колумб дал решение не для того тела, для которого оно искалось.




Рис. 30. Решение колумбовой задачи: яйцо вращается, стоя на конце.

А между тем можно решить задачу великого мореплавателя, нисколько не изменяя форму яйца, если воспользоваться свойством волчка; для этого достаточно только привести яйцо во вращательное движение вокруг его длинной оси,— и оно будет, не опрокидываясь, стоять некоторое время на тупом или даже на остром конце. Как это сделать, показано на рис. 30: яйцу придают вращательное движение пальцами. Отняв руки, вы увидите, что яйцо

* Следует отметить, впрочем, что популярная легенда о колумбовом яйце не имеет под собой исторической почвы. Молва приписала знаменитому мореплавателю то, что было сделано гораздо раньше другим лицом и по совершенно другому поводу,— а именно итальянским архитектором Брунеллески (1377—1446), строителем огромного купола Флорентийского собора. ("Мой купол устоит так же надежно, как держится это яйцо на своем остром конце!")

продолжает еще некоторое время вращаться стоя: задача решена.

Для опыта необходимо брать непременно вареные яйца. Это ограничение не противоречит условию колумбовой задачи: предложив ее, Колумб взял яйцо тут же со стола, а к столу, надо полагать, поданы были не сырые яйца. Вам едва ли удастся заставить стоя вращаться яйцо сырое, потому что внутренняя жидкая масса является в данном случае как бы тормозом. В этом, между прочим, состоит простой способ отличать сырые яйца от сваренных вкрутую, известный всем хозяйкам.

“Уничтоженная” тяжесть

“Вода не выливается из сосуда, который вращается,— не выливается даже тогда, когда сосуд перевернут дном вверх, ибо этому мешает вращение”, — писал две тысячи лет назад Аристотель. На рис. 31 изображен этот эффектный опыт, который, без сомнения, многим знаком: вращая достаточно быстро ведро с водой, вы достигаете того, что вода не выливается даже в той части пути, где ведро опрокинуто вверх дном.

Обычно объясняют это явление “центробежной силой”, понимая под ней ту воображаемую силу, которая будто бы приложена к телу и обуславливает стремление его удалиться от центра вращения. Этой силы не существует: указанное стремление есть не что иное, как проявление *инерции*, а всякое движение по инерции осуществляется без участия силы. В физике под центробежной силой разумеют нечто иное, а именно — ту реальную силу, с какой вращающееся тело натягивает удерживающую его нить или давит на свой криволинейный путь. Сила эта приложена не к движущемуся телу, а к *препятствию*, мешающему ему двигаться прямолинейно: к нити, к рельсам на криволинейном участке пути и т. п.

Обращаясь к вращению ведерка, попытаемся разобраться в причине этого явления, не прибегая к двусмысленному понятию “центробежной силы”. Зададим себе вопрос: куда направится струя воды, если в стенке ведерка сделать отверстие? Не будь силы тяжести, водяная струя по инерции направилась бы по касательной AK к окружности AB (рис. 31). Сила же тяжести заставляет струю снижаться и описывать кривую (параболу) AP . Если круговая скорость достаточно велика, эта кривая расположится вне окружности AB . Струя

обнаруживает перед нами тот путь, по которому при вращении ведерка двигалась бы вода, если бы не препятствовало надавливающее на нее ведерко. Теперь понятно, что вода вовсе не стремится двигаться отвесно вниз, а потому и не выливается из ведерка. Она могла бы вылиться из него лишь в том случае, если бы ведерко было обращено отверстием в направлении его вращения.




Рис. 31. Почему не выливается вода из вращаемого ведерка?

Вычислите теперь, с какой скоростью надо в этом опыте вращать ведерко, чтобы вода из него не выливалась вниз. Скорость эта должна быть такова, чтобы центростремительное ускорение вращающегося ведерка было не меньше ускорения свободного падения: тогда путь, по которому стремится двигаться вода, будет лежать вне окружности, описываемой ведерком, и вода нигде от ведерка не отстанет. Формула для вычисления центростремительного ускорения w такова:

$$w = \frac{v^2}{R},$$

где v — круговая скорость, R — радиус кругового пути. Так как ускорение свободного падения на земной поверхности $g = 9,8 \text{ м/с}^2$, то имеем неравенство

$$\frac{v^2}{R} \geq 9,8 \text{ м/с}^2.$$

Если положить R равным 70 см, то

$$v \geq \sqrt{0,7 \text{ м} \cdot 9,8 \text{ м/с}^2} = 2,6 \text{ м/с}.$$

Легко рассчитать, что для получения такой круговой скорости надо делать рукой около полутора оборотов в секунду. Подобная частота вращения вполне достижима, и опыт удается без труда.

Способностью жидкости прижиматься к стенкам сосуда, в котором она вращается вокруг горизонтальной оси, пользуются в технике для так называемого *центробежного литья*. При этом имеет существенное значение то, что неоднородная жидкость расслаивается по плотности: более тяжелые составные части располагаются дальше от оси вращения, легкие занимают место ближе к оси. Вследствие этого все газы, содержащиеся в расплавленном металле и образующие так называемые “раковины” в литье, выделяются из металла во внутреннюю, полую часть отливки. Изделия, изготовленные таким способом, получаются плотными и свободными от раковин. Центробежное литье дешевле обычного литья под давлением и не требует сложного оборудования.

Вы в роли Галилея

Для любителей сильных ощущений иногда устраивается весьма своеобразное развлечение — так называемая “чертова качель”. Имелась такая качель и в Ленинграде. Вот ее описание из сборника научных забав Федо (рис. 32):

“Качель подвешена к прочной горизонтальной перекладине, перекинутой через комнату на известной высоте над полом. Когда все сядут, особо приставленный к этому служитель запирает входную дверь, убирает доску, служившую для входа, и, заявив, что он сейчас даст возможность зрителям сделать небольшое воздушное путешествие, начинает легонько раскачивать качель. Вслед за тем он садится назади качели, подобно кучеру на запятках, или совсем выходит из зала.

Между тем размахи качели становятся все больше и больше; она, по-видимому, поднимается до высоты перекладины, потом переходит за нее, выше и выше и, наконец, описывает полный круг. Движение ускоряется все заметнее, и качающиеся, хотя по большей части уже предупрежденные, испытывают несомненные ощущения качания и быстрого движения; им кажется,




Рис. 32. Схема устройства “чертовой качели”

что они несутся вниз головой в пространстве, так что невольно хватаются за спинки сидений, чтобы не упасть.

Но вот размахи начинают уменьшаться; качель более не поднимается уже на высоту перекладки, а еще через несколько секунд останавливается совершенно.

На самом же деле качель *все время висела неподвижно*, пока продолжался опыт, а сама комната, с помощью очень несложного механизма, обращалась мимо зрителей вокруг горизонтальной оси. Разного рода мебель была прикреплена к полу или стенам зала; лампа, припаянная к столу так, что она, по-видимому, легко могла переворачиваться, состояла из электрической лампочки накаливания, скрытой под большим колпаком. Служитель, который, по-видимому, раскачивал качель, давая ей легкие толчки, в сущности, сообразовал их с легкими колебаниями зала и делал только вид, что раскачивает. Вся обстановка способствовала полному успеху обмана".

Секрет иллюзии, как видите, прост до смешного. И все-таки, если бы теперь, уже зная, в чем дело, вы очутились на "чертовой качели", вы неизбежно поддались бы обману. Такова сила иллюзии!

Помните стихотворение Пушкина "Движение"?

— Движенья нет, — сказал мудрец брадатый*
Другой** смолчал — и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить.
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день над нами Солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей!

Среди пассажиров качели, не посвященных в ее секрет, вы были бы своего рода Галилеем — только наоборот: Галилей доказывал, что Солнце и звезды неподвижны, а кружимся, вопреки очевидности, мы сами; вы же будете доказывать, что неподвижны мы, а вся комната вертится вокруг нас. Возможно, что вам пришлось бы при этом испытать и печальную участь Галилея: на вас смотрели бы, как на человека, спорящего против очевидных вещей...

* Греческий философ Зенон Элейский (V век до нашей эры), учивший, что все в мире неподвижно и что только вследствие обмана чувств нам кажется, будто какое-либо тело движется. — Я. П.

** Диоген. — Я. П.

Мой спор с вами

Доказать свою правоту вам будет не так легко, как вы, может быть, полагаете. Вообразите, что вы в самом деле очутились на “чертовой качели” и хотите убедить ваших соседей, что они заблуждаются. Предлагаю вам вступить в этот спор со мной. Сядем с вами на “чертову качель”, дождемся момента, когда, раскачавшись, она начнет, по-видимому, описывать полные круги, и заведем диспут о том, что вращается: качель или вся комната? Прошу только помнить, что во время спора мы не должны покидать качели; все необходимое захватим о собой заблаговременно.

Вы. Как можно сомневаться в том, что мы неподвижны, а вращается комната! Ведь если бы нашу качель в самом деле опрокинуть вверх дном, то мы с вами не повисли бы вниз головой, а выпали бы из нее. Но мы не падаем. Значит, вращается не качель, а комната.

Я. Однако вспомните, что вода из быстро вращающегося ведерка не выливается, хотя оно и опрокидывается вверх дном (см. выше). Велосипедист в “чертовой петле” (см. далее) также не падает, хотя и едет вниз головой.

Вы. Если так, то вычислим центростремительное ускорение и убедимся, достаточно ли оно для того, чтобы мы не выпали из качели. Зная наше расстояние от оси вращения и число оборотов в единицу времени, мы легко определим по формуле...

Я. Не трудитесь вычислять. Устроители “чертовой качели”, зная о нашем споре, предупредили меня, что число оборотов будет вполне достаточно, чтобы явление объяснялось по-моему. Следовательно, вычисление не решит нашего спора.

Вы. Однако я не потерял надежды вас переубедить. Видите, вода из этого стакана не выливается на пол.. Впрочем, вы и тут сошлетесь на опыт с вращающимся ведерком. Хорошо же: я держу в руке отвес, — он все время направлен к нашим ногам, т. е. вниз. Если бы вращались мы, а комната оставалась неподвижной, отвес был бы все время обращен к полу, т. е. вытягивался бы то к нашим головам, то вбок.

Я. Ошибаетесь: если мы вращаемся с достаточной скоростью, то отвес все время должен отбрасываться от оси вдоль радиуса вращения, т. е. к нашим ногам, как мы и наблюдаем.

Финал нашего спора

Теперь позвольте вам посоветовать, как одержать победу в этом споре. Надо взять с собой на “чертову качель” пружинные весы, положить на их чашку гирию, например весом 1 кгс, и следить за положением указателя: он все время будет показывать один и тот же вес, именно 1 кгс. Это и есть доказательство неподвижности качели.

В самом деле: если бы мы вместе с пружинными весами описывали круги около оси, то на гирию, кроме силы тяжести, действовал бы также центробежный эффект, который в нижних точках пути *увеличивал* бы вес гири, а в верхних *уменьшал* бы его; мы должны были бы замечать, что гирия то становится тяжелее, то почти ничего не весит. А раз этого не замечается, значит, вращается комната, а не мы.

В “заколдованном” шаре

Один предприниматель в Америке устроил для развлечения публики очень забавную и поучительную карусель в форме шарообразной вращающейся комнаты. Люди внутри нее испытывают такие необыкновенные ощущения, какие мы считаем возможными разве только во сне или в волшебной сказке.





Рис. 33. Что испытывает человек на краю вращающейся платформы.

Вспомним сначала, что испытывает человек, стоящий на быстро вращающейся круглой платформе. Вращающаяся платформа стремится отбросить человека наружу; чем дальше стоите вы от центра, тем сильнее будет клонить и тянуть вас наружу. Если закроете глаза, вам будет казаться, что вы стоите не на горизонтальном полу, а на наклонной плоскости, на которой с трудом сохраняете равновесие. Это станет понятно, когда рассмотрим, какие силы действуют здесь на ваше тело (рис. 33). Центробежная сила C увлекает ваше тело наружу, сила тяжести G тянет вниз; обе силы, складываясь по правилу параллелограмма, дают результирующую силу R , которая

наклонена вниз ⁴ Чем быстрее вращается платформа, тем эта результирующая сила больше и направляется более отлого.

Представьте же себе теперь, что край платформы загнут вверх и вы стоите на этой отогнутой наклонной части

Рис. 34 Человек прочно стоит на наклонной части вращающейся платформы



(рис. 34). Если платформа неподвижна, вы в таком положении не удержитесь, а сползете или даже опрокинетесь. Другое дело, если платформа вращается: тогда эта наклонная плоскость станет для вас, при известной скорости, как бы горизонтальной, потому что результирующая обоих увлекающих вас сил C и G направится тоже наклонно, под прямым углом к наклонной части платформы*.

Если вращающейся платформе придать такую кривизну, чтобы при определенной скорости ее поверхность была в каждой точке перпендикулярна к результирующей силе, то помещенный на ней человек будет чувствовать себя во всех ее точках, как на горизонтальной плоскости. Вычислено, что такой криволинейной поверхностью является поверхность особого геометрического тела — *параболоида*. Ее можно получить, если быстро вращать вокруг вертикальной оси бокал, до половины налитый водой: тогда вода у краев поднимется, в центре опустится, и поверхность ее примет форму параболоида.

Если вместо воды налить в бокал растопленный воск и продолжать вращение до тех пор, пока воск не остынет, то затвердевшая поверхность его даст нам точную форму параболоида. При определенной скорости вращения такая поверхность является для помещенных на нее тел как бы горизонтальной: шарик, положенный в любую ее точку, не скатывается вниз, а остается на этом уровне (рис. 35).

* Этим, заметим кстати, объясняется, почему на закруглениях железнодорожного пути наружный рельс укладывают выше внутреннего, а также почему наклоняют внутрь трековую дорожку для велосипедов и мотоциклов и почему гонщики-профессионалы могут ехать по круто наклоненному круговому настилу

Теперь легко будет понять устройство “заколдованного” шара. Дно его (рис. 36) составляет большая вращающаяся




Рис. 35. Если этот бокал вращать с достаточной скоростью, то шарик не скатится на его дно.

платформа, которой придана форма параболоида. Хотя вращение благодаря скрытому под платформой механизму совершается чрезвычайно плавно, все же люди на платформе испытывали бы головокружение, если бы окружающие предметы не перемещались вместе с ними. Чтобы не дать возможности наблюдателю обнаружить движение, платформу помещают внутри большого шара с непрозрачными стенками, который вращается с такой же скоростью, как и сама платформа.

Таково устройство этой карусели, носящей название “заколдованного” или “волшебного” шара. Что же испытываете вы, находясь на платформе внутри шара? Когда он вращается, пол под вашими ногами горизонтален, в какой бы точке параболической платформы вы ни находились, — у оси, где пол действительно горизон-




Рис. 36. “Заколдованный” шар.

тален, или у края, где он наклонен на 45° . Глаза ясно видят вогнутость, чувство равновесия свидетельствует, что под вами ровное место.

“Показания” обоих чувств противоречат друг другу самым резким образом. Если вы перейдете с одного края платформы на другой, то вам покажется, будто весь огромный шар с легкостью мыльного пузыря перевалился на другой бок под тяжестью вашего тела: ведь во всякой точке вы чувствуете себя, как на горизонтальной плоскости (рис. 37). А положение других людей, стоящих на платформе наклонно, должно представляться вам до крайности необычайным: вам буквально будет казаться, что люди, как мухи, ходят по стенам (рис. 38).




Рис. 37. Истинное положение людей внутри “заколдованного” шара.




Рис. 38. Положение, которое представляется при этом каждому из двух посетителей

Вода, вылитая на пол “заколдованного” шара, растеклась бы ровным слоем по его поверхности. Людям казалось бы что вода здесь стоит перед ними наклонной стеной.

Привычные представления о законах тяготения словно отменяются в этом удивительном шаре, и мы переносимся в сказочный мир чудес...

Подобные ощущения испытывает на поворотах летчик. Так, если он летит со скоростью 200 км/ч по кривой с радиусом 500 м, то земля должна казаться* ему приподнявшейся и наклоненной на 16° .

В Геттингене была сооружена для научных изысканий подобная вращающаяся лаборатория. Это (рис. 39) цилиндрическая комната 3 м в поперечнике, вращающаяся со скоростью до 50 оборотов в секунду. Так как пол комнаты плоский, то при вращении наблюдателю, стоящему у стены,

* См. гл. 5 моей “Занимательной механики”

кажется, будто комната откинулась назад, а сам он полулежит на покатой стене (рис. 40)




Рис 39. Действительное положение вращающейся лаборатории




Рис. 40. Кажущееся положение той же вращающейся лаборатории

Жидкий телескоп

Наилучшая форма для зеркала отражательного телескопа — параболическая, т. е. именно та форма, какую сама собой принимает поверхность жидкости во вращающемся сосуде. Конструкторы телескопов затрачивают много хлопотливого труда, чтобы придать зеркалу подобную форму. Изготовление зеркала для телескопа длится целые годы. Американский физик Роберт Вуд обошел эти затруднения, устроив *жидкое зеркало*: вращая ртуть в широком сосуде, он получил идеальную параболическую поверхность, которая могла играть роль зеркала, так как ртуть хорошо отражает лучи света. Телескоп Вуда был установлен в неглубоком колодце.

Недостаток телескопа, однако, тот, что малейший толчок морщит поверхность жидкого зеркала и искажает изображение, а также и тот, что зеркало дает возможность непосредственно рассматривать только те светила, которые находятся в зените.

“Чертова петля”

Быть может, вам знаком головокружительный велосипедный трюк, иногда исполняемый в цирках: велосипедист едет в петле снизу вверх и описывает полный круг, несмотря на то, что по верхней части круга ему приходится *ехать вниз головой*. На арене устраивают деревянную дорожку в виде петли с одним или несколькими завитками, как изображено на рис. 41. Артист спускается на велосипеде по наклонной




Рис 41 “Чертова петля” Внизу справа— схема для расчета

части петли, затем быстро взлетает на своем стальном коне вверх, по круговой ее части, совершает полный оборот, буквально вниз головой, и благополучно съезжает на землю*.

Этот головоломный велосипедный фокус кажется зрителям верхом акробатического искусства. Озадаченная публика в недоумении спрашивает себя: какая таинственная сила удерживает смельчака вниз головой? Недоверчиво настроенные готовы подозревать здесь ловкий обман, а между тем в трюке нет ничего сверхъестественного. Он всецело объясняется законами механики. Биллиардный шар, пущенный по этой дорожке, выполнил бы то же с не меньшим успехом.

* “Чертова петля” изобретена в 1902 г одновременно двумя цирковыми артистами— “Дьяволом” (Джонсоном) в “Мефисто” (Нуазеттом)

Знаменитый исполнитель и изобретатель этого трюка, артист “Мефисто”, для испытания прочности “чертовой петли” имел тяжелый шар, масса которого равнялась массе артиста вместе с велосипедом. Шар этот пускали по дорожке петли, и если он благополучно пробежал ее, то артист решался проделать петлю сам.

Читатель, конечно, догадывается, что причина странного явления — та же, которая объясняет общеизвестный опыт с вращающимся ведром. Однако трюк удастся не всегда; необходимо в точности рассчитать высоту, с которой велосипедист должен начать свое движение: иначе трюк окончится катастрофой.

Математика в цирке

Я знаю, что ряды “бездушных” формул отпугивают иных любителей физики. Но, отказываясь от знакомства с математической стороной явлений, такие недруги математики лишают себя удовольствия заранее предусматривать ход явления и определять его условия. В данном, например, случае две-три формулы помогут нам в точности определить, при каких условиях возможно успешное выполнение столь удивительного трюка, как пробег в “чертовой петле”.

Приступим же к расчетам.

Обозначим буквами те величины, с которыми придется вести расчеты:

h — *высота*, с которой скатывается велосипедист.

x — та часть высоты h , которая возвышается над верхней точкой “петли”; из рис. 41 видно, что $x = h - AB$;

R — *радиус* петли;

m — *общая масса* артиста вместе с велосипедом; сила тяжести их выразится тогда через mg , где g — *ускорение свободного падения*, равное, как известно, 9, 8 м/с²;

v — *скорость* велосипедиста в тот момент, когда он достигает самой верхней точки круга.

Все эти величины мы можем связать двумя уравнениями. Во-первых, мы знаем, что скорость, которую приобретает велосипедист к моменту, когда катясь по наклонной дорожке, он находится в точке C , на уровне точки B (см. рис. 41), равна той, какую он имеет в верхней части петли, в точке B^5 .

Скорость велосипедиста в точке C выражается формулой*.

$$v = \sqrt{2gx}, \text{ или } v^2 = 2gx.$$

Следовательно, и скорость велосипедиста в точке B равна

$$v = \sqrt{2gx}, \text{ или } v^2 = 2gx.$$

Далее, для того чтобы велосипедист, достигнув высшей точки кругового пути, не упал вниз, нужно (ср. с. 284), чтобы развивающееся при этом центростремительное ускорение было больше ускорения свободного падения, т. е. надо, чтобы

$$\frac{v^2}{R} > g, \text{ или } v^2 > gR$$

Но мы уже знаем, что $v^2 = 2gx$; следовательно,

$$2gx > gR, \text{ или } x > \frac{R}{2}.$$

Итак, мы узнали, что для успешного выполнения этого головокружительного фокуса необходимо устроить “чертову петлю” так, чтобы вершина наклонной части пути возвышалась над верхней точкой петли больше чем на $1/2$ ее радиуса. Крутизна наклона роли не играет, — нужно только, чтобы пункт, с которого велосипедист начинает спускаться, возвышался над вершиной петли больше чем на $1/4$ ее диаметра. Если, например, петля имеет в диаметре 16 м, то артист должен начать спуск не меньше чем с 20-метровой высоты. Не выполни он этого условия, никакое искусство не поможет ему описать “чертову петлю”: достигнув ее верхней части, он неминуемо упадет.

Расчет этот не учитывает влияния силы трения в велосипеде: считается, что скорости в точке C и точке B одинаковы. Поэтому нельзя слишком удлинять путь и делать очень пологий спуск. При пологом спуске в результате действия трения скорость велосипеда по достижении точки B будет меньше, чем в точке C .

Надо заметить, что при исполнении этого трюка велосипедист едет без цепи, предоставляя машину действию силы тяжести: ни ускорять, ни замедлять своего движения он не может, да и не должен. Все его искусство в том, чтобы держаться середины деревянной дорожки; при малейшем

* При этом мы пренебрегаем энергией вращающихся ободов велосипедных колес; влияние этого обстоятельства на результат расчета незначительно (см. §47 моей книги “Знаете ли вы физику?”).

уклонении артист рискует съехать с дорожки и быть отброшенным в сторону. Скорость движения по кругу весьма велика: при круге с диаметром 16 м, ездок совершает оборот за 3 секунды. Это соответствует скорости 60 км/ч! Управлять велосипедом при такой скорости, конечно, мудро; но этого и не надо; можно смело положиться на законы механики. “Сам по себе велосипедный трюк,— читаем мы в брошюре Бостонса ”Велосипедные аттракционы”,— при правильном расчете и прочной конструкции аппарата не опасен. Опасность трюка лежит в самом артисте. Если рука артиста дрогнет, если он будет взволнован, потеряет самообладание, если ему неожиданно сделается дурно, то можно ожидать всего”.

На этом же законе покоится всем известная “мертвая петля” и другие фигуры высшего пилотажа. В “мертвой петле” первостепенную роль играет правильный “разгон” пилота по кривой и умелое управление самолетом.

Нехватка в весе

Какой-то шутник объявил однажды, что знает способ без обмана обвешивать покупателей. Секрет состоит в том, чтобы покупать товары в странах экваториальных, а продавать— поближе к полюсам. Давно известно, что близ экватора вещи имеют меньший вес, нежели близ полюсов; гиля массой 1 кг, перенесенная с экватора на полюс, прибавится в весе на 5 гс. Надо пользоваться, однако, не рычажными весами, а пружинными, притом изготовленными (градуированными) на экваторе, иначе никакой выгоды не получится: товар станет тяжелее и на столько же тяжелее сделаются гири. Если купить золото где-нибудь в Перу, а сбыть его, скажем в Исландии, то можно, пожалуй, на этом кое-что заработать,— при бесплатном провозе, разумеется.

Не думаю, чтобы подобная торговля могла кого-нибудь обогатить, но по существу шутник прав: сила тяжести действительно увеличивается с удалением от экватора. Происходит это оттого, что тела на экваторе описывают при вращении Земли самые большие круги, а также и оттого, что земной шар как бы вздут у экватора ⁶.

Главная доля недостачи веса обусловлена вращением Земли; оно уменьшает вес тела близ экватора на 1/290 долю по сравнению с весом того же тела у полюсов.

Разница в весе при переносе тела с одной широты на другую для легких тел ничтожна. Но для тяжелых грузов она

может достигнуть величины довольно солидной. Вы и не подозревали, например, что паровоз, весящий в Москве 60 тс, по прибытии в Архангельск становится на 60 кгс тяжелее, а по прибытии в Одессу — на столько же легче. В свое время с острова Шпицбергена ежегодно вывозили в более южные порты до 300 000 т угля. Если бы это количество было доставлено в какой-нибудь экваториальный порт, то там обнаружена была бы недостача в весе 1200 тс, будь груз перевешен при приемке на пружинных весах, вывезенных со Шпицбергена. Линкор, весивший в Архангельске 20 000 тс, по прибытии в экваториальные воды становится легче на 80 тс; но это остается неощутимым, так как соответственно становятся легче и все другие тела, не исключая, конечно, и воды в океане*.

Если бы земной шар вращался вокруг своей оси быстрее (например, если бы сутки длились не 24 часа, а, скажем, 4 часа), то разница в весе тел на экваторе и полюсах была бы заметна резче. При четырехчасовых сутках, например, гиря, весящая на полюсе 1 кгс, весила бы на экваторе всего 875 гс. Именно таковы приблизительно условия тяжести на Сатурне: близ полюсов этой планеты все тела на $1/6$ долю тяжелее, чем на экваторе.

Так как центростремительное ускорение возрастает пропорционально квадрату скорости, то нетрудно вычислить, при какой скорости вращения оно на земном экваторе должно стать в 290 раз больше, т. е. сравняться с ускорением свободного падения. Это наступит при скорости в 17 раз большей, нежели нынешняя ($17^2 \approx 290$). В таком состоянии тела перестанут оказывать давление на свои опоры. Другими словами, если бы Земля вращалась в 17 раз быстрее, тела на экваторе *совсем не имели бы веса!* На Сатурне это наступило бы при скорости вращения всего в 2,5 раза большей, чем нынешняя.

* Поэтому, между прочим, судно сидит в экваториальных водах столь же глубоко, как и в полярных; — оно хотя и делается легче, но на столько же легче становится и вытесняемая им вода.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ВСЕМИРНОЕ ТЯГОТЕНИЕ

Велика ли сила притяжения?

“Если бы мы не наблюдали ежеминутно падения тел, оно было бы для нас самым удивительным явлением”, — писал знаменитый французский астроном Араго. Привычка делает то, что притяжение всех земных предметов Землей кажется нам естественным и обычным явлением. Но когда нам говорят, что предметы притягивают также и *друг друга* мы не склонны этому верить, потому что в обыденной жизни ничего подобного не замечаем.

Почему, в самом деле, закон всемирного тяготения не проявляется постоянно вокруг нас в обычной обстановке? Почему не видим мы, чтобы притягивали друг друга столы, арбузы, люди? Потому что для небольших предметов сила притяжения чрезвычайно мала. Приведу наглядный пример. Два человека, стоящих на 2 метра друг от друга, притягивают один другого, но сила этого притяжения ничтожна: для людей средней массы — менее 0,01 миллиграмм-силы. Это значит, что два человека притягивают друг друга с такой же силой, с какой гирька массой 0,01 миллиграмма давит на чашку весов; только чрезвычайно чувствительные весы научных лабораторий способны обнаружить столь ничтожный грузик!

Такая сила, понятно, не может сдвинуть нас с места, — этому мешает трение наших подошв о пол. Чтобы сдвинуть нас, например, на деревянном полу (сила трения подошв о пол равна 30% веса тела), нужна сила не меньше 20 кгс. Смешно даже сравнивать эту силу с ничтожной силой притяжения в 0,01 мкс. Миллиграмм — тысячная часть грамма; грамм — тысячная часть килограмма; значит, 0,01 мкс составляет половину *одной миллиардной* доли той силы, которая нужна, чтобы сдвинуть нас с места! Удивительно ли, что при обычных условиях мы не замечаем и намек на взаимное притяжение земных тел?

Другое дело, если бы трения не существовало; тогда ничто не мешало бы даже слабому притяжению вызвать сближение тел. Но при силе 0,01 мгс скорость этого сближения должна быть совершенно ничтожной. Можно вычислить, что при отсутствии трения два человека, отстоящих на расстояние 2 м, в течение первого часа придвинулись бы друг к другу на 3 см; в течение следующего часа они сблизились бы еще на 9 см; в течение третьего часа — еще на 15 см. Движение все ускорялось бы, но вплотную оба человека сблизились бы не ранее чем через пять часов.

Притяжение земных тел можно обнаружить в тех случаях, когда сила трения не служит препятствием. Груз, подвешенный на нити, находится под действием силы земного притяжения, и поэтому нить имеет отвесное направление; но если вблизи груза находится какое-нибудь массивное тело, которое притягивает груз к себе, то нить слегка отклоняется от отвесного положения и направляется по равнодействующей сил земного притяжения и притяжения другого тела, относительно очень слабого. Такое отклонение отвеса вблизи большой горы впервые наблюдал в 1775 г. Маскелейн в Шотландии; он сравнил направление отвеса с направлением к полюсу звездного неба с двух сторон одной и той же горы. Впоследствии более совершенные опыты с притяжением земных тел при помощи весов особого устройства позволили точно измерить силу тяготения.

Сила тяготения между небольшими массами ничтожна. При увеличении масс она возрастает пропорционально их произведению. Но тут многие склонны преувеличивать эту силу. Один ученый — правда, не физик, а зоолог, — пытался уверить меня, что взаимное притяжение, наблюдаемое нередко между морскими судами, вызывается силой всемирного тяготения! Нетрудно показать вычислением, что тяготение здесь ни при чем: два корабля, массой 25 000 т каждый, на расстояния 100 м притягивают друг друга с силой всего 400 гс. Разумеется, такая сила недостаточна, чтобы сообщить кораблям в воде хотя бы ничтожное перемещение. Истинную причину загадочного притяжения кораблей мы объясним в гл. 6.

Ничтожная для небольших масс сила тяготения становится весьма ощутимой, когда речь идет о колоссальных массах небесных тел. Так, даже Нептун, очень далекая от нас планета, медленно вращающаяся почти на краю Солнечной системы, шлет нам свой “привет” притяжением Земли с силой 18 млн. тонна-сил! Несмотря на огромное

расстояние, отделяющее нас от Солнца, Земля удерживается на своей орбите лишь силой тяготения. Если бы сила солнечного притяжения почему-либо исчезла, Земля полетела бы по линии, касательной к ее орбите, и навеки умчалась бы в бездонную глубь мирового пространства (рис. 42).




Рис. 42. Притяжение Солнца искривляет путь Земли *E*. Вследствие инерции земной шар стремится умчаться по касательной *ER*.

Стальной канат от Земли до Солнца

Вообразите, что могущественное притяжение Солнца почему-либо в самом деле исчезло и Земле предстоит печальная участь навсегда удалиться в холодные и мрачные пустыни Вселенной. Вы можете представить себе — здесь необходима фантазия, — что инженеры решили, так сказать, заменить невидимые цепи притяжения материальными связями, т. е. попросту задумали соединить Землю с Солнцем крепкими стальными канатами, которые должны удерживать земной шар на круговом пути в его движении вокруг Солнца. Что может быть крепче стали, способной выдерживать силу натяжения 100 кгс на каждый квадратный миллиметр? Представьте себе мощную стальную колонну диаметром 5 м. Площадь ее сечения включает круглым счетом 20 000 000 мм²; следовательно, такая колонна разрывается лишь от груза весом 2 000 000 тс.

Вообразите далее, что колонна эта простирается от Земли до самого Солнца, соединяя оба светила. Знаете ли вы, сколько таких могучих колонн потребовалось бы для удержания Земли на ее орбите? Миллион миллионов! Чтобы нагляднее представить себе этот лес стальных колонн, густо усеивающих все материки и океаны, прибавлю, что при равномерном распределении их по всей обращенной к Солнцу половине земного шара промежутки между соседними колоннами были бы лишь немногим шире самих колонн. Вообразите силу, необходимую для разрыва этого огромного леса стальных колонн, и вы получите представ-

ление омогушеству невидимой силы взаимного притяжения Земли и Солнца.

И вся эта колоссальная сила проявляется лишь в том, что она, искривляя путь движения Земли, каждую секунду заставляет Землю уклоняться от касательной на 3 мм; благодаря этому путь нашей планеты и превращается в замкнутый, эллиптический. Не странно ли: чтобы перемещать Землю каждую секунду на 3 мм, нужна такая исполинская сила! Это только показывает, как огромна *масса* земного шара, если даже столь чудовищная сила может сообщить ей лишь весьма незначительное перемещение.

Можно ли укрыться от силы тяготения?

Сейчас мы фантазировали о том, что было бы, если бы взаимное притяжение между Солнцем и Землей исчезло: освободившись от невидимых цепей притяжения, Земля умчалась бы в бесконечный простор Вселенной. Теперь пофантазируем на другую тему: что стало бы со всеми земными предметами, если бы не было силы тяготения? Ничто не привязывало бы их к нашей планете, и при малейшем толчке они уносились бы прочь в межпланетное пространство. Не пришлось бы, впрочем, дожидаться и толчка: вращение нашей планеты раскидало бы в пространство все, что непрочно связано с ее поверхностью.

Английский писатель Уэллс воспользовался подобного рода идеей, чтобы описать в романе фантастическое путешествие на Луну. В этом произведении (“Первые люди на Луне”) остроумный романист указывает на очень оригинальный способ путешествовать с планеты на планету. А именно: ученый, герой его романа, изобрел особый состав, который обладает замечательным свойством — непроницаемостью для силы тяготения. Если слой такого состава подвести под какое-нибудь тело, оно освободится от притяжения Земли и будет подвержено действию притяжения только остальных тел. Это фантастическое вещество Уэллс назвал “кеворитом” — по имени его вымышленного изобретателя Кевора.

“Мы знаем, — пишет романист, — что для всемирного тяготения то есть для силы тяжести, проникаемы все тела. Вы можете поставить преграды, чтобы отрезать лучам света доступ к предметам, с помощью металлических листов можете оградить предмет от доступа электрических волн радиотелеграфа, — но никакими преградами не можете вы защитить предмет от действия тяготения Солнца или от

силы земной тяжести. Отчего, собственно, в природе нет подобных преград для тяготения,— трудно сказать. Однако Кевор не видел причин, почему бы и не существовать такому веществу, непроницаемому для тяготения; он считал себя способным искусственно создать такое непроницаемое для тяготения вещество.

Всякий обладающий хоть искрой воображения легко представит себе, какие необычайные возможности открывает перед нами подобное вещество. Если, например, нужно поднять груз, то, как бы огромен он ни был, достаточно будет разостлать под ним лист из этого вещества,— и груз можно будет поднять хоть соломинкой"

Обладея таким замечательным веществом, герои романа сооружают небесный корабль, в котором и совершают смелый полет на Луну. Устройство снаряда весьма несложно: в нем нет никакого двигательного механизма, так как он перемещается действием притяжения светил.

Вот описание этого фантастического снаряда:

"Вообразите себе шарообразный снаряд, достаточно просторный, чтобы вместить двух человек с их багажом. Снаряд будет иметь две оболочки— внутреннюю и наружную; внутренняя из толстого стекла, наружная— стальная. Можно взять с собой запас сжатого воздуха, концентрированной пищи, аппараты для дистилляции воды и т. п. Стальной шар будет весь снаружи покрыт слоем "кеворита". Внутренняя стеклянная оболочка будет сплошная, кроме люка; стальная же будет состоять из отдельных частей, и каждая такая часть может сворачиваться, как штора. Это легко устроить посредством особых пружин; шторы можно будет опускать и свертывать электрическим током, проводимым по платиновым проводам в стеклянной оболочке. Но это уже технические подробности. Главное то, что наружная оболочка снаряда будет вся состоять как бы из окон и "кеворитных" штор. Когда все шторы наглухо спущены, внутрь шара не может проникнуть ни свет, ни какой-либо вообще вид лучистой энергии, ни сила всемирного тяготения. Но вообразите, что одна из штор поднята,— тогда любое массивное тело, которое случайно находится вдали против этого окна, притянет нас к себе. Практически мы сможем путешествовать в мировом пространстве в том направлении, в каком пожелаем притягиваемые то одним, то другим небесным телом"

Как полетели на Луну герои Уэллса

Интересно описан у романиста момент отправления межпланетного вагона в путь. Тонкий слой "кеворита", покрывающий наружную поверхность снаряда, делает его как бы совершенно невесомым. Вы понимаете, что невесомое тело не может лежать спокойно на дне воздушного океана; с ним должно произойти то же, что произошло бы с пробкой,

погруженной на дно озера: пробка быстро всплыла бы на поверхность воды. Точно так же невесомый снаряд, отбрасываемый к тому же и инерцией вращения земного шара, должен стремительно взлететь ввысь и, дойдя до крайних границ атмосферы, свободно продолжать свой путь в мировом пространстве. Герои романа так и полетели. А очутившись в мировом пространстве, они, открывая одни заслонки, закрывая другие, подвергая внутренность снаряда притяжению то Солнца, то Земли, то Луны, добрались до поверхности нашего спутника. Впоследствии один из путешественников в том же снаряде возвратился на Землю.

Не будем останавливаться здесь на разборе идеи Уэллса по существу, — это сделано мною в другом месте*, где я и выяснил ее несостоятельность. Поверим пока остроумному романисту и последуем за его героями на Луну.

Полчаса на Луне

Посмотрим, как чувствовали себя герои романа Уэллса, очутившись в мире, где сила тяжести слабее, меньше, чем на Земле.

Вот эти любопытные страницы** романа “Первые люди на Луне”. Рассказ ведется от лица одного из жителей Земли, только что прибывших на Луну.

“Я принялся вывинчивать крышку снаряда. Став на колени, я высунулся из люка; внизу, на расстоянии трех футов от моей головы, лежал девственный снег Луны.

Закутавшись в одеяло, Кевор сел на край люка и стал осторожно свешивать ноги. Спустив их до высоты полуфута над почвой, он после минутного колебания соскользнул вниз на почву лунного мира.

Я следил за ним через стеклянную оболочку шара. Пройдя несколько шагов, он постоял минуту, озираясь кругом, затем решился и — прыгнул вперед.

Стекло искажало его движения, но мне казалось, что это и в действительности был чересчур большой прыжок. Кевор сразу очутился от меня на расстоянии 6—10 метров. Стоя на скале он делал мне какие-то знаки; возможно, что он и кричал, — однако звуки не достигали меня. Но как он проделал свой прыжок?

Озадаченный, я пролез через люк и тоже спустился вниз очутившись на краю снежной выемки. Сделав шаг вперед, я прыгнул

Я почувствовал, что лечу, и вскоре очутился близ скалы, на которой стоял поджидавший меня Кевор; ухватившись за нее я повис в страшном изумлении

* См. книгу “Межпланетные путешествия”

** Отрывок приведен здесь с несущественными сокращениями

Кевор, нагнувшись, кричал мне визгливым голосом, чтобы я был осторожнее. Я и забыл, что на Луне напряжение тяжести в шесть раз слабее, нежели на Земле. Действительность сама напоминала мне об этом.

Осторожно, сдерживая свои движения, я поднялся на вершину скалы и, ступая словно больной ревматизмом, стал на солнце рядом с Кевором. Снаряд наш лежал на тающем сугробе снега, футах в тридцати от нас.

— Посмотрите, — обратился я, поворачиваясь к Кевору

Но Кевор исчез.

Одно мгновение я стоял, пораженный этой неожиданностью, затем, желая взглянуть за край скалы, поспешно шагнул вперед, совершенно забыв, что я на Луне. Усилие, которое я сделал, подвинуло бы меня на 1 метр, будь я на Земле; на Луне же оно подвинуло меня на 6 метров, и я очутился в 5 метрах за краем скалы.

Я испытывал то ощущение витания в пространстве, которое приходится переживать во сне, когда снится, будто падаешь в бездну. На Земле человек, падая, опускается в течение первой секунды на 5 метров, на Луне же он проходит при падении в первую секунду 80 сантиметров. Вот почему я плавно порхнул вниз на глубину метров девяти. Падение показалось мне продолжительным; оно длилось секунды три. Я поплыл в воздухе и опустился плавно, как пушинка, увязши по колено в снежном сугробе на дне скалистой долины.

— Кевор! — крикнул я, осматриваясь кругом. Но нигде не было и следов его.

— Кевор! — крикнул я громче

И вдруг я увидел его: он смеялся и делал мне знаки, стоя на голом утесе, метрах в двадцати от меня. Я не мог слышать слов, но понял смысл его жестов; он приглашал меня прыгнуть к нему.

Я колебался: расстояние казалось мне слишком огромным. Но скоро я сообразил, что раз Кевор проделал такой прыжок, то, наверное, удастся прыгнуть и мне.

Отступив на шаг, я прыгнул изо всех сил. Стрелой взвился я в воздух, и, казалось, никогда не опущусь вниз. Это был фантастический полет — чудовищный, как в сновидении, но в то же время восхитительно приятный.

Прыжок оказался слишком сильным: я перелетел над голсовой Кевора"

Стрельба на Луне

Следующий эпизод, взятый из повести выдающегося советского изобретателя К. Э. Циолковского "На Луне", поможет нам уяснить условия движения под действием силы тяжести. На Земле атмосфера, препятствуя движению в ней тел, заслоняет от нас простые законы падения, усложняя их добавочными условиями. На Луне воздух отсутствует совершенно. Луна была бы превосходной лабораторией для

изучения падения тел, если бы мы могли на ней оказаться и заниматься там научными исследованиями.

Обращаясь к эпизоду повести, поясним, что два собеседника приводимого далее отрывка находятся на Луне и желают исследовать, как будут двигаться там пули, вылетевшие из ружья:

— Но будет ли тут работать порох?

— Взрывчатые вещества в пустоте должны проявлять себя даже с большей силой, чем в воздухе, так как последний только препятствует их расширению; что же касается кислорода, то они в нем не нуждаются потому что все необходимое его количество заключается в них самих.

— Установим ружье вертикально, чтобы пулю после взрыва отыскать поблизости...

Огонь, слабый звук*, легкое сотрясение почвы

— Где же пыж? Он должен быть тут, поблизости

— Пыж улетел вместе с пулей и едва ли от нее отстанет, так как только атмосфера мешает ему на Земле поспевать за свинцом, здесь же пух падает и летит вверх с такой же стремительностью, как и камень. Возьми пушинку, торчащую из подушки, а я возьму чугунный шарик. Ты можешь кидать свою пушинку и попадать ею в цель, даже отдаленную, с таким же удобством, как я шариком. Я могу, при малой тяжести, кинуть шарик метров на 400; ты на такое же расстояние можешь бросить пушинку; правда, ты никого ею не убьешь и при бросании даже не почувствуешь, что ты что-то бросаешь. Бросим наши метательные снаряды изо всех сил, — которые у нас не очень различны, — и в одну цель: вон в тот красный гранит..

Пушинка опередила немного чугунный шарик, как бы увлекаемая сильным вихрем.

— Но что это? Со времени выстрела прошло три минуты, а пули нет*

— Подожди две минуты, и она, наверное, вернется.

Действительно, через указанный срок мы ощущаем легкое сотрясение почвы и видим прыгающий невдалеке пыж.

— Как долго летала пуля! На какую же высоту она должна подняться?

— Километров на семьдесят. Эту высоту создают малая тяжесть и отсутствие воздушного сопротивления"

Проверим. Если для скорости пули в момент вылета из ружейного ствола взять сравнительно скромную цифру 500 м/с, то пуля *на Земле, при отсутствии атмосферы*, поднялась бы на высоту

$$h = \frac{v^2}{2g} = \frac{500^2 (\text{м/с})^2}{2 \cdot 10 \text{ м/с}^2} = 12500 \text{ м, т е } 12,5 \text{ км}$$

* Звук, передаваемый через почву и тела людей, а не через воздух которого на Луне нет — Я П

На Луне же, где сила тяжести в шесть раз слабее, вместо g надо взять $10/6$ м/с²; достигаемая пулей высота должна равняться

$$12,5 \text{ км} \cdot 6 = 75 \text{ км}.$$

В бездонном колодце

О том, что делается в глубоких недрах нашей планеты, известно пока очень мало¹. Одни полагают, что под твердой корой в сотню километров толщины начинается огненно-жидкая масса; другие считают весь земной шар отвердевшим до самого центра. Решить вопрос трудно: ведь самая глубо-




Рис. 43. Если просверлить земной шар по диаметру

кая скважина простирается не глубже 7,5 км, самая глубокая шахта, в которую проник человек, расположена на глубине 3,3 км², а радиус земного шара равен 6400 км. Если бы можно было просверлить через нашу планету сквозной колодец, прорезающий земной шар по диаметру, — тогда подобные

вопросы были бы разрешены. Современная техника далека еще от возможности осуществления подобных проектов, — хотя все прорытые в земной коре буровые скважины, взятые вместе, составили бы длину, превышающую диаметр нашей планеты. О прорытии сквозного туннеля через земной шар мечтали в XVIII веке математик Мопертюи и философ Вольтер. К этому проекту, правда, в ином, более скромном масштабе, вернулся французский астроном Фламмарин; мы воспроизводим здесь с некоторыми изменениями рисунок из его статьи, посвященной этой теме (рис. 43).

Ничего подобного, конечно, пока еще не сделано; но воспользуемся воображаемым бездонным колодцем, чтобы заняться одной любопытной задачей. Как вы думаете, что было бы с вами, если бы вы упали в такой бездонный колодец (о сопротивлении воздуха на время забудем)?

Разбиться о дно вы не можете, дна здесь не существует, — но где же вы остановитесь?

В центре Земли? Нет.

Когда вы долетите до центра, тело ваше будет иметь такую колоссальную скорость (около 8 км/с), что об остановке в этой точке не может быть и речи. Вы промчитесь далее и будете нестись, постепенно замедляя движение, пока не поравняетесь с краями противоположного конца колодца. Здесь надо будет вам покрепче ухватиться за края, — иначе вы вновь проделаете прогулку через весь колодец до другого конца. Если и тут не удастся вам ухватиться за что-нибудь, вы опять полетите в колодец и будете качаться так без конца (рис. 44). Механика учит, что при таких условиях (если только пренебречь сопротивлением воздуха в колодце) тело должно качаться туда и обратно вечно*.

Какова была бы продолжительность одного такого качания? Оказывается, что весь путь туда и обратно занял бы 84 мин 24 с, т. е. круглым счетом полтора часа.




Рис. 44. Упав в колодец, прорытый через центр земного шара, тело будет качаться безостановочно от одного конца колодца до другого.

“Так было бы, — продолжает Фламарион, — если бы колодец вырыт был по оси от полюса до полюса. Но достаточно перенести точку отправления на какую-либо иную широту — на материк Европы, Азии или Африки, — и придется принять в расчет влияние вращения Земли. Известно, что каждая точка земной поверхности пробегает на экваторе 465 м в секунду, а на широте Парижа 300 м. Так как круговая скорость *возрастает* с удалением от оси вращения, то свинцовый шарик, например, брошенный в колодец, падает не по вертикали, а уклоняется

* При наличии же сопротивления воздуха качания будут постепенно затухать, и дело кончится тем, что тело остановится в центре Земли.

несколько к востоку. Если вырыть бездонный колодец на экваторе, то ширина его должна быть весьма значительна, либо же он должен быть сильно скошен, потому что тело, падающее с поверхности Земли пронеслось бы далеко к востоку от ее центра.

Если бы входное отверстие колодца находилось на одном из плоскогорий Южной Америки, на высоте, положим, двух километров, а противоположный конец туннеля приходился бы на уровне океана, то человек, который по неосторожности свалился бы в американское отверстие, достиг бы противоположного конца с такой скоростью, что вылетел бы из него на высоту двух километров.

А если бы оба конца колодца приходились на уровне океана, можно было бы подать летящему человеку руку в момент появления его у отверстия, когда скорость полета равняется нулю. В предыдущем же случае следовало бы, напротив, с опаской посторониться от чересчур стремительного путешественника."

Сказочная дорога

В свое время в С.-Петербурге появилась брошюра со странным заглавием. "Самокатная подземная железная дорога между С.-Петербургом и Москвой. Фантастический роман пока в трех главах, да и то неоконченных". Автор этой брошюры, А. А. Родных, предлагал остроумный проект, с которым интересно познакомиться любителю физических парадоксов.




Рис. 45. Если бы можно было прорыть туннель между Ленинградом и Москвой, то поезда мчались бы в нем туда и обратно сами собой

Проект состоит "в проведении 600-километрового туннеля, который должен соединить обе наши столицы по совершенно прямой подземной линии. Таким образом, впервые явилась бы возможность для человечества совершать путь по прямой, а не ходить кривыми путями, как это было до сих пор". (Автор хочет сказать, что все наши дороги, подчиняясь кривизне земной поверхности, следуют по дугам, между тем как проектируемый туннель пройдет по прямой линии — по хорде.)

Такой туннель, если бы его можно было прорыть, имел бы удивительное свойство, каким не обладает ни одна дорога в мире. Оно заключается в том, что любой экипаж в

подобном туннеле *должен двигаться сам собой*. Вспомним наш подземный колодец, пробуравливающий земной шар. Ленинградо-московский туннель — тот же колодец, только просверленный не по диаметру, а по хорде. Правда, при взгляде на рис. 45 может казаться, что туннель прорыт горизонтально и что поезду, следовательно, нет причины катиться по нему за счет силы тяжести. Но это лишь обман зрения: проведите мысленно радиусы к концам туннеля (направление радиуса есть направление отвеса); вы поймете тогда, что туннель прорыт не под прямым углом к отвесу, т. е. не горизонтально, а *наклонно*.

В таком косом колодце всякое тело должно качаться, увлекаемое силой тяжести, вперед и назад, все время прижимаясь к дну. Если в туннеле устроить рельсы, то железнодорожный вагон будет сам катиться по ним: сила тяжести заменит тягу паровоза. Вначале поезд будет двигаться очень медленно. С каждой секундой скорость самокатного поезда будет возрастать; вскоре она дойдет до невообразимой величины, так что воздух в туннеле будет уже заметно мешать его движению.

Но забудем на время об этом досадном препятствии, мешающем осуществлению многих заманчивых проектов, и проследим за поездом дальше. Домчавшись до середины туннеля, поезд будет обладать такой огромной скоростью, — во много раз большей скорости пушечного снаряда! — что с разбега докатится почти до противоположного конца туннеля. Если бы не трение, не было бы и этого “почти”: поезд без паровоза сам доехал бы из Ленинграда в Москву. Продолжительность перелета в один конец, как показывает расчет, — та же, что и для падения сквозь колодец, прорытый по диаметру: 42 мин 12 с. Станным образом она не зависит от длины туннеля; путешествия в туннеле Москва — Ленинград, Москва — Владивосток или Москва — Мельбурн продолжались бы одинаковое время*.

То же повторялось бы с любым другим экипажем: дрезиной, каретой, автомобилем и т. д. Поистине сказочная дорога, которая, сама оставаясь неподвижной, мчит по себе все экипажи от одного конца до другого, и притом с невообразимой скоростью**!

* Можно доказать еще и другое, не менее любопытное положение, относящееся к бездонному колодцу: продолжительность качания зависит не от *размера* планеты, а только от ее *плотности*³

** Интересующиеся математической стороной этой задачи могут найти подробный разбор ее в моей статье, напечатанной в журнале: Математика и физика в школе, 1936, № 3, с 106⁴

Как роют туннели?

Взгляните на рис. 46, изображающий три способа проведения туннелей, и скажите, какой из них прорыт горизонтально?

Не верхний и не нижний, в средний, идущий по дуге, которая во всех точках образует прямые углы с направлением отвесных линий (или земных радиусов). Это и есть горизонтальный туннель, — его изгиб вполне соответствует кривизне земной поверхности.




Рис. 46. Три способа прокладывать туннели сквозь горы.

Большие туннели прорывают обыкновенно так, как показано сверху: по прямым линиям, касательным к земной поверхности в крайних точках туннеля. Такой туннель сначала идет немного вверх, затем вниз. Он представляет то удобство, что вода не застаивается в нем, а сама стекает к краям.

Если бы туннель прокладывался строго горизонтально, то длинный туннель имел бы дугообразную форму. Вода не могла бы вытекать из него, так как в каждой его точке находилась бы в равновесии. Когда такой туннель длиннее 15 км, то, стоя у одного выхода, нельзя видеть другого: луч зрения упирается в потолок, так как средняя точка такого туннеля более чем на 4 м возвышается над его конечными точками.

Наконец, если проложить туннель по прямой линии, соединяющей крайние точки, он будет с обоих концов иметь легкий наклон *вниз* к середине. Вода не только не будет вытекать из него, но, напротив, скопится в средней, самой низкой его части. Зато, стоя у одного конца такого туннеля, можно будет видеть другой.

Рис. 46 поясняет сказанное*.

* Из изложенного следует, между прочим, что все горизонтальные линии — *кривые*; прямых горизонтальных линий быть не может. Вертикальные же, напротив, могут быть только прямые.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПУШЕЧНОМ СНАРЯДЕ

В заключение наших бесед о законах движения и силе притяжения разберем то фантастическое путешествие на Луну, которое так занимательно описано Жюлем Верном в романах “С Земли на Луну” и “Вокруг Луны”*. Вы, конечно, помните, что члены Пушечного клуба Балтиморы, обреченные на бездеятельность с окончанием Североамериканской войны, решили отлить исполинскую пушку, зарядить ее огромным полым снарядом и, посадив внутрь пассажиров, выстрелом отправить снаряд-вагон на Луну.

Фантастична ли эта мысль? И прежде всего: можно ли сообщить телу такую скорость, чтобы оно безвозвратно покинуло земную поверхность?

Ньютонова гора

Предоставим слово гениальному Ньютону, открывшему закон всемирного тяготения. В своих “Математических началах физики” он пишет (приводим отрывок ради облегчения понимания в вольном переводе):

“Брошенный камень под действием тяжести отклоняется от прямолинейного пути и падает на Землю, описывая кривую линию. Если бросить камень с большей скоростью, то он полетит дальше; поэтому может случиться, что он опишет дугу в десять, сто, тысячу миль и, наконец, выйдет за пределы Земли и не вернется на нее больше. Пусть *AFB* (рис. 47) представляет поверхность Земли, *C*—ее центр, а *UD*, *UE*, *UF*, *UG*—кривые линии, которые описывает тело, бросаемое в горизонтальном направлении с очень высокой горы со все большей и большей скоростью. Мы не принимаем во внимание противодействия атмосферы, т. е. предполагаем, что она совершенно отсутствует. При меньшей первоначальной скорости тело описывает кривую *UD*, при большей скорости—кривую *UE*, при еще больших скоростях—кривые *UF*, *UG*. При некоторой скорости тело обойдет вокруг всей Земли и возвратится к вершине горы, с которой его бросили. Так как при возвра-

* Перевод Марка Вовчка озаглавлен “Из пушки на Луну”.

шении к исходному пункту скорость тела будет не меньше, чем в самом начале, то тело будет продолжать двигаться и дальше по той же кривой”.

Если бы на этой воображаемой горе была пушка, то выброшенный ею снаряд при известной скорости никогда не упал бы обратно на Землю, а стал бы безостановочно




Рис. 47. Как должны падать камни, бросаемые на вершине горы с огромной скоростью в горизонтальном направлении.

вращаться вокруг земного шара. Путем довольно простого расчета* нетрудно определить, что это должно наступить при скорости около 8 км в секунду. Другими словами, снаряд, выбрасываемый пушкой со скоростью 8 км в секунду, навсегда покидает поверхность земного шара и становится спутником нашей планеты. Он будет мчаться в 17 раз быстрее, чем какая-либо точка на экваторе, и опишет полный оборот вокруг нашей планеты за 1 ч 24 мин.

Если же сообщить снаряду большую скорость, он будет вращаться около Земли уже не по кругу, а по более или менее вытянутому эллипсу, удаляясь от Земли на огромное расстояние. При еще большей начальной скорости снаряд навсегда удалится от нашей планеты в мировое пространство. Это должно наступить при начальной скорости около 11 км/с. (Во всех этих рассуждениях имеются в виду снаряды, движущиеся в *пустом* пространстве, а не в воздушной среде.)

Теперь посмотрим, можно ли осуществить полет на Луну тем способом, который предлагал Жюль Верн. Современные пушки сообщают снарядам скорость не более двух километров в первую секунду. Это в пять раз меньше той скорости, с какой тело может полететь на Луну. Герои романа думали, что если они соорудят исполинскую пушку и зарядят ее огромным количеством взрывчатых веществ, им удастся получить скорость, достаточную, чтобы отправить снаряд на Луну.

* См. гл. 2 моей первой книги “Занимательная физика”.

Фантастическая пушка

И вот члены Пушечного клуба отливают гигантскую пушку, длиной в четверть километра, отвесно врытую в Землю, Изготавливают соответственно снаряд массой 8 т, который внутри представляет собой кабину для пассажиров. Заряжают пушку хлопчатобумажным порохом — пироксилином — в количестве 160 т. В результате взрыва снаряд, если верить романисту, приобретает скорость 16 км/с, но вследствие трения о воздух скорость эта уменьшается до 11 км/с. Таким образом, оказавшись за пределами атмосферы, жюль-вернов снаряд обладает скоростью, достаточной, чтобы долететь до Луны.

Так описывается в романе. Что же может сказать об этом физика?

Проект Жюль Верна уязвим совсем не в том пункте, куда обычно направляется сомнение читателя. Прежде всего, можно доказать (я доказываю это в книге “Межпланетные путешествия”), что пороховые пушки никогда не смогут сообщить снарядам скорости, большей 3 км/с¹.

Кроме того, Жюль Верн не посчитался с сопротивлением воздуха, которое при такой огромной скорости должно быть весьма велико и совершенно изменит картину полета. Но и помимо этого имеются серьезные возражения против проекта полета на Луну в артиллерийском снаряде.

Главные опасения вызывает участь самих пассажиров. Не думайте, что опасность грозит им во время полета от Земли до Луны. Если бы им удалось остаться живыми к тому моменту, когда они покинут жерло пушки, то во время дальнейшего путешествия им нечего уже было бы опасаться. Огромная скорость, с которой пассажиры будут мчаться в мировом пространстве вместе с их вагоном, столь же безвредна для них, как безвредна для нас, обитателей Земли, та еще большая скорость, с какой земной шар мчится вокруг Солнца.

Тяжелая шляпа

Самый опасный момент для наших путешественников представили бы те несколько сотых долей секунды, в течение которых кабина-снаряд движется в канале пушки. Ведь в течение этого ничтожно малого промежутка времени скорость, с которой пассажиры будут двигаться в пушке, должна возрасти от 0 до 16 км/с! Недаром в романе пас-

сажиры с таким трепетом ожидали выстрела. И Барбикен был вполне прав, утверждая, что момент, когда снаряд полетит, будет для пассажиров столь же опасен, как если бы они находились не внутри, а впереди снаряда. Действительно: в момент выстрела нижняя площадка каюты ударят пассажиров снизу с такой же силой, с какой налетел бы снаряд на всякое тело, находящееся на его пути. Герои романа отнеслись к этой опасности чересчур легко, воображая, что отделаются в худшем случае только приливом крови к голове...

Дело обстоит серьезнее. В канале ствола снаряд движется ускоренно: скорость его растет под постоянным напором газов, образующихся при взрыве. В течение ничтожной доли секунды скорость эта возрастает от 0 до 16 км/с. Допустим для простоты, что возрастание скорости совершается равномерно; тогда ускорение, необходимое для того, чтобы в столь ничтожное время довести скорость снаряда до 16 км/с², достигнет здесь круглым счетом 600 км/с² (вычисления приведены далее на с. 316).

Роковое значение этой цифры мы вполне поймем, если вспомним, что обычное ускорение свободного падения на земной поверхности равняется около 10 м/с. Отсюда следует, что каждый предмет внутри снаряда в момент выстрела оказывал бы на дно каюты давление, которое в 60 000 раз больше веса этого предмета. Другими словами: пассажиры чувствовали бы, что сделались словно в несколько десятков тысяч раз тяжелее! Под действием такой колоссальной тяжести они были бы мгновенно раздавлены. Один цилиндр мистера Барбикена весил бы в момент выстрела не менее 15 тс; такой шляпы более чем достаточно, чтобы раздавить ее владельца*.

Правда, в романе описаны меры, принятые для ослабления удара: ядро снабжено пружинными буферами и двойным дном с водой, заполняющей пространство в нем. Продолжительность удара от этого немного растягивается, и следовательно, быстрота нарастания скорости ослабевает. Но при огромных силах, с которыми приходится здесь иметь дело, выгода от этих приспособлений получается мизерная. Сила, которая будет придавливать пассажиров к полу,

* Прибавлю еще, что ускорение гоночного автомобиля, начинающего свое быстрое движение, не превышает 2—3 м/с², а ускорение поезда, плавно отходящего от станции, 1 м/с².

уменьшается на ничтожную долю, — а не все ли равно, быть раздавленным шляпой в 15 или 14 тс?!

Как ослабить сотрясение?

Механика дает указание на то, как можно было бы ослабить роковую быстроту нарастания скорости.

Этого можно достигнуть, если во много раз *удлинить ствол пушки*.

Удлинение потребуется, однако, весьма значительное, если мы хотим, чтобы в момент выстрела сила “искусственной” тяжести внутри снаряда равнялась силе обыкновенной тяжести на земном шаре. Приблизительный расчет показывает, что для этого нужно было бы изготовить пушку длиной ни мало ни много в 6000 км! Другими словами, жюль-вернова “колумбиада” должна бы простирались в глубь земного шара до самого его центра... Тогда пассажиры могли бы быть избавлены от всяких неприятностей к их обычному весу прибавился бы еще только такой же кажущийся вес вследствие медленного нарастания скорости, и они чувствовали бы, что стали всего вдвое тяжелее.

Впрочем, в течение короткого промежутка человеческий организм способен без вреда переносить увеличение веса в несколько раз. Когда мы скатываемся с ледяной горы вниз и здесь быстро меняем направление своего движения, вес наш в этот краткий миг заметно увеличивается, т. е. тело наше прижимается к санкам сильнее обычного. Увеличение веса раза в три переносится нами довольно благополучно. Если допустить, что человек может безвредно переносить в течение короткого времени даже десятикратное увеличение веса, то достаточно будет отлить пушку “всего” в 600 км длиной. Однако это малоутешительно, потому что и подобное сооружение лежит за пределами технически возможного².

Вот при каких лишь условиях мыслимо осуществление заманчивого проекта Жюль Верна: полететь на Луну в пушечном снаряде*.

* Описывая в романе условия жизни внутри летящего пушечного снаряда, Жюль Верн сделал существенное упущение, о котором подробно говорится в первой книге “Занимательная физика”. Романист не принял в расчет, что *после выстрела во все время перелета предметы внутри снаряда будут совершенно невесомы*, так как сила тяжести сообщает одинаковые ускорения и снаряду и всем телам в нем (см. также далее статью “Недостающая глава в романе Жюль Верна”).

Для друзей математики

Среди читателей этой книги, без сомнения, найдутся и такие, которые пожелают сами проверить расчеты, упомянутые выше. Приводим здесь эти вычисления. Они верны лишь приблизительно, так как основаны на допущении, что в канале пушки снаряд движется равномерно-ускоренно (в действительности же возрастание скорости происходит неравномерно).

Для расчетов придется пользоваться следующими двумя формулами равномерно-ускоренного движения:

скорость v по истечении времени t равна

$$v = at,$$

где a — ускорение;

путь S , пройденный за время t , определяется формулой

$$S = \frac{at^2}{2}.$$

По этим формулам определим прежде всего ускорение снаряда, когда он скользил в канале “колумбиады”.

Из романа известна длина части пушки, не занятой зарядом, — 210 м; это и есть пройденный снарядом путь S . Мы знаем и конечную скорость: $v = 16$ км/с. Данные S и v позволяют определить время t — продолжительность движения снаряда в канале орудия (рассматривая это движение как равномерно-ускоренное). В самом деле:

$$\begin{aligned} v &= at = 16000 \text{ м/с}, \\ 210 \text{ м} = S &= \frac{at \cdot t}{2} = \frac{16000 \text{ м/с} \cdot t}{2} = 8000 \text{ м/с} \cdot t, \end{aligned}$$

откуда

$$t = \frac{210 \text{ м}}{8000 \text{ м/с}} \approx \frac{1}{40} \text{ с}.$$

Снаряд, оказывается, скользил бы внутри пушки всего 1/40 секунды! Подставив $t = 1/40$ в формулу $v = at$, имеем

$$16\,000 \text{ м/с} = \frac{1}{40} \text{ с} \cdot a,$$

откуда $a = 640\,000 \text{ м/с}^2$.

Значит, ускорение снаряда при движении в канале равно $640\,000 \text{ м/с}^2$, т. е. в 64 000 раз больше ускорения свободного падения!

Какой же длины должна быть пушка, чтобы ускорение снаряда было всего в 10 раз больше ускорения падающего тела (т. е. равнялось бы 100 м/с^2)?

Это — задача, обратная той, которую мы сейчас решили. Данные: $a = 100 \text{ м/с}^2$, $v = 11\,000 \text{ м/с}$ (при отсутствии сопротивления атмосферы такая скорость достаточна). Из формулы $v = at$ имеем

$$11\,000 \text{ м/с} = 100 \text{ м/с}^2 \cdot t, \text{ откуда } t = 110 \text{ с.}$$

Длина пушки должна равняться

$$S = \frac{at \cdot t}{2} = \frac{11\,000 \text{ м/с} \cdot 110 \text{ с}}{2} = 605\,000 \text{ м},$$

т. е. круглым счетом 600 км.

Таковыми вычислениями получены те цифры, которые разрушают заманчивые планы героев Жюль Верна.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

Море, в котором нельзя утонуть

Такое море известно человечеству с древнейших времен. Это знаменитое Мертвое море. Воды этого моря необыкновенно солены, настолько, что в них не может жить ни одно живое существо. Знойный, без дождей климат Западной Азии вызывает сильное испарение воды с поверхности моря. Но испаряется только чистая вода, растворенные же соли остаются в море и увеличивают соленость воды. Вот почему вода Мертвого моря содержит не 2—3% соли (по массе), как большинство морей и океанов, а 27% и более; с глубиной соленость растет. Итак, четвертую часть содержимого Мертвого моря составляют соли, растворенные в его воде. Общее количество солей в нем оценивается в 40 млн. тонн.

Высокая соленость Мертвого моря обуславливает одну его особенность: вода этого моря значительно тяжелее обыкновенной морской воды. Утонуть в такой тяжелой жидкости нельзя: человеческое тело легче ее.

Вес нашего тела заметно меньше веса равного объема густо-соленой воды и, следовательно, по закону плавания, человек не может в Мертвом море утонуть; он всплывает в нем, как всплывает в соленой воде куриное яйцо (которое в пресной тонет).

Юморист Марк Твен, посетивший это озеро-море, с комичной обстоятельностью описывает необычайные ощущения, которые он и его спутники испытали, купаясь в тяжелых водах Мертвого моря:

“Это было забавное купанье! Мы не могли утонуть. Здесь можно вытянуться на воде во всю длину, лежа на спине и сложив руки на груди, причем большая часть тела будет оставаться над водой. При этом можно совсем поднять голову... Вы можете лежать очень удобно на спине, подняв колени к подбородку и охватив их руками, — но вскоре перевернетесь, так как голова перевешивает. Вы можете встать на голову — и от середины груди до конца ног будете оставаться вне

воды, но вы не сможете долго сохранять такое положение. Вы не можете плыть на спине, подвигаясь сколько-нибудь заметно, так как ноги ваши торчат из воды в вам приходится отталкиваться только пятками. Если же вы плывете лицом вниз, то подвигаетесь не вперед, а назад. Лошадь так неустойчива, что не может ни плавать, ни стоять в Мертвом море, — она тотчас же ложится на бок”

На рис. 48 вы видите человека, довольно удобно расположившегося на поверхности Мертвого моря; большая плотность воды позволяет ему в этой позе читать книгу, защищаясь зонтиком от жгучих лучей солнца.



Рис. 48. Человек на поверхности Мертвого моря.

Такими же необычайными свойствами обладает вода Кара-Богаз-Гола (залива Каспийского моря)* и не менее соленая вода озера Эльтон, содержащая 27% солей.

Нечто в этом роде приходится испытывать тем больным, которые принимают соленые ванны. Если соленость воды очень велика, как, например, в Старорусских минеральных водах, то больному приходится прилагать немало усилий, чтобы удержаться на дне ванны. Я слышал, как женщина, лечившаяся в Старой Руссе, с возмущением жаловалась, что вода “положительно выталкивала ее из ванны”. Кажется, она склонна была винить в этом не закон Архимеда, а администрацию курорта...

Степень солености воды в различных морях несколько колеблется, — и соответственно этому суда сидят не одина-

* Плотность воды Кара-Богаз-Гола 1,18 г/см.³ “В такой плотной воде можно плавать без применения усилий и, не обходя закона Архимеда, утонуть невозможно”, — замечает по этому поводу исследователь (Пельш А. Д. Карабугаз, 1934) ¹

ково глубоко в морской воде. Быть может, некоторым из читателей случалось видеть на борту судна близ ватерлинии так называемую “Ллойдовскую марку”— знак, показывающий уровни предельных ватерлиний в воде различной плотности. Например, изображенная на рис. 49 грузовая марка означает уровни предельных ватерлиний:

в пресной воде (Fresh Water)	FW
в Индийском океане летом (India Summer)	IS
в соленой воде летом (Summer)	S
в соленой воде зимой (Winter)	W
в Северном Атлантическом океане зимой (Winter North Atlantic)	WNA

У нас эти марки введены как обязательные с 1909 г.²

Заметим в заключение, что существует разновидность воды, которая и в чистом виде, без всяких примесей, заметно тяжелее обыкновенной; ее плотность 1, 1 г/см³, т. е. на




Рис 49 Грузовая марка на борту корабля

10% больше, чем обыкновенной; следовательно, в бассейне с такой водой человек, даже не умеющий плавать, едва ли мог бы утонуть. Такую воду назвали “тяжелой” водой; ее химическая формула D₂O (входящий в ее состав изотоп водорода состоит из атомов, вдвое тяжелее атомов обыкновенного водорода, и обозначается буквой D). “Тяжелая” вода в незначительном количестве растворена в обыкновенной: в ведре питьевой воды ее содержится около 8 г.

Тяжелая вода состава D₂O (разновидностей тяжелой воды различного состава возможно семнадцать³ в настоящее время добывается уже почти в чистом виде; примесь обыкновенной воды составляет менее 0, 05%.

Как работает ледокол?

Принимая ванну, не упустите случая проделать следующий опыт. Прежде чем покинуть ванну, откройте ее выпускное отверстие, продолжая лежать на ее дне. По мере того как станет выступать над водой все бóльшая и бóльшая часть вашего тела, вы будете ощущать постепенное его отяжеление. Самым наглядным образом убедитесь вы при этом, что вес, утрачиваемый телом в воде (вспомните, как ловко чувствовали вы себя в ванне!), появляется вновь, лишь только тело оказывается вне воды.

Когда такой опыт невольно проделывает кит, очутившись во время отлива на мели, последствия оказываются для животного роковыми; его раздавит собственным чудовищным весом. Недаром киты живут в водной стихии: выталкивающая сила жидкости спасает их от губительного действия силы тяжести.

Сказанное имеет прямое отношение к заголовку настоящей статьи. Работа ледокола основана на том же физическом явлении: вынесенная из воды часть корабля перестает уравниваться выталкивающей силой воды и приобретает свой “сухопутный” вес. Не следует думать, что ледокол разрезает лед на ходу непрерывным давлением своей носовой части — напором форштевня. Так работают *не ледоколы, а ледорезы*. Этот способ действия пригоден только для льда сравнительно незначительной толщины.

Подлинные морские ледоколы — такие, как “Красин” или “Ермак”, — работают иначе. Действием своих мощных машин ледокол надвигает на поверхность льда свою носовую часть, которая с этой целью устраивается сильно скошенной под водой. Оказавшись вне воды, нос корабля приобретает полный свой вес, и этот огромный груз (у “Ермака” этот вес доходил, например, до 800 тс) обламывает лед. Для усиления действия в носовые цистерны ледокола нередко накачивают еще воду — “жидкий балласт”.

Так действует ледокол до тех пор, пока толща льда не превышает полуметра. Более мощный лед побеждается *ударным* действием судна. Ледокол отступает назад и налетает всей своей массой на кромку льда. При этом действует уже не вес, а кинетическая энергия движущегося корабля; судно превращается словно в артиллерийский снаряд с небольшой скоростью, зато с огромной массой, в таран.

Ледяные торосы и несколько метров высотой разбиваются энергией многократных ударов прочной носовой части ледокола.

Участник знаменитого перехода “Сибирякова” в 1932 г., моряк-полярник Н. Марков, так описывает работу этого ледокола:

“Среди сотен ледяных скал, среди сплошного покрова льда “Сибиряков” начал битву. Пятьдесят два часа подряд стрелка машинного телеграфа прыгала от “полного назад” к “полному вперед”. Тринадцать четырехчасовых морских вахт “Сибиряков” с разгона врзался в лед, крошил его носом, влезал на лед, ломал его и снова отходил назад. Лед, толщиной в три четверти метра, с трудом уступал дорогу. С каждым ударом пробивались на треть корпуса”

Самыми крупными и мощными в мире ледоколами располагает СССР ⁴.

Где находятся затонувшие суда?

Распространено мнение, — даже среди моряков, — будто суда, затонувшие в океане, не достигают морского дна, а висят недвижно на некоторой глубине, где вода “соответственно уплотнена давлением вышележащих слоев”.

Мнение это разделял, по-видимому, даже автор “Двадцати тысяч лье под водой”; в одной из глав этого романа Жюль Верн описывает неподвижно висящее в воде затонувшее судно, а в другой упоминает о кораблях, “догнивающих, свободно вися в воде”.

Правильно ли подобное утверждение?

Некоторое основание для него, как будто, имеется, так как давление воды в глубинах океана действительно достигает огромных степеней. На глубине 10 м вода давит с силой 1 кгс на 1 см² погруженного тела. На глубине 20 м это давление равно уже 2 кгс, на глубине 100 м — 10 кгс, 1000 м — 100 кгс. Океан же во многих местах имеет глубину в несколько километров, достигая в самых глубоких частях Тихого океана более 11 км (Марианская впадина). Легко вычислить, какое огромное давление должны испытывать вода и погруженные в нее предметы на этих огромных глубинах.

Если порожнюю закупоренную бутылку опустить на значительную глубину и затем извлечь вновь, то обнаружится, что давление воды вогнало пробку внутрь бутылки и вся посуда полна воды. Знаменитый океанограф Джон Меррей в своей книге “Океан” рассказывает, что был про-

делан такой опыт: три стеклянные трубки различных размеров, с обоих концов запаянные, были завернуты в холст и помещены в медный цилиндр с отверстиями для свободного пропуска воды. Цилиндр был спущен на глубину 5 км. Когда его извлекли оттуда, оказалось, что холст наполнен снегообразной массой: это было раздробленное стекло. Куски дерева, опущенные на подобную глубину, после извлечения тонули в воде, как кирпич, — настолько они были сдавлены.

Естественно, казалось бы, ожидать, что столь чудовищное давление должно настолько уплотнить воду на больших глубинах, что даже тяжелые предметы не будут в ней тонуть, как не тонет железная гиря в ртути.

Однако подобное мнение совершенно не обосновано. Опыт показывает, что вода, как и все вообще жидкости, мало поддается сжатию. Сдавливаемая силой 1 кгс на 1 см² вода сжимается всего только на 1/22 000 долю своего объема и примерно так же сжимается при дальнейшем возрастании давления на каждую килограмм-силу. Если бы мы пожелали довести воду до такой плотности, чтобы в ней плавало железо, необходимо было бы уплотнить ее в 8 раз. Между тем для уплотнения только вдвое, т. е. для сокращения объема наполовину, необходимо давление 11 000 кгс на 1 см² (если бы только упомянутая мера сжатия имела место для таких огромных давлений). Это соответствует глубине 110 км под уровнем океана!

Отсюда ясно, что говорить о сколько-нибудь заметном уплотнении воды в глубине океанов совершенно не приходится. В самом глубоком их месте вода уплотнена лишь на 1 100/22 000, т. е. на 1/20 нормальной своей плотности, — всего на 5 %*. Это почти не может повлиять на условия плавания в ней различных тел, — тем более, что твердые предметы, погруженные в такую воду, также подвергаются этому давлению и, следовательно, тоже уплотняются.

Не может быть поэтому ни малейшего сомнения в том, что затонувшие суда покоятся на дне океана. “Все, что тонет в стакане воды, — говорит Меррей, — должно пойти ко дну и в самом глубоком океане”.

* Английский физик Тэт вычислил, что если бы земное притяжение внезапно прекратилось и вода сделалась невесомой, то уровень воды в океане поднялся бы в среднем на 35 м (вследствие того, что сжатая вода приобрела бы нормальный объем). “Океан затопил бы 5 000 000 км² суши, обязанной своим надводным существованием лишь сжимаемости окружающих ее вод океанов”.

Мне приходилось слышать против этого такое возражение. Если осторожно погрузить стакан *вверх дном* в воду, он может остаться в этом положении, так как будет вытеснять объем воды, весящий столько же, сколько стакан. Более тяжелый металлический стакан может удержаться в подобном положении и ниже уровня воды, не опускаясь на дно. Точно так же, будто бы, может остановиться на полпути и опрокинутый вверх килем крейсер или другое судно. Если в некоторых помещениях судна воздух окажется плотно запертым, то судно погрузится на определенную глубину и там остановится.

Не мало ведь судов идет ко дну в перевернутом состоянии — и возможно, что некоторые из них так и не достигают дна, оставаясь висеть в темных глубинах океана. Достаточно было бы легкого толчка, чтобы вывести такое судно из равновесия, перевернуть, наполнить водой и заставить упасть на дно, — но откуда взяться толчкам в глубине океана, где вечно царит тишина и спокойствие и куда не проникают даже отголоски бурь?

Все эти доводы основаны на физической ошибке. Перевернутый стакан *не погружается в воду сам* — его надо *внешней силой* погрузить в воду, как кусок дерева или пустую закупоренную бутылку. Точно так же и опрокинутый килем вверх корабль вовсе не начнет тонуть, а останется на поверхности воды. Оказаться на полпути между уровнем океана и его дном он никак не может.

Как осуществились мечты Жюль Верна и Уэллса

Реальные подводные лодки нашего времени в некоторых отношениях не только догнали фантастический “Наутилус” Жюль Верна, но даже превзошли его. Правда, скорость хода нынешних подводных крейсеров вдвое меньше чем у “Наутилуса”: 24 узла против 50 узлов у Жюль Верна (узел — около 1, 8 км/ч) ⁵. Самый длинный переход современного подводного корабля — кругосветное путешествие, между тем как капитан Немо совершил поход вдвое длиннее. Зато “Наутилус” обладал водоизмещением только 1500 тс, имел на борту команду всего из двух-трех десятков человек и способен был оставаться под водой без перерыва не более сорока восьми часов. Подводный крейсер “Сюркуф”, построенный в 1929 г. и принадлежавший французскому флоту, имел водоизмещение 3200 тс, управлялся командой из ста пятидесяти человек и способен был держаться под водой, не всплывая, до ста двадцати часов.

Переход от портов Франции до острова Мадагаскар этот подводный крейсер мог совершать, не заходя по пути ни в один порт. По комфортабельности жилых помещений “Сюркуф”, быть может, не уступал “Наутилусу”. Далее, “Сюркуф” имел перед кораблем капитана Немо и то несомненное преимущество, что на верхней палубе крейсера устроен был водонепроницаемый ангар для разведывательного гидросамолета. Отметим также, что Жюль Верн не снабдил “Наутилус” перископом, дающим лодке возможность обозревать горизонт из-под воды.

В одном лишь отношении реальные подводные корабли долго еще будут далеко отставать от фантазии французского романиста: в глубине погружения⁶. Однако приходится отметить, что в этом пункте фантазия Жюль Верна перешла границы правдоподобия. “Капитан Немо,— читаем в одном месте романа,— достигал глубины в три, четыре, пять, семь, девять и десять тысяч метров под поверхностью океана”. А однажды “Наутилус” опустил даже на небывалую глубину— в 16 тысяч метров! “Я чувствовал,— рассказывает герой романа,— как содрогаются скрепы железной обшивки подводного судна, как изгибаются его распоры, как подаются внутрь окна, уступая давлению воды. Если бы корабль ваш не обладал прочностью сплошного литого тела, его мгновенно сплющило бы в лепешку”.

Опасение вполне уместное, потому что на глубине 16 км (если бы такая глубина имела в океане) давление воды должно было бы достигать

$$16\,000 : 10 = 1600 \text{ кгс/см}^2,$$

или 1600 атм; такое давление не раздробляет железа, но безусловно смяло бы конструкцию. Однако подобной глубины океанография не знает. Преувеличенные представления о глубинах океана, господствовавшие в эпоху Жюль Верна (роман написан в 1869 г.), объясняются несовершенством способов измерения глубины. В те времена для лота употреблялась не проволока, а пеньковая веревка; такой лот задерживался трением о воду тем сильнее, чем глубже он погружался; на значительной глубине трение возрастало до того, что лот вовсе переставал опускаться, сколько ни травил лить: пеньковая веревка лишь спутывалась, создавая впечатление огромной глубины.

Подводные корабли нашего времени способны выдерживать давление не более 25 атм; это определяет

наибольшую глубину их погружения: 250 м. Гораздо большей глубины удалось достигнуть в особом аппарате, названном “батисферой” (рис. 50) и предназначенном специально для изучения фауны океанских пучин*. Этот аппарат напоминает, однако, не “Наутилус” Жюль Верна, а фантастическое создание другого романиста— глубоководный шар Уэллса, описанный в рассказе “В морской глубине”.




Рис. 50. Стальной шарообразный аппарат “батисфера” для спуска в глубокие слои океана.

Герой этого рассказа спустился до дна океана на глубину 9 км в толстостенном стальном шаре; аппарат погружался без троса, но со съёмным грузом; достигнув дна океана, шар освободился здесь от увлекавшего его груза и стремительно взлетел на поверхность воды.

В батисфере ученые достигали глубины более 900 м. Батисфера спускается на тросе с судна, с которым сидящие в шаре поддерживают связь⁷.

* В этом аппарате Вильям Бийб достиг в 1934 г. глубины 923 м. Толщина стенок шара около 4 см, диаметр 1,5 м, масса 2,5 т.

Как был поднят “Садко”?

В широком просторе океана гибнут ежегодно тысячи крупных и мелких судов, особенно в военное время. Наиболее ценные и доступные из затонувших кораблей стали извлекать со дна моря. Советские инженеры и водолазы, входящие в состав ЭПРОН (Экспедиции подводных работ особого назначения), прославились на весь мир успешным подъемом более чем 150 крупных судов. Среди них одно из самых больших — ледокол “Садко”, затонувший на Белом море в 1916 г. из-за халатности капитана. Прележав на морском дне 17 лет, этот превосходный ледокол был поднят работниками ЭПРОН и вступил опять в строй.

Техника подъема была всецело основана на применении закона Архимеда. Под корпусом затонувшего судна в грунте морского дна водолазы прорыли 12 туннелей и протянули сквозь каждый из них прочные стальные стропы. Концы строп были прикреплены к понтонам, намеренно потопленным подле ледокола. Вся эта работа была выполнена на глубине 25 м под уровнем моря.

Понтонами (рис. 51) служили полые непроницаемые железные цилиндры 11 м длиной и 5,5 м в диаметре. Порожний понтон весил 50 тс. По правилам геометрии легко вычислить его объем; около 250 м³. Ясно, что такой цилиндр порожняком должен плавать на воде: он вытесняет 250 тс воды, сам же весит только 50 тс; грузоподъемность его равна разности между 250 и 50, т. е. 200 тс. Чтобы заставить понтон опуститься на дно, его заполняют водой.

Когда (см. рис. 51) концы стальных строп были прочно прикреплены к потопленным понтонам, в цилиндры стали с помощью шлангов нагнетать сжатый воздух. На глубине 25 м вода давит с силой $(25/10+1)$ кгс/см² ≈ 3,5 атм. Воздух же подавался в цилиндры под давлением около 4 атм. и, следовательно, должен был вытеснять воду из понтонов. Облегченные цилиндры с огромной силой выталкивались окружающей водой на поверхность моря. Они всплывали в воде, как аэростат в воздухе. Совместная, подъемная их




Рис. 51. Схема подъема “Садко”.

сила при полном вытеснении из них воды равнялась бы $200 \text{ тс} \times 12 = 2400 \text{ тс}$. Это превышало вес затонувшего “Садко”, так что ради более плавного подъема понтоны были освобождены от воды только частично.

Тем не менее подъем осуществлен был лишь после нескольких неудачных попыток. Вот что писал руководивший работами главный корабельный инженер ЭПРОН Т. И. Бобрицкий

“Четыре аварии терпела на нем спасательная партия, пока добилась успеха. Три раза, напряженно ожидая судна, мы видели вместо поднимающегося ледокола стихийно вырывающиеся наверх, в хаос волн и пены, понтоны и разорванные, змеями извивающиеся шланги. Два раза показывался и снова исчезал в пучине моря ледокол, прежде чем всплыл и окончательно удержался на поверхности”⁸.

Водяной “вечный” двигатель

Среди множества проектов “вечного двигателя” было немало и таких, которые основаны на всплывании тел в воде (рис. 52 и 53). Высокая башня высотой 20 м наполнена водой. Вверху и внизу башни установлены шкивы, через которые перекинут прочный канат в виде бесконечного ремня. К канату прикреплено 14 полых кубических ящиков со стороной 1 м, склепанных из железных листов так, что внутрь ящиков вода проникнуть не может. Как же действует эта установка? Каждый, знакомый с законом Архимеда, сообразит, что ящики, находясь в воде, будут стремиться всплыть вверх. Их увлекает вверх сила, равная весу воды, вытесняемой ящиками, т. е. весу 1 м^3 воды, повторенному столько раз, сколько ящиков погружено в воду. Из рис. 53 видно, что в воде оказывается всегда 6 ящиков. Значит, сила, увлекающая погруженные ящики вверх, равна весу 6 м^3 воды, т. е. 6 тс. Вниз же их тянет собственный вес ящиков, который, однако, уравнивается весом 6 ящиков, свободно свисающих на наружной стороне каната.

Итак, канат, перекинутый указанным образом, будет всегда подвержен силе тяги в 6 тс, приложенной к одной его стороне и направленной вверх. Ясно, что сила эта заставит канат безостановочно вращаться, сколько угодно раз, и при каждом обороте заставит совершать работу в $6000 \text{ кгс} \times 20 \text{ м} = 120\,000 \text{ кгс} \times \text{м}$.

* В книге: Завоевание глубин.— Л.: Молодая гвардия, 1936.

Теперь понятно, что если усеять страну такими башнями, то мы сможем получать от них безграничное количество работы, достаточное для покрытия всех нужд народного хозяйства. Башни будут вращать якоря динамомашии и давать электрическую энергию в любом количестве!

Однако если разобраться внимательно в этом проекте, то легко убедиться, что ожидаемого движения каната




Рис. 52. Проект водяного
"вечного" двигателя.




Рис. 53 Продольный разрез
башни (см. рис. 52)

происходить вовсе не должно.

Чтобы бесконечный канат вращался, ящики должны входить в водяной бассейн башни снизу и покидать его сверху. Но ведь, вступая в бассейн, ящик должен *преодолеть давление столба воды* в 20 м высотой! Это давление на квадратный метр площади ящика равно ни много ни мало 20 тс (весу 20 м³ воды). Сила же тяги вверх составляет всего 6 тс, т. е. явно недостаточна, чтобы втащить ящик в бассейн.

Среди многочисленных образчиков водяных "вечных" двигателей, сотни которых придуманы были изобретателями-неудачниками, можно найти очень простые и остроумные варианты.

Взгляните на рис. 54. Часть деревянного барабана, укрепленного на оси, все время погружена в воду. Если справедлив закон Архимеда, то погруженная в воду часть должна

всплывать и, коль скоро выталкивающая сила больше силы трения на оси барабана, вращение никогда не прекратится...

Не спешите с постройкой этого “вечного” двигателя! Вас непременно постигнет неудача: барабан не сдвинется с места. В чем же дело, в чем ошибка наших рассуждений?




Рис. 54. Еще один проект водяного “вечного” двигателя.

Оказывается, мы не учли направления действующих сил. А направлены они будут всегда по перпендикуляру к поверхности барабана, т. е. по радиусу к оси. Из повседневного опыта каждый знает, что невозможно заставить колесо вращаться, прикладывая усилия вдоль радиуса колеса. Чтобы вызвать вращение, надо приложить усилие перпендикулярно к радиусу, т. е. по касательной к окружности колеса. Теперь уже нетрудно понять, почему и в этом случае закончится неудачей попытка осуществить веч-

ное движение.

Закон Архимеда давал соблазнительную пищу уму искателей вечного двигателя и побуждал придумывать хитроумные приспособления для использования кажущейся потери веса в целях получения вечного источника механической энергии.

Кто придумал слова “газ” и “атмосфера”?

Слово “газ” принадлежит к числу слов, *придуманных* учеными наряду с такими словами, как “термометр”, “электричество”, “гальванометр”, “телефон” и прежде всего “атмосфера”. Старинный голландский химик и врач Гельмонт (1577—1644), современник Галилея, произвел “газ” от греческого слова “хаос”. Открыв, что воздух состоит из двух частей, из которых одна поддерживает горение и сгорает, другая же не обладает этими свойствами, Гельмонт писал: “Такой пар я назвал *газ*, потому что он почти не отличается от *хаоса* древних” (первоначальный смысл слова “хаос” — сияющее пространство).

Однако новое словечко долго после этого не употреблялось и было возрождено лишь знаменитым Лавуазье в 1789 г. Оно получило широкое распространение, когда

всюду заговорили о полетах братьев Монгольфье на первых воздушных шарах.

Ломоносов в своих сочинениях употреблял другое наименование для газообразных тел — “упругие жидкости”. Заметим, кстати, что Ломоносову принадлежит заслуга введения в русскую речь ряда названий, ставших теперь стандартными словами научного языка: атмосфера, барометр, воздушный насос, вязкость, кристаллизация, материя, манометр, оптика, оптический, электрический, эфир и др.

Гениальный родоначальник русского естествознания писал по этому поводу: “Принужден я был искать слов для наименования некоторых физических инструментов, действий и натуральных вещей, которые (т. е. слова) хотя сперва покажутся несколько странны, однако надеюсь, что они со временем через употребление знакомее будут”.

Как мы внаем, надежды Ломоносова вполне оправдались.

Напротив, предложенные впоследствии В. И. Далем (известным составителем “Толкового словаря”) неуклюжие слова для замены “атмосферы” — “мироколица” или “колоземица” — совершенно не привились, как не привился его “небозём” вместо горизонта и другие новые слова.

Как будто простая задача

Самовар, вмещающий 30 стаканов, полон воды. Вы подставляете стакан под его кран и с часами в руках следите по секундной стрелке, за какое время стакан наполняется до краев. Допустим, что за полминуты. Теперь зададим вопрос: за какое время опорожнятся весь самовар, если оставить кран открытым?

Казалось бы, здесь детски-простая арифметическая задача: один стакан вытекает за полминуты, — значит, 30 стаканов выльются за 15 мин.

Но сделайте опыт. Окажется, что самовар опорожняется не в четверть часа, как вы ожидали, а в полчаса.

В чем же дело? Ведь расчет так прост!

Прост, но неверен. Нельзя думать, что *скорость* истечения с начала до конца остается одна и та же. Когда первый стакан вытек из самовара, струя течет уже под меньшим давлением, так как уровень воды в самоваре понизился; понятно, что второй стакан наполнится за больший срок, чем за полминуты, третий вытечет еще ленивее, и т. д.

Скорость истечения всякой жидкости из отверстия в открытом сосуде находятся в прямой зависимости от высоты

столба жидкости, стоящего над отверстием. Гениальный Торричелли, ученик Галилея, первый указал на эту зависимость и выразил ее простой формулой:

$$v = \sqrt{2gh},$$




Рис. 55. Что скорее выльется: ртуть или спирт? Уровни жидкостей в сосудах одинаковы.

где v — скорость истечения, g — ускорение свободного падения, h — высота уровня жидкости над отверстием. Из этой формулы следует, что скорость вытекающей струи совершенно не зависит от *плотности* жидкости: легкий спирт и тяжелая ртуть при одинаковых уровнях вытекают из отверстия одинаково быстро (рис. 55). Из формулы видно, что на Луне, где сила тяжести в 6 раз меньше, чем на Земле, потребовалось бы для наполнения стакана примерно в 2,5 раза больше времени, нежели на Земле.

Но возвратимся к нашей задаче. Если после истечения из самовара 20 стаканов уровень воды в нем (считая от отверстия

крана) понизился в *четыре* раза, то двадцать первый стакан наполнится *вдвое* медленнее, чем первый. И если в дальнейшем уровень воды понизится в *девять* раз, то для наполнения последних стаканов понадобится уже *втрое* больше времени, чем для наполнения первого. Все знают, как вяло вытекает вода из крана самовара, который уже почти опорожнен. Решая эту задачу приемами высшей математики, можно доказать, что время, нужное на полное опорожнение сосуда, в *два раза больше* срока, в течение которого вылился бы такой же объем жидкости при неизменном первоначальном уровне ⁹.

Задача о бассейне

От сказанного один шаг к пресловутым задачам о бассейне, без которых не обходится ни один арифметический и

алгебраический задачник. Всем памятно классически-скучные, схоластические задачи вроде следующей:

“В бассейн проведены две трубы. Через одну первую пустой бассейн может наполниться за 5 часов; через одну вторую полный бассейн может опорожниться за 10 часов (рис. 56). За какое время наполнится пустой бассейн, если открыть обе трубы сразу? ”

Задачи этого рода имеют почтенную давность— почти 20 веков, восходя к Герону Александрийскому. Вот одна из геро-новых задач,— не столь, правда, замысловатая, как ее потомки:

Четыре фонтана дано. Обширный дан водоем.
За сутки первый фонтан до краев его наполняет.
Два дня и две ночи второй над тем же должен работать.
Третий втрое, чем первый, слабей.
В четверо суток последний за ним поспевает.
Ответить мне, скоро ли будет он полон,
Если во время одно все их открыть?

Две тысячи лет решаются задачи о бассейнах и— такова сила рутины! — две тысячи лет решаются *неправильно*. Почему неправильно— вы поймете сами после того, что сейчас сказано было о вытекании воды.

Как учат решать задачи о бассейнах? Первую, например, задачу решают так. За 1 час первая труба наливает $1/5$ бассейна, вторая выливает $1/10$ бассейна; значит, при действии обеих труб в бассейн ежечасно поступает

$$1/5 - 1/10 = 1/10$$

часть бассейна, откуда для времени наполнения бассейна получается 10 часов.

Это рассуждение неверно: если течение воды можно считать происходящим под постоянным давлением и, следовательно, равномерным, то ее *вытекание* происходит при изменяющемся уровне и, значит, *неравномерно*. Из того, что второй трубой бассейн опоражнивается за 10 часов, вовсе не следует, что ежечасно вытекает $1/10$ часть бассейна; школьный прием решения, как видим, ошибочен. Решить задачу правильно средствами элементарной математики нельзя, а потому за-




Рис. 56. Задача о бассейне.

дачам о бассейне (с *вытекающей* водой) вовсе не место в арифметических задачниках *

Удивительный сосуд

Возможно ли устроить такой сосуд, из которого вода вытекала бы все время равномерной струей, не замедляя своего течения, несмотря на то, что уровень жидкости понижается? После того, что вы узнали из предыдущих статей, вы, вероятно, готовы счесть подобную задачу неразрешимой

Между тем это вполне осуществимо. Сосуд, изображенный на рис. 57, — именно такой удивительный сосуд. Это обыкновенная бутылка с узким горлом, через пробку которой вдвинута стеклянная трубка. Если вы откроете кран *С* ниже конца трубки, то жидкость будет литься из него неослабевающей струей до тех пор, пока уровень воды не опустится в сосуде до нижнего конца трубки (на уровне пробки *В*). Вдвинув трубку почти до уровня крана *С*, вы можете заставить всю жидкость, находящуюся выше уровня отверстия, вытечь равномерной, хотя и очень слабой струей.




Рис. 57. Устройство сосуда Мариотта. Из отверстия *С* вода течет равномерно.

Отчего это происходит? Проследите мысленно за тем, что совершается в сосуде при открытии крана *С*. Прежде всего выливается вода из стеклянной трубки; уровень жидкости внутри нее опускается до конца трубки. При дальнейшем вытекании опускается уже уровень

воды в сосуде и через стеклянную трубку входит наружный воздух; он просачивается пузырьками через воду и собирается над ней в верхней части сосуда. Теперь на всем уровне пробки *В* давление равно атмосферному. Значит, вода из крана *С* вытекает лишь под давлением слоя воды *ВС*, потому что давление атмосферы изнутри и снаружи сосуда уравнивается. А так как толщина слоя *ВС* остается постоян-

* Подробный разбор таких задач читатель может найти в моей книге "Знаете ли вы физику?"

ной, то и неудивительно, что струя все время течет с одинаковой скоростью.

Попробуйте же теперь ответить на вопрос: как быстро будет вытекать вода, если вынуть пробку *В* на уровне конца трубки?

Оказывается, что она *вовсе не будет вытекать* (разумеется, если отверстие настолько мало, что шириной его можно пренебречь; иначе вода будет вытекать под давлением тонкого слоя воды, толщиной в ширину отверстия). В самом деле, здесь изнутри и снаружи давление равно атмосферному, и ничто не побуждает воду вытекать.

А если бы вы вынули пробку *А* *выше* нижнего конца трубка, то не только вода не вытекала бы из сосуда, но в него еще входил бы наружный воздух. Почему? По весьма простой причине: внутри этой части сосуда давление воздуха *меньше*, чем атмосферное давление снаружи.

Этот сосуд со столь необычайными свойствами был придуман знаменитым физиком Мариоттом и назван по имени ученого “сосудом Мариотта”.

Поклажа из воздуха

В середине XVII века жители города Регенсбурга и съехавшиеся туда члены Регенсбургского имперского съезда во главе с императором Фердинандом III были свидетелями поразительного зрелища: 16 лошадей из всех сил старались разнять два приложенных друг к другу медных полушария. Что связывало их? “Ничто”, — воздух. И тем не менее восемь лошадей, тянувших в одну сторону, и восемь, тянувших в другую, оказались не в силах их разъединить. Так бургомистр Отто фон Герике воочию показал всем, что воздух — *вовсе не “ничто”*, что он имеет вес и давит со значительной силой на все земные предметы.

Опыт этот был произведен 8 мая 1654 г. при весьма торжественной обстановке. Ученый бургомистр сумел всех заинтересовать своими научными изысканиями, несмотря на то, что дело происходило в разгар политических неурядиц и опустошительных войн.

Рассказ о знаменитом опыте с “магдебургскими полушариями”, я уверен, читатель с интересом выслушает из уст самого Герике, этого “германского Галилея”, как иногда называют замечательного физика. Объемистая книга с описанием длинного ряда его опытов вышла на латинском языке в Амстердаме в 1672 г. и, подобно всем книгам этой эпохи, носила пространное заглавие. Вот оно:

ОТТО фон ГЕРИКЕ

Так называемые новые магдебургские опыты над БЕЗВОЗДУШНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ,

первоначально описанные профессором математики
в Вюрцбургском университете КАСПАРОМ ШОТТОМ

Издание самого автора,
более обстоятельное и пополненное различными
новыми опытами

Интересующему нас опыту посвящена глава XVIII этой книги. Приводим дословный ее перевод.

“Опыт, показывающий, что давление воздуха соединяет два полушария так прочно, что их нельзя разнять усилиями 16 лошадей.

Я заказал два медных полушария диаметром в три четверти магдебургских локтя*. Но в действительности диаметр их заключал всего 67/100, так как мастера, по обыкновению, не могли изготовить в точности то, что требовалось. Оба полушария вполне отвечали одно другому. К одному полушарию был приделан кран; с помощью этого крана можно удалить воздух изнутри и препятствовать проникновению воздуха снаружи. Кроме того, к полушариям прикреплены были четыре кольца, через которые продевались канаты, привязанные к упряжи лошадей. Я велел также шить кожаное кольцо; оно напитано было смесью воска в скипидаре; зажатое между полушариями, оно не пропускало в них воздуха. В кран вставлена была трубка воздушного насоса, и был удален воздух внутри шара. Тогда обнаружилось, с какой силой оба полушария придавливались друг к другу через кожаное кольцо. Давление наружного воздуха прижимало их так крепко, что 16 лошадей (рывком) совсем не могли их разнять или достигали этого лишь с трудом. Когда же полушария, уступая напряжению всей силы лошадей, разъединялись, то раздавался грохот, как от выстрела.

Но стоило поворотом крана открыть свободный доступ воздуху— и полушария легко было разнять руками”

Несложное вычисление может объяснить нам, почему нужна такая значительная сила (восемь лошадей с каждой стороны), чтобы разъединить части пустого шара. Воздух давит с силой около 1 кгс на каждый квадратный сантиметр; площадь круга** диаметром в 0,67 локтя (37 см) равна

* “Магдебургский локоть” равен 550 см.

** Берется *площадь круга*, а не поверхность полушария, потому что атмосферное давление равно указанному значению лишь при действии на поверхность под прямым углом; для наклонных поверхностей это давление меньше. В данном случае мы берем прямоугольную *проекцию* шаровой поверхности на плоскость, т. е. площадь большого круга.

1060 см². Значит, давление атмосферы на каждое полушарие должно превышать 1000 кгс = 1 тс. Каждая восьмерка лошадей должна была, следовательно, тянуть с силой 1 тс, чтобы противодействовать давлению наружного воздуха.

Казалось бы, для восьми лошадей (с каждой стороны) это не очень большой груз. Не забывайте, однако, что, двигая, например, кладь весом в 1 тс, лошади преодолевают силу не в 1 тс, а гораздо меньшую, именно — силу трения колес об оси и о мостовую. А эта сила составляет (на шоссе, например) всего процентов пять, т. е. при однотоном грузе — 50 кгс. (Не говорим уже о том, что при соединении усилий восьми лошадей теряется, как показывает практика, 50 % силы тяги.) Следовательно, сила тяги в 1 тс соответствует при восьми лошадях нагрузке телеги в 20 тс. Вот какова та воздушная поклажа, везти которую должны были лошади магдебургского бургомистра! Они словно должны были сдвинуть с места небольшой паровоз, не поставленный, к тому же, на рельсы.




Рис 58. Кости наших тазобедренных сочленений не распадаются подобно магдебургским полушариям

Измерено, что сильная лошадь тянет воз с усилием всего в 80 кгс*. Следовательно, для разрыва магдебургских полушарий понадобилось бы при равномерной тяге 1000 кгс/80 кгс, т. е. по 13 лошадей с каждой стороны**

Читатель будет, вероятно, изумлен, узнав, что некоторые сочленения нашего скелета не распадаются по той же причине, что и магдебургские полушария (рис. 58). Наше тазобедренное сочленение представляет собой именно такие магдебургские полушария. Можно обнажить это сочленение от мускульных и хрящевых связей, и все-таки бедро не выпадает: его прижимает атмосферное давление, так как в межсуставном пространстве воздуха нет¹⁰).

* При скорости 4 км/ч. В среднем принимается, что сила тяги лошади составляет 15% ее веса; весит же лошадь: легкая 400 кгс, тяжелая 750 кгс. На очень короткое время (начальное усилие) сила тяги может быть в несколько раз больше.

** Разъяснение того, почему требуется по 13 лошадей с каждой стороны, читатель найдет в моей «Занимательной механике».

Новые героновы фонтаны

Обычная форма фонтана, приписываемого древнему механику Герону Александрийскому, вероятно, известна моим читателям. Напомню здесь его устройство, прежде чем перейти к описанию видоизменений этого любопытного прибора. Геронов фонтан (рис. 59) состоит из трех сосудов: верхнего открытого (*a*) и двух шарообразных (*b* и *c*), герметически замкнутых. Сосуды соединены тремя трубками. Когда в сосуде *a* есть немного воды, шар *b* наполнен водой, а шар *c* — воздухом, фонтан начинает действовать: вода переливается по трубке из *a* в *c*, вытесняя оттуда воздух в шар *b*; под давлением поступающего воздуха вода из *b* устремляется по трубке вверх и бьет фонтаном над сосудом *a*. Когда же шар *b* опорожнится, фонтан перестает бить.

Такова старинная форма геронова фонтана. Один школьный учитель в Италии, побуждаемый к изобретательности скудной обстановкой своего физического кабинета, упростил устройство геронова фонтана и придумал такие видоизменения его, которые каждый может устроить при помощи простейших средств (рис. 60). Вместо шаров он употребил аптечные склянки; вместо стеклянных или металлических трубок взял резиновые. Верхний сосуд не надо продырявливать: можно просто ввести в него концы трубок, как показано на рис. 60 сверху слева.

В таком виде прибор гораздо удобнее к употреблению: когда вся вода из банки *b* перельется через сосуд *a* в банку *c*, можно просто переставить банки *b* и *c*, и фонтан вновь действует; не надо забывать, разумеется, пересадить также наконецник на другую трубку.

Другое удобство видоизмененного фонтана состоит в том, что он дает возможность произвольно изменять расположение сосудов и изучать, как влияет разница уровней сосудов на высоту струи.

Если желаете во много раз увеличить высоту струи, вы можете достигнуть этого, заменив в нижних склянках описанного прибора воду ртутью, а воздух — водой (рис. 61). Действие прибора понятно: ртуть, переливаясь из банки *c* в банку *b*, вытесняет из нее воду, заставляя ее бить фонтаном.

Зная, что ртуть почти в 13,5 раза тяжелее воды, мы можем вычислить, на какую высоту должна подниматься при этом струя фонтана. Обозначим разницу уровней соответственно через h_1 , h_2 , h_3 . Теперь разберемся, под действием какого

давления ртуть из банки *c* перетекает в банку *b*. Ртуть в соединительной трубке подвержена давлению с двух сторон. Справа на нее действует давление разности h_2 ртутных столбов (которое равносильно давлению в 13,5 раза более высокого водяного столба, $13,5 h_2$) плюс давление водяного столба h_1 . Слева напирает водяной столб h_3 . В итоге ртуть увлекается силой $13,5 h_2 + h_1 - h_3$.




Рис. 59. Старинный геронов фонтан.




Рис. 60. Видоизменение геронова фонтана.

Но $h_3 - h_1 = h_2$; заменив поэтому $h_1 - h_3$ на $-h_2$, получаем
 $13,5 h_2 - h_2$, т. е. $12,5 h_2$.

Итак, ртуть поступает в банку *b* под давлением веса водяного столба высотой $12,5 h_2$. Теоретически фонтан должен бить поэтому на высоту, равную разности ртутных уровней в склянках, умноженной на 12,5. Трение несколько понижает эту теоретическую высоту.

Тем не менее описанный прибор дает удобную возможность получить бьющую высоко вверх струю. Чтобы заставить, например, фонтан бить на высоту 10 м, достаточно

поднять одну банку над другой примерно на 1 м. Любопытно, что, как видно из нашего расчета, возвышение сосуда *a* над склянками с ртутью несколько не влияет на высоту струи.

Обманчивые сосуды

В старину (в XVII—XVIII веках) вельможи забавлялись следующей поучительной игрушкой: приобретали кружку (или кувшин), в верхней части которой имелись крупные узорчатые вырезы (рис. 62). Такую кружку, налитую вином, предлагали незнатному гостю, над которым можно было безнаказанно посмеяться. Как пить из нее? Наклонить — нельзя: вино польется из множества сквозных отверстий, а до рта не достигнет ни капли. Случится, как в сказке:

Мед, пиво пил,
Да усы лишь обмочил.

Но кто знал секрет устройства подобных кружек, — секрет, который показан на рис. 63, — тот затыкал пальцем отверстие *B*, брал в рот носик *A* и втягивал в себя жидкость, не наклоняя сосуда: вино




Рис. 61. Фонтан, действующий под давлением ртути. Струя бьет раз в десять выше разности уровней ртути.



Рис. 62. Обманчивый кувшин конца XVIII века.




Рис. 63. Секрет устройства кувшина (см. рис. 62).

поднималось через отверстие *D* по каналу внутри ручки, далее по его продолжению *C* внутри верхнего края кружки и достигало носика.

Не так давно еще подобные кружки изготавливались нашими гончарами. Мне случилось в одном доме видеть образчик их работы, довольно искусно скрывающей секрет устройства сосуда.

Сколько весит вода в опрокинутом стакане?

— Ничего, конечно, не весит: в таком стакане вода не держится, выливается, — скажете вы.

— А если не выливается? — спрошу я. — Что тогда?

В самом деле, возможно ведь удержать воду в опрокинутом стакане так, чтобы она не выливалась. Этот случай изображен на рис. 64. Опрокинутый стеклянный бокал, подвязанный за доньшко к одной чашке весов, наполнен водой, которая не выливается, так как края бокала погружены в сосуд с водой. На другую чашку весов положен точно такой же пустой бокал.

Какая чашка весов перетянет?

Перетянет та, к которой привязан опрокинутый бокал с водой. Этот бокал испытывает сверху полное атмосферное давление, снизу же — атмосферное давление, ослабленное весом содержащейся в бокале воды. Для равновесия чашек необходимо было бы наполнить водой бокал, помещенный на другую чашку ¹¹.

При указанных условиях, следовательно, вода в опрокинутом стакане весит столько же, сколько и в поставленном на дно.




Рис. 64. Какая чашка весов перетянет?

Отчего притягиваются корабли?

Осенью 1912 г. с океанским пароходом “Олимпик” (тогда одним из величайших в мире судов) произошел следующий случай. “Олимпик” плыл в открытом море, а почти парал-

лельно ему, на расстоянии сотни метров, проходил с большой скоростью другой корабль, гораздо меньший, броненосный крейсер “Гаук”. Когда оба судна заняли положение, изображенное на рис. 65, произошло нечто неожиданное: меньшее судно стремительно свернуло с пути, словно повинувшись какой-то неведомой силе, повернулось носом к




Рис. 65. Положение “Олимпики” и “Гаука” перед столкновением.

большому пароходу и, не слушаясь руля, двинулось почти прямо на него. Произошло столкновение. “Гаук” врезался носом в бок “Олимпики”; удар был так силен, что “Гаук” проделал в борту “Олимпики” большую пробоину.

Когда этот странный случай рассматривался в морском суде, виновной стороной был признан капитан гиганта “Олимпик”, так как, — гласило

постановление суда, — он не отдал никаких распоряжений уступить дорогу идущему наперерез “Гауку”.

Суд не усмотрел здесь, следовательно, ничего необычайного: простая нераспорядительность капитана, не больше. А между тем, имело место совершенно непредвиденное обстоятельство: случай *взаимного притяжения судов на море*.

Такие случаи не раз происходили, вероятно, и раньше при параллельном движении двух кораблей. Но пока не строили очень крупных судов, явление это не проявлялось с такой силой. Когда воды океанов стали бороздить “плавающие города”, явление притяжения судов сделалось гораздо заметнее; с ним считаются командиры военных судов при маневрировании.


Многочисленные аварии мелких судов, проплывавших в соседстве с большими пассажирскими и военными судами, происходили, вероятно, по той же причине.

Чем же объясняется это притяжение? Конечно, здесь не может быть и речи о притяжении по закону всемирного тяготения Ньютона; мы уже видели (в гл. 4), что это притяжение слишком ничтожно. Причина явления совершенно иного рода и объясняется законами течения жидкостей в трубках и каналах. Можно доказать, что если жидкость протекает по каналу, имеющему сужения и расширения, то в узких частях канала она течет быстрее и давит на стенки канала слабее, нежели в широких местах (рис. 66), где она

протекает спокойнее и давит на стенки сильнее (так называемый “принцип Бернулли”).

То же справедливо и для газов. Это явление в учении о *газах* носит название эффекта Клемана—Дезорма (по имени открывших его физиков) и нередко именуется “аэростатическим парадоксом”. Впервые явление это, как говорят, обнаружено было случайно при следующих обстоятельствах. В одном из французских рудников рабочему приказано было закрыть щитом отверстие наружной штольни, через которую подавался в шахту сжатый воздух. Рабочий долго боролся со струей воздуха, но внезапно щит сам собой захлопнул штольню с такой силой, что, будь щит недостаточно велик, его втянуло бы в вентиляционный люк вместе с перепуганным рабочим.

Рис. 66. В узких частях канала вода течет быстрее и давит на стенки слабее, чем в широких.



Между прочим, этой особенностью течения газов объясняется действие пульверизатора. Когда мы дуем в колено *a* (рис. 67), заканчивающееся сужением, то воздух, переходя в сужение, уменьшает свое давление. Таким образом, над трубкой *b* оказывается воздух с уменьшенным давлением, и потому давление атмосферы гонит жидкость из сосуда вверх по трубке; у отверстия жидкость попадает в струю выдуваемого воздуха и в нем распыляется.

Теперь мы поймем, в чем кроется причина притяжения судов. Когда два парохода плывут параллельно один другому, между их бортами получается как бы водяной канал. В обыкновенном канале стенки неподвижны, а движется вода; здесь же наоборот: неподвижна вода, а движутся стенки. Но действие сил от этого несколько не меняется: в узких местах подвижного канала вода слабее давит на стенки, нежели в пространстве вокруг пароходов. Другими словами, бока пароходов, обращенные друг к другу, испытывают со стороны воды меньшее дав-




Рис. 67. Пульверизатор.

ление, нежели наружные части судов (рис. 68). Что же должно произойти вследствие этого? Суда должны под напором наружной воды двинуться друг к другу, и естественно, что меньшее судно перемещается заметнее, между тем как более массивное остается почти неподвижным. Вот почему притяжение проявляется с особой силой, когда большой корабль быстро проходит мимо маленького.




Рис. 68. Течение воды между двумя плывущими судами.

Итак, притяжение кораблей обусловлено всасывающим действием текущей воды. Этим же объясняется и опасность быстрин для купающихся, всасывающее действие водоворотов. Можно вычислить, что течение воды в реке при умеренной скорости 1 м/с

втягивает человеческое тело с силой 30 кгс! Против такой силы не легко устоять, особенно в воде, когда собственный вес нашего тела не помогает нам сохранять устойчивость. Наконец, втягивающее действие быстро несущегося поезда объясняется тем же принципом Бернулли: поезд при скорости 50 км/ч увлекает близстоящего человека с силой около 8 кгс.

Явления, связанные с принципом Бернулли, хотя и весьма нередки, мало известны в кругу неспециалистов. Полезно будет поэтому остановиться на нем подробнее. Далее мы приводим отрывок из статьи на эту тему, помещенной в одном научно-популярном журнале.

Принцип Бернулли и его следствия




Рис. 69. Иллюстрация принципа Бернулли. В узкой части (а) трубки АВ давление меньше, нежели в широкой

Принцип, впервые высказанный Даниилом Бернулли в 1726 г., гласит: в струе воды или воздуха давление велико, если скорость мала, и давление мало, если скорость велика. Существуют известные ограничения этого принципа, но здесь мы не будем на них останавливаться.

Рис. 69 иллюстрирует этот принцип.

Воздух продувается через трубку AB . Если сечение трубки мало, как в a , скорость воздуха велика; если же сечение велико, как в b , скорость воздуха мала. Там, где скорость велика, давление мало, а где скорость мала, давление велико. Вследствие малого давления воздуха в a жидкость в трубке C поднимается; в то же время сильное давление воздуха в b заставляет опускаться жидкость в трубке D .

На рис. 70 трубка T укреплена на медном диске DD ; воздух продувается через трубку T и далее мимо свободного диска dd^* . Воздух между двумя дисками имеет большую скорость, но эта скорость быстро убывает по мере приближения к краям дисков, так как сечение воздушного потока быстро возрастает и преодолевается инерция воздуха,




Рис. 70. Опыт с дисками.

вытекающего из пространства между дисками. Но давление окружающего диск воздуха велико, так как скорость мала, а давление воздуха между дисками мало, так как скорость велика. Поэтому воздух, окружающий диск, оказывает большее воздействие на диски, стремясь их сблизить, нежели воздушный поток между дисками, стремящийся их раздвинуть; в результате диск dd присасывается к диску DD тем сильнее, чем сильнее ток воздуха в трубке T ¹².

На рис. 71 показана гидродинамическая аналогия опыта, изображенного на рис. 70. Быстро движущаяся вода на диске DD находится на низком уровне и сама поднимается до более высокого уровня спокойной воды в бассейне, когда огибает края диска. Поэтому спокойная вода под диском имеет более высокое давление, чем движущаяся вода над диском, вследствие чего диск поднимается. Стержень P не допускает боковых смещений диска.

Рис. 72 изображает легкий шарик, плавающий в струе воздуха. Воздушная струя ударяется о шарик и не дает ему падать. Когда шарик выскакивает из струи, окружающий воздух возвращает его обратно в струю, так как давление окружающего воздуха, имеющего малую скорость, велико, а

* Тот же опыт можно проделать проще, воспользовавшись катушкой и бумажным кружком. Чтобы кружок не соскальзывал в сторону, его пробивают булавкой, воткнутой в стенку канала катушки.




Рис. 71. Диск DD приподнимается на стержне P , когда на него выливается струя воды из бака.




Рис. 72. Шарик, поддерживаемый струей воздуха.

давление воздуха в струе, имеющего большую скорость, мало.

Рис. 73 представляет два судна, движущиеся рядом в спокойной воде, или, что сводится к тому же, два судна, стоящие рядом и обтекаемые водой. Поток более стеснен в пространстве между судами, и скорость воды в этом пространстве больше, чем по обе стороны судов. Поэтому давление воды между судами меньше, чем по обе стороны судов; более высокое давление воды, окружающей суда, сближает их. Моряки очень хорошо знают, что два корабля, идущие рядом, сильно притягиваются друг к другу.




Рис. 73. Два судна, движущиеся параллельно, как бы притягивают друг друга.




Рис. 74. При движении судов вперед судно B поворачивается носом к судну A .

Более серьезный случай может иметь место, когда один корабль идет за другим, как представлено на рис. 74. Две силы F и F , которые сближают корабли, стремятся повер-

нуть их, причем судно *В* поворачивается к *А* со значительной силой. Столкновение в таком случае почти неизбежно, так как руль не успевает изменить направление движения корабля.

Явление, описанное в связи с рис. 73, можно демонстрировать, продувая воздух между двумя легкими резиновыми шариками, подвешенными, как указано на рис. 75. Если между ними продувать воздух, они сближаются и ударяются друг о друга.




Рис. 75. Если между двумя легкими шариками продувать воздух, они сближаются до соприкосновения.

Назначение рыбьего пузыря

О том, какую роль выполняет плавательный пузырь рыб, обыкновенно говорят и пишут — казалось бы, вполне правдоподобно — следующее. Для того чтобы всплыть из глубины в поверхностные слои воды, рыба раздувает свой плавательный пузырь; тогда объем ее тела увеличивается, вес вытесняемой воды становится больше ее собственного веса — и, по закону плавания, рыба поднимается вверх. Чтобы прекратить подъем или опуститься вниз, она, напротив, сжимает свой плавательный пузырь. Объем тела, а с ним и вес вытесняемой воды уменьшаются, и рыба опускается на дно согласно закону Архимеда.

Такое упрощенное представление о назначении плавательного пузыря рыб восходит ко временам ученых Флорентийской академии (XVII век) и было высказано профессором Борелли в 1685 г. В течение более чем 200 лет оно принималось без возражений, успело укорениться, и только трудами исследователей Моро и Шарбонеля была обнаружена полная несостоятельность этой теории.

Пузырь имеет, несомненно, весьма тесную связь с плаванием рыб, так как рыбы, у которых пузырь был при опытах искусственно удален, могли держаться в воде, только усиленно работая плавниками, а при прекращении этой работы падали на дно. Какова же истинная его роль? Весьма ограниченная: он лишь помогает рыбе оставаться на определенной глубине, — именно на той, где вес вытесняемой рыбой воды равен весу самой рыбы.

Когда же рыба работой плавников опускается *ниже* этого уровня, тело ее, испытывая большое наружное давление со стороны воды, сжимается, сдавливая пузырь; вес вытесняемого объема воды уменьшается, становятся меньше веса рыбы, и рыба неудержимо падает вниз. Чем ниже она опускается, тем сильнее становится давление воды (на 1 атм при опускании на каждые 10 м), тем больше сдавливается тело рыбы и тем стремительнее продолжает оно опускаться.

То же самое, только в обратном направлении, происходит тогда, когда рыба, покинув слой, где она находилась в равновесии, перемещается работой плавников в более высокие слои. Тело ее, освободившись от части наружного давления и по-прежнему распираемое изнутри плавательным пузырем (в котором давление газа находилось до этого момента в равновесии с давлением окружающей воды), увеличивается в объеме и вследствие этого всплывает выше. Чем выше рыба поднимается, тем более раздувается ее тело и тем, следовательно, стремительнее ее дальнейший подъем. Помешать этому, “сжимая пузырь”, рыба не в состоянии, так как стенки ее плавательного пузыря лишены мышечных волокон, которые могли бы активно изменять его объем.

Что такое *пассивное* расширение объема тела действительно совершается у рыб, подтверждается следующим опытом (рис. 76). Рыбка в заклороформированном состоянии помещается в закрытый сосуд с водой, в котором поддерживается усиленное давление, близкое к тому, какое господствует на определенной глубине в естественном водоеме. На поверхности воды рыбка лежит бездеятельно, вверх брюшком. Погруженная немного глубже, она вновь всплывает на поверхность. Помещенная ближе ко дну, она опускается на дно. Но в промежутке между обоими уровнями существует слой воды, в котором рыбка остается в равновесии — не тонет и не всплывает. Все это становится понятным, если вспомним сказанное сейчас о пассивном расширении и сжатии плавательного пузыря.

Итак, вопреки распространенному мнению, рыба вовсе не может произвольно раздувать и сжимать свой плавательный пузырь. Изменения его объема происходят пассивно, под действием усиленного или ослабленного наружного давления (согласно закону Бойля — Мариотта). Эти изменения объема для рыбы не только не полезны, а, напротив, приносят ей вред, так как обуславливают либо неудержимое, все ускоряющееся падение на дно, либо столь же неудержимый и ускоряющийся подъем на поверхность. Другими

словами, пузырь помогает рыбе в неподвижном положении сохранять равновесие, но равновесие это *неустойчивое*.

Такова истинная роль плавательного пузыря рыб,— поскольку речь идет о его отношении к плаванию; выполняет ли он также и другие функции в организме рыбы и какие именно,— неизвестно, так что орган этот все же является пока загадочным. И только его гидростатическую роль можно считать в настоящее время вполне выясненной.

Наблюдения рыболовов подтверждают сказанное. При ловле рыб из большой глубины случается, что иная рыба на половине пути высвобождается; но, вопреки ожиданию, она не опускается вновь в глубину, из которой была извлечена, а, напротив, стремительно поднимается на поверхность. У таких-то рыб и замечают иногда, что пузырь выпячивается через рот.





Рис. 76. Опыт с рыбкой.

Волны и вихри

Многие из повседневных физических явлений не могут быть объяснены на основе элементарных законов физики. Даже такое часто наблюдаемое явление, как волнение моря в ветреный день, не поддается исчерпывающему объяснению в рамках школьного курса физики. А чем обусловлены волны, разбегющиеся в спокойной воде от носа идущего парохода? Почему волнуются флаги в ветреную погоду? Почему песок на берегу моря располагается волнообразно? Почему клубится дым, вы-

Рис. 77. Спокойное (ламинарное) течение жидкости в трубе.



ходящий из заводской трубы? Чтобы объяснить эти и другие подобные им явления ¹³, надо знать особенности так называемого *вихревого* движения жидкостей и газов. Постараемся рас-

сказать здесь немного о вихревых явлениях и отметить их главные особенности.

Представим себе жидкость, текущую в трубе. Если все частицы жидкости движутся при этом вдоль трубы по параллельным линиям, то перед нами простейший вид движения жидкости — спокойный или, как физики говорят, *ламинарный* поток (рис. 77). Однако это вовсе не самый частый случай. Напротив, гораздо чаще жидкости текут в трубах беспокойно; от стенок трубы идут к ее оси вихри. Это — вихреобразное или *турбулентное* движение (рис. 78). Так течет, например, вода в трубах водопроводной сети (если не иметь в виду тонкие трубы, где течение ламинарное). Вихревое течение наблюдается всякий раз, когда скорость течения данной жидкости в трубе (данного диаметра) достигает определенной величины, так называемой *критической скорости*




Рис. 78. Вихревое (турбулентное) течение жидкости в трубе.

Вихри текущей в трубе жидкости можно сделать заметными для глаз, если в прозрачную жидкость, текущую в стеклянной трубке, ввести немного легкого порошка, например ликоподия. Тогда ясно различаются вихри, идущие от стенок трубки к ее оси.

Эта особенность вихревого течения используется в технике при устройстве холодильников и охладителей. Жидкость, текущая турбулентно в трубке с охлаждаемыми стенками, гораздо быстрее приводит все свои частицы в соприкосновение с холодными стенками, нежели при движении без вихрей; надо помнить, что сами по себе жидкости — плохие проводники теплоты и при отсутствии перемешивания охлаждаются или прогреваются очень медленно. Оживленный тепловой и вещественный обмен крови с омываемыми ею тканями также возможен лишь потому, что ее течение в кровеносных сосудах не ламинарное, а вихревое ¹⁴.

Сказанное о трубах относится в равной мере и к открытым каналам и руслам рек: в каналах и реках вода течет турбулентно. При точном измерении скорости течения реки

* Критическая скорость для какой-нибудь жидкости прямо пропорциональна вязкости жидкости и обратно пропорциональна ее плотности и диаметру трубы, по которой жидкость течет. (Подробности в книге: Кирпичев В. Л. Беседы по механике. — 3-е изд., — М.; Л.: Гостехиздат, 1933, беседа седьмая.)


инструмент обнаруживает пульсации, особенно близ дна: пульсации указывают на постоянно меняющееся направление течения, т. е. на вихри. Частицы речной воды движутся не только вдоль речного русла, как обычно представляют себе, но также и от берегов к середине. Оттого и неправильно утверждение, будто в глубине реки вода имеет круглый год одну и ту же температуру, именно $+4^{\circ}\text{C}$: вследствие перемешивания температура текущей воды близ дна реки (но не озера) такая же, как и на поверхности*.

Рис. 79. Образование песчаных волн на морском берегу под действием водяных вихрей.



Вихри, образующиеся у дна реки, увлекают с собой легкий песок и порождают здесь песчаные волны. То же можно видеть и на песчаном берегу моря, омываемом набегающей волной (рис. 79). Если бы течение воды близ дна было спокойное, песок на дне имел бы ровную поверхность.

Рис. 80. Волнообразное движение веревки в текучей воде обусловлено образованием вихрей.



Итак, близ поверхности тела, омываемого водой, образуются вихри. Об их существовании говорит нам, например, змеевидно извивающаяся веревка, протянутая вдоль по течению воды (когда один конец веревки привязан, а другой свободен). Что тут происходит? Участок веревки, близ которого образовался вихрь, увлекается им; но в следующий момент этот участок движется уже другим вихрем в противоположную сторону — получается змеевидное извивание (рис. 80). Легко понять теперь, почему волнуется флаг при ветре (рис. 81); с ним происходит то же, что и с веревкой в текучей воде.




Рис. 81. Рекущий флаг на ветру.

* См. мою книгу "Знаете ли вы физику?"

От жидкостей перейдем к газам, от воды — к воздуху. Кто не видел, как воздушные вихри увлекают с земли пыль, солому и т. п.? Это — проявление вихревого течения воздуха вдоль поверхности земли. А когда воздух течет вдоль водной поверхности, то в местах образования вихрей, вследствие понижения здесь воздушного давления, вода возвышается горбом — порождается волнение. Та же причина порождает песчаные волны в пустыне и на склонах дюн (рис. 82). Волнение зрелой нивы того же происхождения. Твердая пластинка флюгера не сохраняет при ветре постоянного направления, а, повинаясь вихрям, все время колеблется. Такого же вихревого происхождения и клубы дыма, выходящего из заводской трубы: топочные газы протекают через трубу вихревым движением, которое продолжается некоторое время г.з инерции за пределами трубы (рис. 83).



Рис. 82. Волнообразная поверхность песка в пустыне.





Рис. 83. Клубы дыма, выходящего из заводской трубы.

Велико значение турбулентного движения воздуха для авиации. Крыльям самолета придается такая форма, при которой место разрежения воздуха под крылом оказывается заполненным веществом крыла, а вихревое действие над крылом, напротив, усиливается. В итоге крыло снизу подпирается, а сверху присасывается (рис. 84). Сходные явления имеют место и при парении птицы с распростертыми крыльями.

Как действует ветер, обдувающий крышу? Вихри создают над крышей разрежение воздуха; стремясь выровнять давление, воздух из-под крыши, увлекаясь вверх, напирает на нее. В результате происходит то, что, к сожалению, приходится нередко наблюдать: легкая, непрочная прикрепленная крыша

уносится ветром. Большие оконные стекла по той же причине при ветре выдавливаются изнутри (а не разламываются напором снаружи). Однако эти явления проще объясняются уменьшением давления в движущемся воздухе (см. выше статью “Принцип Бернулли и его следствия”).

Рис. 84. Каким силам подвержено крыло самолета. Распределение давлений (+) и разрежений (—) воздуха по крылу на основании опытов. В итоге всех приложенных усилий, подпирющих и засасывающих, крыло увлекается вверх. (Сплошные линии показывают распределение давлений; штриховые — то же при резком увеличении скорости полета.)



Когда два потока воздуха разной температуры и влажности текут один вдоль другого, в каждом возникают вихри. Разнообразные формы облаков в значительной мере обусловлены этой причиной.

Мы видим, какой обширный круг явлений связан с вихревыми течениями.

Путешествие в недра Земли

Ни один человек не опускался еще в Землю глубже нескольких километров, а между тем радиус земного шара равен 6400 км. До центра Земли остается еще очень длинный путь. Тем не менее изобретательный Жюль Верн спустил глубоко в недра Земли своих героев — чудака-ученого Лиденброка и его племянника Акселя. В романе “Путешествие к центру Земли” он описал удивительные приключения этих подземных путешественников. В числе неожиданностей, встреченных ими под Землей, было, между прочим, и увеличение плотности воздуха. По мере поднятия вверх воздух разрежается очень быстро; его плотность уменьшается в геометрической прогрессии, в то время как высота поднятия растет в прогрессии арифметической. Напротив, при опускании вниз, ниже уровня океана, воздух под давлением вышележащих слоев должен становиться все плотнее. Подземные путешественники, конечно, не могли не заметить этого.

Вот какой разговор происходил между дядей-ученым и его племянником на глубине 12 лье (48 км) в недрах Земли.

— Посмотри, что показывает манометр? — спросил дядя.

— Очень сильное давление.

— Теперь ты видишь, что, спускаясь помаленьку, мы постепенно привыкаем к сгущенному воздуху и несколько не страдаем от этого.

— Если не считать боли в ушах.

— Пустяки!

— Хорошо, — отвечал я, решив не противоречить дяде. — Находиться в сгущенном воздухе даже приятно. Вы заметили, как громко раздаются в нем звуки?

— Конечно. В этой атмосфере даже глухой мог бы слышать.

— Но воздух будет становиться все плотнее. Не приобретет ли он в конце концов плотности воды?

— Конечно: под давлением в 770 атмосфер.

— А еще ниже?

— Плотность увеличится еще больше.

— Как же мы станем тогда спускаться?

— Набьем карманы камнями.

— Ну, дядя, у вас на все есть ответ!

Я не стал более вдаваться в область догадок, потому что, пожалуй, опять придумал бы какое-нибудь препятствие, которое рассердило бы дядю. Было, однако, очевидно, что под давлением в несколько тысяч атмосфер воздух может перейти в твердое состояние, а тогда, допуская даже, что мы могли вынести такое давление, придется все же остановиться. Тут уже никакие споры не помогут".

Фантазия и математика

Так повествует романист; но не то окажется, если мы проверим факты, о которых говорится в этом отрывке. Нам не придется спускаться для этого в недра Земли; для маленькой экскурсии в область физики вполне достаточно запастись карандашом и бумагой.

Прежде всего постараемся определить, на какую глубину нужно опуститься, чтобы давление атмосферы возросло на 1000-ю долю. Нормальное давление атмосферы равно давлению 760-миллиметрового столба ртути. Если бы мы были погружены не в воздух, а в ртуть, нам надо было бы опуститься всего на $760/1000 = 0,76$ мм, чтобы давление увеличилось на 1000-ю долю. В воздухе же, конечно, мы должны опуститься для этого гораздо глубже, и именно во столько раз, во сколько раз воздух легче ртути — в 10500 раз. Значит, чтобы давление увеличилось на 1000-ю долю нормального, вам придется опуститься не на 0,76 мм, как в ртути, а на $0,76 \times 10500$ мм, т. е. почти на 8 м. Когда же мы

опустимся еще на 8 м, то увеличенное давление возрастет еще на 1000-ю долю, и т. д.*. На каком бы уровне мы ни находились — у самого “потолка мира” (22 км), на вершине горы Эверест (9 км) или близ поверхности океана, — нам нужно опуститься на 8 м, чтобы давление атмосферы возросло на 1000-ю долю первоначальной величины. Получается, следовательно, такая таблица возрастания давления воздуха с глубиной:

На уровне	Земли	давление	нормальное	(760 мм рт. ст.)
» » глубине	8 м	»	1,001	нормального
» »	2×8 »	»	(1,001) ²	»
» »	3×8 »	»	(1,001) ³	»
» »	4×8 »	»	(1,001) ⁴	»

И вообще на глубине $n \times 8$ м давление атмосферы больше нормального в $(1,001)^n$ раз; и пока давление не очень велико, во столько же раз увеличится и плотность воздуха (закон Бойля — Мариотта)¹⁵.

Заметим, что в данном случае речь идет, как видно из романа, об углублении в Землю всего на 48 км, а потому ослабление силы тяжести и связанное с ним уменьшение веса воздуха можно не принимать в расчет.

Теперь можно рассчитать, как велико было то давление, которое подземные путешественники Жюль Верна испытывали на глубине 48 км (48000 м). В нашей формуле n равняется $48\,000/8 = 6000$. Приходится вычислять $(1,001)^{6000}$. Так как умножать 1,001 само на себя 6000 раз — занятие довольно скучное и отняло бы много времени, то мы обратимся к помощи логарифмов, о которых справедливо сказал Лаплас, что они, сокращая труд, удваивают жизнь вычислителей

* Следующий 8-метровый слой воздуха плотнее предыдущего, а потому прибавка давления будет по абсолютной величине больше, чем в предшествовавшем слое. Но она и должна быть больше, потому что здесь берется 1000-я доля от более крупной величины.

** Кто вынес из школы неприятное чувство к логарифмическим таблицам, тот, быть может, изменит свое недружелюбное к ним отношение, познакомившись с характеристикой, данной им великим французским астрономом. Вот это место в “Изложении системы мира”: “Изобретение логарифмов, сокращая вычисления нескольких месяцев в труд нескольких дней, как бы удваивает жизнь астрономов и освобождает их от погрешностей и утомления, неразлучных с длинными

$$\lg x = 6000 \times \lg 1,001 = 6000 \times 0,0043 = 2,6.$$

По логарифму 2,6 находим искомое число x ; оно равно 400.

Итак, на глубине 48 км давление атмосферы в 400 раз больше нормального; плотность воздуха при таком давлении возрастает, как показали опыты, в 315 раз. Сомнительно поэтому, чтобы наши подземные путники несколько не страдали, испытывая только “боль в ушах”... В романе Жюль Верна говорится, однако, о достижении людьми еще больших подземных глубин, именно 120 и даже 325 км. Давление воздуха должно было достигать там чудовищных степеней; человек же способен переносить безвредно для себя воздушное давление не свыше 3 атм.

Если бы по той же формуле мы стали вычислять, на какой глубине воздух становится так же плотен, как и вода, т. е. уплотняется в 770 раз, то получили бы цифру: 53 км. Но этот результат неверен, так как при высоких давлениях плотность газа уже не пропорциональна давлению. Закон Бойля— Мариотта вполне верен лишь для не слишком значительных давлений, не превышающих сотни атмосфер. Вот данные о плотности воздуха, полученные на опыте ¹⁶:

Давление, атм	200	400	600	1500	1800	2100
Плотность, отн. ед.	190	315	387	513	540	564

Увеличение плотности, как видим, заметно отстает от возрастания давления. Напрасно жюль-верновский ученый ожидал, что он достигнет глубины, где воздух плотнее воды, — этого ему не пришлось бы дожидаться, так как воздух достигает плотности воды лишь под давлением 3000 атм, а дальше уже почти не сжимается. О том же, чтобы превратить воздух в твердое состояние одним давлением, без сильнейшего охлаждения (ниже — 146 °C), не может быть речи.

Справедливость требует отметить, однако, что упомянутый роман Жюль Верна был опубликован задолго до того, как стали известны приведенные сейчас факты. Это оправдывает автора, хотя и не исправляет повествования.

вычислениями. Это изобретение тем лестнее для ума человеческого, что всецело почерпнуто из этого источника. В технике человек для увеличения своего могущества пользуется материалами и силами окружающей природы; в логарифмах же все является результатом его собственного ума”.

Воспользуемся еще приведенной выше формулой, чтобы вычислить наибольшую глубину шахты, на дне которой человек может оставаться без вреда для своего здоровья. Наибольшее воздушное давление, какое еще способен переносить наш организм, — 3 атм. Обозначая искомую глубину шахты через x , имеем уравнение $(1,001)^{x/8} = 3$, откуда (логарифмируя) вычисляем x . Получаем $x = 8,9$ км.

Итак, человек мог бы без вреда находиться на глубине почти 9 км. Если бы Тихий океан вдруг высох, люди могли бы почти повсюду жить на его дне.

В глубокой шахте

Кто ближе всего продвинулся к центру Земли — не в фантазии романиста, а в реальной действительности? Конечно, горнорабочие. Мы уже знаем (см. гл. 4), что одна из глубочайших шахт мира была прорыта в Южной Африке. Она уходит в глубь более чем на 3 км. Здесь имеется в виду не глубина проникновения бурильного долота, а углубление самих людей. Вот что рассказывает, например, о шахте на руднике Морро Вельхо (глубина около 2300 м) французский писатель Люк Дюртен, лично посетивший ее:

“Знаменитые золотые прииски Морро Вельхо находятся в 400 км от Рио-де-Жанейро. После 16 часов езды по железной дороге в скалистой местности вы спускаетесь в глубокую долину, окруженную джунглями. Здесь английская компания разрабатывает золотоносные жилы на такой глубине, на какую никогда раньше не спускался человек.

Жила идет в глубь косо. Шахта следует за ней шестью уступами. Вертикальные шахты — колодцы, горизонтальные — туннели. Чрезвычайно характерно для современного общества, что глубочайшая шахта, прорытая в коре земного шара, — самая смелая попытка человека проникнуть в недра планеты — сделана в поисках золота.

Наденьте парусиновую прозодежду и кожаную куртку. Осторожнее: малейший камешек, падающий в колодец, может ранить вас. Нас будет сопровождать один из “капитанов” шахты. Вы входите в первый туннель, хорошо освещенный. Вас охватывает дрожь от ледящего ветра в 4 °С: это — вентиляция для охлаждения глубин шахты.

Проехав в узкой металлической клетке первый колодец глубиной 700 м, вы попадаете во второй туннель. Спускаетесь во второй колодец; воздух становится теплее. Вы уже находитесь ниже уровня моря.

Начиная со следующего колодца, воздух обжигает лицо. Обливаясь потом, согнувшись под низким сводом, вы подвигаетесь по направлению к реву сверлильных машин. В густой пыли работают обнаженные люди; с них струится пот, руки безостановочно передают бутыль с водой. Но дотрагивайтесь до обломков руды, сейчас отколотых: температура их 57 °С.

Каков же итог этой ужасной, отвратительной действительности? — Около 10 килограммов золота в день...^{“*}

Описывая условия на дне шахты и степень крайней эксплуатации рабочих, французский писатель отмечает высокую температуру, но не упоминает о повышенном давлении воздуха. Вычислим, каково оно на глубине 2300 м. Если бы температура оставалась такая же, как на поверхности Земли, то, согласно знакомой уже нам формуле, плотность воздуха возросла бы в

$$(1,001)^{2300/8} = 1,33 \text{ раза.}$$

В действительности температура не остается неизменной, а повышается. Поэтому плотность воздуха растет не столь значительно, а меньше. В конечном итоге воздух на дне шахты по плотности отличается от воздуха на поверхности Земли немногим больше, чем воздух знойного летнего дня от морозного зимнего. Понятно теперь, почему это обстоятельство не привлекло к себе внимания посетителя шахты.

Зато большое значение имеет значительная влажность воздуха в таких глубоких рудниках, делающая пребывание в них невыносимым при высокой температуре. В одном из южноафриканских рудников (Йоганнесбург), глубиной 2553 м, влажность при 50 °С жары достигала 100%; здесь устраивался так называемый “искусственный климат”, причем охлаждающее действие установки равнозначало 2000 тоннам льда.

Ввысь со стратостатами

В предыдущих статьях мы мысленно путешествовали в земные недра, причем нам помогла формула зависимости давления воздуха от глубины. Отважимся теперь подняться вверх и, пользуясь той же формулой, посмотрим, как меняется давление воздуха на больших высотах. Формула для этого случая принимает такой вид:

$$p = 0,999^{h/8},$$

где p — давление в атмосферах, h — высота в метрах. Дробь 0,999 заменила здесь число 1,001, потому что при перемещении вверх на 8 м давление не возрастает на 0,001, а *уменьшается* на 0,001.

* См, журнал: За рубежом, 1933, № 13.

Решим для начала задачу: как высоко надо подняться, чтобы давление воздуха уменьшилось *вдвое*?

Для этого приравняем в нашей формуле давление $p = 0,5$ атм и станем искать высоту h . Получим уравнение

$$0,5 = 0,999^{h/8},$$

решить которое не составит труда для читателей, умеющих обращаться с логарифмами. Ответ $h = 5,6$ км определяет высоту, на которой давление воздуха должно уменьшиться вдвое.

Направимся теперь еще выше, вслед за отважными советскими воздухоплавателями, достигшими высоты 19 и 22 км. Эти высокие области атмосферы находятся уже в так называемой “стратосфере”. Поэтому и шарам, на которых совершаются подобные подъемы, присвоено наименование не аэростатов, а стратостатов. Не думаю, чтобы среди людей старшего поколения нашелся хотя бы один, который не слышал бы названий советских стратостатов “СССР” и “ОАХ-1”, поставивших в 1933—1934 гг. мировые рекорды высоты: первый — 19 км, второй — 22 км.

Попытаемся вычислить, каково давление атмосферы на этих высотах.

Для высоты 19 км найдем, что давление воздуха должно составлять

$$0,999^{19000/8} = 0,095 \text{ атм} = 72 \text{ мм рт. ст.}$$

Для высоты 22 км

$$0,999^{22000/8} = 0,066 \text{ атм} = 50 \text{ мм рт. ст.}$$

Однако, заглянув в записи стратонавтов, находим, что на указанных высотах отмечены были другие давления: на высоте 19 км — 50 мм рт. ст, на высоте 22 км — 45 мм рт. ст.

Почему же расчет не подтверждается? В чем наша ошибка?

Закон Бойля—Мариотта для газов при столь малом давлении применим вполне, но на этот раз мы сделали другое упущение: считали температуру воздуха одинаковой по всей 20-километровой толще, между тем как она заметно падает с высотой. В среднем принимают, что температура при поднятии на каждый километр падает на $6,5^\circ\text{C}$; так происходит до высоты 11 км, где температура равна — 56°C и далее на значительном протяжении остается неизменной. Если принять это обстоятельство во внимание (для чего уже недостаточны средства элементарной математики), полу-

чатся результаты, гораздо более согласующиеся с действительностью. По той же причине на итоги наших прежних вычислений, относящихся к давлению воздуха в глубинах, нужно тоже смотреть как на приближенные.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Веер

Когда женщины обмахиваются веерами, им, конечно, становится прохладнее. Казалось бы, занятие это вполне безвредно для остальных присутствующих в помещении, и собиравшиеся могут быть только признательны женщинам за охлаждение воздуха в зале.

Посмотрим, так ли это. Почему при обмахивании веером мы ощущаем прохладу? Воздух, непосредственно прилегающий к нашему лицу, нагревается, и эта теплая воздушная маска, невидимо облегающая наше лицо, “греет” его, т. е. замедляет дальнейшую потерю тепла. Если воздух вокруг вас неподвижен, то нагретый близ лица слой воздуха весьма медленно вытесняется вверх более тяжелым ненагретым воздухом. Когда же мы смахиваем веером с лица теплую воздушную маску, то лицо соприкасается с все новыми порциями ненагретого воздуха и непрерывно отдает им свою теплоту; тело наше остывает, и мы ощущаем прохладу.

Значит, при обмахивании веером женщины непрерывно удаляют от своего лица нагретый воздух и заменяют его ненагретым; нагретый, этот воздух удаляется в свою очередь и заменяется новой порцией ненагретого, и т. д.

Работа веером ускоряет перемешивание воздуха и способствует быстрейшему уравниванию температуры воздуха во всем зале, т. е. доставляет облегчение обладательницам веера за счет более прохладного воздуха, окружающего остальных присутствующих. Для действия веера имеет значение еще одно обстоятельство, о котором мы сейчас расскажем.

Отчего при ветре холоднее?

Все знают, конечно, что в тихую погоду мороз переносится гораздо легче, чем при ветре. Но не все представляют себе отчетливо причину этого явления. Большой холод

при ветре ощущается *лишь живыми существами*; термометр вовсе не опускается ниже, когда его обдувает ветер. Ощущение резкого холода в ветреную морозную погоду объясняется прежде всего тем, что от лица (и вообще от тела) отнимается при этом гораздо больше тепла, нежели в тихую погоду, когда воздух, нагретый телом, не так быстро сменяется новой порцией холодного воздуха. Чем ветер сильнее, тем большая масса воздуха успевает в единицу времени прийти в соприкосновение с кожей, и, следовательно, тем больше тепла отнимается от нашего тела. Этого одного уже достаточно, чтобы вызвать ощущение холода.

Но есть и еще причина. Кожа наша всегда испаряет влагу, даже в холодном воздухе. Для испарения требуется теплота; она отнимается от нашего тела и от того слоя воздуха, который к телу прилегает. Если воздух неподвижен, испарение совершается медленно, так как прилегающий к коже слой воздуха скоро насыщается парами (в насыщенном влагой воздухе не происходит интенсивного испарения). Но если воздух движется и к коже притекают все новые и новые его порции, то испарение все время поддерживается очень обильное, а это требует большого расхода теплоты, которая отбирается от нашего тела.

Как же велико охлаждающее действие ветра? Оно зависит от его скорости и от температуры воздуха; в общем оно гораздо значительнее, чем обычно думают. Приведу пример, дающий представление о том, каково бывает это понижение. Пусть температура воздуха 4°C , а ветра нет никакого. Кожа нашего тела при таких условиях имеет температуру 31°C . Если же дует легкий ветерок, едва движущий флаги и не шевелящий листья (скорость 2 м/с), то кожа охлаждается на 7°C ; при ветре, заставляющем флаг полоскаться (скорость 6 м/с), кожа охлаждается на 22°C . температура ее падает до 9°C ! Эти данные взяты из книги Н. Н. Калитина “Основы физики атмосферы в применении к медицине”; любознательный читатель найдет в ней много интересных подробностей.

Итак, о том, как будет ощущаться нами мороз, мы не можем судить по одной лишь температуре, а должны принимать во внимание также и скорость ветра. Один и тот же мороз переносится в Ленинграде в среднем хуже, чем в Москве, потому что средняя скорость ветра на берегах Балтийского моря равна $5—6\text{ м/с}$, а в Москве — только $4,5\text{ м/с}$. Еще легче переносятся морозы в Забайкалье, где средняя скорость ветра всего $1,3\text{ м}$. Знаменитые восточ-

носибирские морозы ощущаются далеко не так жестоко, как думаем мы, привыкшие в Европе к сравнительно сильным ветрам; Восточная Сибирь отличается почти полным безветрием, особенно в зимнее время.

Горячее дыхание пустыни

“Значит, ветер и в знойный день должен приносить прохладу, — скажет, быть может, читатель, прочтя предыдущую статью. — Почему же в таком случае путешественники говорят о *горячем дыхании* пустыни”?

Противоречие объясняется тем, что в тропическом климате воздух бывает *теплее, чем наше тело*. Неудивительно, что там при ветре людям становится не прохладнее, а жарче. Теплота передается там уже не от тела воздуху, а обратно — воздух нагревает человеческое тело. Поэтому, чем большая масса воздуха успевает в единицу времени прийти в соприкосновение с телом, тем сильнее ощущение жара. Правда, испарение и здесь усиливается при ветре, но первая причина перевешивает. Вот почему жители пустыни, например туркмены, носят теплые халаты и меховые шапки.

Греет ли вуаль?

Вот еще задача на физики обыденной жизни. Женщины утверждают, что вуаль греет, что без нее лицо зябнет. При взгляде на легкую ткань вуали, нередко с довольно крупными ячейками, мужчины не очень склонны верить этому утверждению и думают, что согревающее действие вуали — игра воображения.

Однако если вы вспомните сказанное выше, то отнесетесь к этому утверждению более доверчиво. Как бы крупны ни были ячейки вуали, воздух через такую ткань проходит все же с некоторым замедлением. Тот слой воздуха, который непосредственно прилегает к лицу и, нагревшись, служит теплой воздушной маской, — слой этот, удерживаемый вуалью, не так быстро сдувается ветром, как при отсутствии ее. Поэтому нет основания не верить женщинам, что при небольшом морозе и слабом ветре лицо во время ходьбы зябнет в вуали меньше, чем без нее.

Охлаждающие кувшины

Если вам не случалось видеть таких кувшинов, то, вероятно, вы слышали или читали о них. Эти сосуды из необожженной глины обладают той любопытной особенностью, что налитая в них вода становится прохладнее, чем окружающие предметы. Охлаждающие кувшины в большом распространении у южных народов (между прочим, и у нас в Крыму) и носят различные названия: в Испании— “алькарацца”, в Египте— “гоула” и т. д.

Секрет охлаждающего действия этих кувшинов прост: жидкость просачивается через глиняные стенки наружу и там медленно испаряется, отнимая при этом теплоту (“скрытую теплоту испарения”) от сосуда и заключенной в нем жидкости.

Но неверно, что жидкость в таких сосудах очень охлаждается, как приходится читать в описаниях путешествий по южным странам. Охлаждение не может быть велико. Зависит оно от многих условий. Чем знойнее воздух, тем скорее и обильнее испаряется жидкость, увлажняющая сосуд снаружи, и, следовательно, тем более охлаждается вода внутри кувшина. Зависит охлаждение и от влажности окружающего воздуха: если в нем много влаги, испарение происходит медленно, и вода охлаждается незначительно; в сухом воздухе, напротив, происходит энергичное испарение, вызывающее более заметное охлаждение. Ветер также ускоряет испарение и тем способствует охлаждению; это все хорошо знают по тому ощущению холода, которое приходится испытывать в мокром платье в теплый, но ветреный день. Понижение температуры в охлаждающих кувшинах не превышает 5 °С. В знойный южный день, когда термометр показывает подчас 33 °С, вода в охлаждающем кувшине имеет температуру теплой ванны (28 °С). Охлаждение, как видим, практически бесполезное. Зато кувшины хорошо сохраняют *холодную воду*; для этой цели их преимущественно и употребляют.

Мы можем попытаться вычислить степень охлаждения воды в “алькараццах”.

Пусть у нас имеется кувшин, вмещающий 5 л воды; допустим, что 1/10 л испарилась. Для испарения 1 л (1 кг) воды требуется при температуре 33 °С около 580 ккал (2430 кДж). У нас испарилась 1/10 л, следовательно, понадобилось 58 ккал. Если бы вся эта теплота заимствовалась только от воды,

которая находится в кувшине, температура последней понизилась бы на 58/5, т. е. 12 °С. Но большая часть тепла, потребного для испарения, отнимается от стенок самого кувшина и от окружающего его воздуха; с другой стороны, рядом с охлаждением воды в кувшине происходит и нагревание ее теплым воздухом, прилегающим к кувшину. Поэтому охлаждение воды едва достигает половины полученной выше цифры.

Трудно сказать, где кувшин охлаждается больше, — на солнце или в тени. На солнце ускоряется испарение, но вместе с тем усиливается и приток тепла. Лучше всего, вероятно, держать охлаждающие кувшины в тени на слабом ветре.

“Ледник” без льда

На охлаждении от испарения основано устройство охлаждающего шкафа для хранения продуктов, своего рода “ледника” без льда. Устройство такого охладителя весьма несложно: это ящик из дерева (лучше из оцинкованного железа) с полками, на которые кладут подлежащие охлаждению продукты. Вверху ящика ставится длинный сосуд с чистой холодной водой; в сосуд погружен край холста, который идет вдоль задней стенки ящика вниз, кончаясь в сосуде, помещенном под нижней полкой. Холст пропитывается водой, которая, как по фитилю, все время движется через него, медленно испаряясь и тем самым охлаждая все отделения “ледника” без льда.

Такой “ледник” следует ставить в прохладное место квартиры и каждый вечер менять в нем холодную воду, чтобы она успела за ночь хорошо остудиться. Сосуды, содержащие воду, и холст, пропитываемый ею, должны быть, конечно, совершенно чисты.

Какую жару способны мы переносить?

Человек гораздо выносливее по отношению к жаре, чем обычно думают: он способен переносить в южных странах температуру заметно выше той, какую мы в умеренном поясе считаем едва переносимой. Летом в Средней Австралии нередко наблюдается температура 46 °С в тени, там отмечались даже температуры 55 °С в тени. При переходе через Красное море в Персидский залив температура в корабельных помещениях достигает 50 °С и выше, несмотря на непрерывную вентиляцию.

Наиболее высокие температуры, наблюдавшиеся в природе на земном шаре, не превышали 57 °С. Температура эта установлена в так называемой “Долине Смерти” в Калифорнии. Зной в Средней Азии— самом жарком месте Советского Союза— не бывает выше 50 °С.

Отмеченные сейчас температуры измерялись *в тени*. Объясню кстати, почему метеоролога интересует температура именно в тени, а не на солнце. Дело в том, что температуру *воздуха* измеряет только термометр, выставленный в тени. Градусник, помещенный на солнце, может нагреться его лучами значительно выше, чем окружающий воздух, и показание его несколько не характеризует теплового состояния воздушной среды. Поэтому и нет смысла, говоря о знойной погоде, ссылаться на показание термометра, выставленного на солнце.

Производились опыты для определения высшей температуры, какую может выдержать человеческий организм. Оказалось, что при весьма постепенном нагревании организм наш *в сухом воздухе* способен выдержать не только температуру кипения воды (100 °С), но иногда даже еще более высокую, до 160 °С, как доказали английские физики Благден и Чентри, проводившие ради опыта целые часы в натопленной печи хлебопекарни. “Можно сварить яйца и изжарить бифштекс в воздухе помещения, в котором люди остаются без вреда для себя”, — замечает по этому поводу Тиндаль.

Чем же объясняется такая выносливость? Тем, что организм наш фактически не принимает этой температуры, а сохраняет температуру, близкую к нормальной. Он борется с нагреванием посредством обильного выделения пота; испарение пота поглощает значительное количество тепла из того слоя воздуха, который непосредственно прилегает к коже, и тем в достаточной мере понижает его температуру. Единственные необходимые условия состоят в том, чтобы тело не соприкасалось непосредственно с источником тепла и чтобы воздух был сух.

Кто бывал в Средней Азии, тот замечал, без сомнения, как сравнительно легко переносится там жара в 37 °С и более. 24-градусная жара в Ленинграде переносится гораздо хуже. Причина, конечно, во влажности воздуха в Ленинграде и сухости его в Средней Азии, где дождь— явление крайне редкое*.

* Любопытно, что там мой карманный гигрометр дважды в июне показал *нуль влажности* (13 и 16 июня 1930 г.).

Термометр или барометр?

Известен анекдот о наивном человеке, который не решался принять ванну по следующей необыкновенной причине:

— Я сунул в ванну барометр, а он показал бурю... Опасно купаться!

Но не думайте, что всегда легко отличить термометр от барометра. Есть такие термометры, вернее, термоскопы, которые с не меньшим правом могли бы называться барометрами, и наоборот. Примером может служить старинный термоскоп, придуманный Героном Александрийским (рис. 85). Когда солнечные лучи нагревают шар, воздух в верхней части шара, расширяясь, давит на воду и вытесняет ее по изогнутой трубке наружу; вода начинает капать из конца трубки в воронку, откуда стекает в нижний ящик. В холодную же погоду, напротив, упругость воздуха в шаре уменьшается и вода из нижнего ящика вытесняется давлением наружного воздуха по прямой трубке в шар.




Рис. 85. Термоскоп Герона Александрийского.

Однако прибор этот чувствителен и к изменениям барометрического давления: когда наружное давление ослабевает, воздух внутри шара, сохранивший прежнее более высокое давление, расширяется и вытесняет часть воды по трубке в воронку; при повышении же наружного давления часть воды из ящика вгоняется в шар вследствие большего давления снаружи. Разница температуры в один градус вызовет такое же изменение в объеме воздуха внутри шара, как 760/273, т. е. около 2,5 мм разницы в высоте (ртутного) барометрического столба. В Москве барометрические колебания достигают 20 мм и более, что соответствует 8 °С в термоскопе Герона Александрийского, — значит, такое падение атмосферного давления легко принять за повышение температуры на 8 °С!

Вы видите, что старинный термоскоп в не меньшей мере является и бароскопом. Одно время в продаже имелись у нас водяные барометры, которые являлись в такой же

степени и термометрами, об этом, однако, не подозревали не только покупатели, но, кажется, и их изобретатель.

Для чего служит ламповое стекло?

Мало кто знает о том, какой долгий путь прошло ламповое стекло. Длинный ряд тысячелетий люди пользовались для освещения пламенем, не прибегая к услугам стекла. Понадобился гений Леонардо да Винчи (1452— 1519), чтобы сделать это важное усовершенствование лампы. Но Леонардо окружил пламя не стеклянной, а металлической трубой; прошло еще три века, прежде чем додумались до замены металлической трубы прозрачным стеклянным цилиндром. Как видите, ламповое стекло— изобретение, над которым работали десятки поколений.

Каково же его назначение?

Едва ли у всех готов правильный ответ на столь естественный вопрос. Защищать пламя от ветра— лишь второстепенная роль стекла. Главное же действие его— в увеличении *яркости* пламени, в ускорении процесса горения. Роль стекла та же, что и печной или заводской трубы: оно усиливает приток воздуха к пламени, усиливает “тягу”.

Разберемся в этом. Столб воздуха, находящийся внутри стекла, нагревается пламенем гораздо быстрее, нежели воздух, окружающий лампу. Нагревшись и сделавшись поэтому легче, воздух по закону Архимеда выталкивается вверх более тяжелым ненагретым воздухом, который поступает снизу, через отверстия в горелке. Таким образом устанавливается постоянное течение воздуха снизу вверх, течение, непрерывно отводящее продукты горения и приносящее свежий воздух. Чем стекло выше, тем больше разница в весе нагретого и ненагретого столба воздуха и тем энергичнее происходит приток свежего воздуха, а следовательно, ускоряется горение. Здесь имеет место то же самое, что и в высоких заводских трубах. Поэтому эти трубы делаются столь высокими ¹.

Интересно, что уже Леонардо да Винчи отчетливо представлял себе эти явления. В его рукописях находим такую запись: “Где появляется огонь, там вокруг него образуется воздушное течение: оно его поддерживает и усиливает”

Почему пламя не гаснет само собой?

Если вдуматься хорошенько в процесс горения, то невольно возникает вопрос: отчего пламя не гаснет само собой? Ведь продуктами горения являются углекислый газ и водяной пар — вещества *негорючие*, неспособные поддерживать горение. Следовательно, пламя с первого же момента горения должно быть окружено негорючими веществами, которые мешают притоку воздуха; без воздуха горение продолжаться не может, и пламя должно погаснуть.

Почему же этого не происходит? Почему горение длится непрерывно, пока есть запас горючего вещества? Только потому, что газы расширяются от нагревания и, следовательно, *становятся легче*. Лишь благодаря этому нагретые продукты горения не остаются на месте своего образования, в непосредственном соседстве с пламенем, а немедленно вытесняются вверх чистым воздухом. Если бы закон Архимеда не распространялся на газы (или если бы не было силы тяжести), всякое пламя, погоревши немного, гасло бы само собой.

Весьма легко убедиться в том, как губительно действуют на пламя продукты его горения. Вы нередко пользуетесь этим, сами того не подозревая, чтобы загасить огонь в лампе. Как задуваете вы керосиновую лампу? Дуете в нее сверху, т. е. гоните вниз, к пламени, негорючие продукты его горения; и оно гаснет, лишенное свободного доступа воздуха.

Недостающая глава в романе Жюль Верна

Жюль Верн подробно поведал нам, как проводили время трое смельчаков внутри снаряда, мчащегося на Луну. Однако он не рассказал о том, как Мишель Ардан исполнял обязанности повара в этой необычной обстановке. Вероятно, романист полагал, что стряпня внутри летящего снаряда не представляет ничего такого, что заслуживало бы описания. Если так, то он ошибался. Дело в том, что внутри летящего снаряда все предметы *становятся невесомыми** Жюль Верн упустил из виду это обстоятельство. А согласитесь, что стряпня в невесомой кухне — сюжет, вполне достойный пера романиста, и надо только пожалеть, что талантливый автор “Путешествия на Луну” не уделил

* Подробное разъяснение этого интересного обстоятельства приведено в первой книге “Занимательная физика”, а также в моих книгах “Межпланетные путешествия”, “К звездам на ракете” и “Ракетой на Луну”

внимания этой теме. Попытаюсь восполнить недостающую главу в романе, чтобы дать читателю некоторое представление о том, насколько эффектно могла бы вылиться она из-под пера самого Жюль Верна.

При чтении этой статьи читатель должен все время не упускать из виду, что внутри снаряда, как уже сказано, *нет силы тяжести*: все предметы в нем *невесомы*.

Завтрак в невесомой кухне²

— Друзья мои, ведь мы еще не завтракали,— объявил Мишель Ардан своим спутникам по межпланетному путешествию.— Из того, что мы потеряли свой вес в пушечном снаряде, не следует вовсе, что мы потеряли и аппетит. Я берусь устроить вам, друзья мои, невесомый завтрак, который, без сомнения, будет состоять из самых легких блюд, когда-либо изготовлявшихся на свете.

И, не ожидая ответа товарищей, француз принялся за стряпню.

— Наша бутылка с водой притворяется пустой! — ворчал про себя Ардан, возясь с раскупоркой большой бутылки.— Не проведешь меня: я ведь знаю, отчего ты легкая... Так, пробка вынута. Изволь излить в кастрюлю свое невесомое содержимое!

Но сколько ни наклонял он бутылки, вода не выливалась.

— Не трудись, милый Ардан,— явился на выручку Николь.— Пойми, что в нашем снаряде, где нет тяжести, вода не может *литься*. Ты должен ее *вытрясти* из бутылки, как если бы это был густой сироп.

Не долго думая, Ардан хлопнул ладонью по дну опрокинутой бутылки. Новая неожиданность: у горлышка тотчас же раздулся водяной шар, величиной с кулак.

— Что стало с нашей водой? — изумился Ардан.— Вот, признаюсь, совсем излишний сюрприз! Объясните же, ученые друзья мои, что тут произошло?

— Это *капля*, милый Ардан, простая водяная капля. В мире без тяжести капли могут быть как угодно велики... Вспомни, что ведь жидкости только под влиянием тяжести принимают форму сосудов, льются в виде струй т. д. Здесь же нет тяжести, жидкость предоставлена своим внутренним молекулярным силам и должна принять форму шара, как масло в знаменитом опыте Плато.

— Мне никакого дела нет до этого Плато с его опытами! Я должен вскипятить воду для бульона, и, клянусь, никакие молекулярные силы не остановят меня! — запальчиво объявил француз.

Он яростно принялся вытряхивать воду над парящей в воздухе кастрюлей, но, по-видимому, все было в заговоре против него. Большие водяные шары, достигнув кастрюли, быстро расползались по ее поверхности. Этим дело не кончилось: с внутренних стенок вода переходила на наружные, растекалась по ним,— и вскоре кастрюля оказалась окутанной толстым водяным слоем. Кипятить воду в таком виде не было никакой возможности.

— Вот любопытный опыт, доказывающий, как велика сила сцепления,— спокойно говорил взбешенному Ардану невозмутимый

Николь.— Ты не волнуйся: ведь здесь обыкновенное смачивание жидкостями твердых тел; только в данном случае тяжесть не мешает развиваться этому явлению с полной силой.

— И очень жаль, что не мешает! — возразил Ардан.— Смачивание здесь или что-либо другое, но мне необходимо иметь воду *внутри* кастрюли, а не *вокруг* нее. Вот еще новости какие! Ни один повар в мире не согласится готовить бульон при подобных условиях!

— Ты легко можешь воспрепятствовать смачиванию, если оно так мешает тебе, — успокоительно вставил м-р Барбикен.— Вспомни, что вода не смачивает тел, покрытых хотя бы тонким слоем жира. Обмажь свою кастрюлю снаружи жиром, и ты удержишь воду внутри нее.

— Браво! Вот это я называю истинной ученостью, — обрадовался Ардан, приводя совет в исполнение. Затем он приступил к нагреванию воды на пламени газовой горелки.

Положительно все складывалось против Ардана. Газовая горелка — и та закопризничала: прогорев полминуты тусклым пламенем, она погасла по необъяснимой причине.

Ардан возился вокруг горелки, терпеливо нянчился с пламенем, но хлопоты не приводили ни к чему: пламя отказывалось гореть.

— Барбикен! Николь! Неужели же нет средства заставить это упрямое пламя гореть так, как полагается ему по законам вашей физики и по уставам газовых компаний? — взывал к друзьям обескураженный француз.

— Но здесь нет ничего необычайного и ничего неожиданного, — объяснил Николь.— Это пламя горит именно так, как полагается согласно физическим законам. А газовые компании... я думаю, они все разорились бы, если бы не было тяжести. При горении, ты знаешь, образуются углекислота, водяной пар, словом, газы негорючие; обыкновенно эти продукты горения не остаются возле самого пламени: как теплые и, следовательно, более легкие, они вытесняются притекающим свежим воздухом. Но тут у нас нет тяжести, — поэтому продукты горения остаются на месте возникновения, окружают пламя слоем негорючих газов и преграждают доступ свежему воздуху. Оттого-то пламя так тускло здесь горит и так быстро гаснет. Ведь действие огнетушителей на том и основано, что пламя окружается негорючим газом.

— Значит, по-твоему, — перебил француз, — если бы на Земле не было тяжести, то не было бы и пожарных команд: пожар погас бы сам собой, задышался бы в собственном дыхании?

— Совершенно верно. А пока, чтобы помочь делу, зажги еще раз горелку и давай обдувать пламя. Нам, я надеюсь, удастся создать искусственную тягу и заставить пламя гореть “по-земному”.

Так и сделали. Ардан снова зажег горелку и принялся за стряпню, не без злорадства следя за тем, как Николь с Барбикеном поочередно обдували и обмахивали пламя, чтобы непрерывно вводить в него свежий воздух. В глубине души француз считал своих друзей и их науку виновниками “всей этой кутерьмы”.

— Вы в некотором роде исполняете обязанности фабричной трубы, поддерживая тягу, — тараторил Ардан.— Мне очень жаль вас, ученые

друзья мои, но если мы хотим иметь горячий завтрак, придется подчиниться велениям вашей физики.

Однако прошло четверть часа, полчаса, час, а вода в кастрюле и не думала закипать.

— Тебе придется вооружиться терпением, милый Ардан. Видишь ли, обыкновенная, весомая вода быстро нагревается — почему? Только потому, что в ней происходит перемешивание слоев: нагретые нижние слои, более легкие, вытесняются холодными сверху, и в результате вся жидкость быстро принимает высокую температуру. Случалось тебе когда-либо нагревать воду не снизу, а сверху? Тогда перемешивания слоев не происходит, потому что верхние нагретые слои остаются на месте. Теплопроводность же воды ничтожна; верхние слои можно даже довести до кипения, в то время как в нижних будут находиться куски нерастаявшего льда. Но в нашем невесомом мире безразлично, откуда нагревать воду: круговорота в кастрюле возникать не может, и вода должна нагреваться очень медленно. Если желаешь ускорить нагревание, ты должен все время перемешивать воду.

Николь предупредил Ардана, чтобы он не доводил воду до 100 °С, а ограничился несколько пониженной температурой. При 100 °С образуется много пара, который, обладая здесь удельным весом, одинаковым с удельным весом воды (оба равны нулю), будет смешиваться с ней в однородную пену.

Досадная неожиданность произошла с горохом. Когда Ардан, развязав мешочек, слегка потряхнул его, горошины рассеялись в воздухе и стали безостановочно бродить внутри каюты, ударяясь о стенки и отскакивая от них. Эти витающие горошины чуть не наделали большой беды: Николь нечаянно вдохнул одну из них и так раскашлялся, что едва не задохнулся. Чтобы избавиться от такой опасности и очистить воздух, друзья наши принялись усердно вылавливать летающие горошины тем сачком, который Ардан предусмотрительно захватил с собой “для сбора коллекции лунных бабочек”.

Нелегко было стряпать при таких условиях. Ардан был прав, когда утверждал, что здесь спасовал бы самый искусный повар. Немало пришлось повозиться и при жарении бифштекса: надо было все время придерживать мясо вилкой, иначе упругие пары масла, образующиеся под бифштексом, выталкивали его из кастрюли, и недожаренное мясо летело “вверх”, — если можно употребить это слово там, где не было ни “верха”, ни “низа”.

Странную картину представлял и сам обед в этом мире, лишенном тяжести. Друзья висели в воздухе в весьма разнообразных позах, не лишенных, впрочем, живописности, и поминутно стукались головами друг о друга. Сидеть, конечно, не приходилось. Такие вещи, как стулья, диваны, скамьи — совершенно бесполезны в мире, где нет тяжести. В сущности, и стол был здесь не нужен, если бы не настойчивое желание Ардана завтракать непременно “за столом”.

Трудно было сварить бульон, но еще труднее оказалось съесть его. Начать с того, что разлить невесомый бульон по чашкам никак не удавалось. Ардан чуть не поплатился за такую попытку потерей трудов целого утра; забыв, что бульон невесом, он с досадой ударил по дну

перевернутой кастрюли, чтобы изгнать из нее упрямый бульон. В результате из кастрюли вылетела огромная шарообразная капля—бульон в сфероидальной форме. Ардану понадобилось проявить искусство жонглера, чтобы вновь поймать и водворить в кастрюлю с таким трудом сваренный бульон.

Попытка пользоваться ложками осталась безрезультатной: бульон смачивал всю ложку до самых пальцев и висел на ней сплошной пленой. Обмазали ложки маслом, чтобы предупредить смачивание, но дело от этого не стало лучше: бульон превратился на ложке в шарик, и не было никакой возможности благополучно донести эту невесомую пилюлю до рта.

В конце концов Николь нашел решение задачи: сделали трубки из восковой бумаги и с помощью их пили бульон, втягивая его в рот. Таким же способом приходилось нашим друзьям во время путешествия пить воду, вино и вообще всякие жидкости*.

Почему вода гасит огонь?

На столь простой вопрос не всегда умеют правильно ответить, и читатель, надеемся, не посетует на нас, если мы объясним вкратце, в чем, собственно, заключается это действие воды на огонь.

Во-первых, прикасаясь к горящему предмету, вода превращается в пар, отнимая при этом много теплоты у горящего тела; чтобы превратить крутой кипяток в пар, нужно впятеро с лишком больше теплоты, чем для нагревания того же количества холодной воды до 100 °С.

Во-вторых, пары, образующиеся при этом, занимают объем, в сотни раз больший, чем породившая их вода; окружая горящее тело, пары оттесняют воздух, а без воздуха горение невозможно.

Чтобы увеличить “огнегасительную” силу воды, иногда примешивают к ней... порох! Это может показаться странным, однако это вполне разумно: порох быстро сгорает,

* Многие читатели этой книги выражали свое недоумение по поводу того, как можно пить в среде без тяжести— даже по способу, указанному сейчас: ведь воздух в летящем снаряде невесом, следовательно, не производит давления, а при отсутствии давления нельзя пить, всасывая в себя жидкость. Станным образом, возражение это высказывалось и в печати некоторыми рецензентами. Между тем вполне очевидно, что невесомость воздуха при данных условиях несколько не связана с отсутствием давления: воздух давит в замкнутом пространстве. вовсе не потому, что он весом, а потому, что, как тело газообразное, он стремится безгранично расшириться. В *открытом* пространстве на земной поверхности роль стенок, препятствующих расширению, играет *тяжесть*; эта привычная зависимость и **ввела в заблуждение** моих критиков.

выделяя большое количество негорючих газов, которые, окружая собой горящие предметы, затрудняют горение.

Как тушат огонь с помощью огня?

Вы слышали, вероятно, что лучшее, а иной раз и единственное средство борьбы с лесным или степным пожаром — это поджигание леса или степи с противоположной стороны. Новая пламя идет навстречу бушующему морю огня и, уничтожая горючий материал, лишает огонь пищи; встретившись, обе огненные стены мгновенно гаснут, словно пожрав друг друга (рис. 86).



Рис. 86. Тушение степного пожара огнем.

Описание того, как пользовались этим приемом тушения огня при пожаре американских степей, многие, конечно, читали у Купера в романе “Прерия”. Можно ли забыть тот драматический момент, когда старик траппер спас от огненной смерти путников, застигнутых в степи пожаром? Вот это место из “Прерии”:

“Старик внезапно принял решительный вид.

— Настало время действовать, — сказал он.

— Вы слишком поздно спохватились, жалкий старик! — крикнул Миддлтон. — Огонь на расстоянии четверти мили от нас, и ветер несет его к нам с ужасающей быстротой!

— Вот как! Огонь! Не очень-то я боюсь его. Ну, молодцы, полно! Приложите-ка руки к этой высохшей траве и обнажите землю.

В очень короткое время было очищено место футов в двадцать в диаметре. Траппер вывел женщин на один край этого небольшого

пространства, сказав, чтобы они прикрыли одеялами свои платья, легко могущие воспламениться. Приняв эти предосторожности, старик подошел к противоположному краю, где стихия окружила путников высоким, опасным кольцом, и, взяв щепотку самой сухой травы, положил ее на полку ружья и поджег. Легко воспламеняющееся вещество вспыхнуло сразу. Тогда старик бросил плававшую траву в высокую заросль и, отойдя к центру круга, стал терпеливо ожидать результата своего дела.

Разрушительная стихия с жадностью набросилась на новую пищу, и в одно мгновение пламя стало лизать траву.

— Ну, — сказал старик, — теперь вы увидите, как огонь сразит огонь.

— Но неужели это не опасно? — воскликнул удивленный Миддлтон. — Не приближаете ли вы к нам врага, вместо того чтобы отдалять его?

Огонь, все увеличиваясь, начал распространяться в три стороны, замирая на четвертой вследствие недостатка пищи. По мере того как огонь увеличивался и бушевал все сильнее и сильнее, он очищал перед собой все пространство, оставляя черную дымящуюся почву гораздо более обнаженной, чем если бы трава на этом месте была скошена косой.

Положение беглецов стало бы еще рискованнее, если бы очищенное ими место не увеличивалось по мере того, как пламя окружало его с остальных сторон.

Через несколько минут пламя стало отступать во всех направлениях, оставляя людей окутанными облаком дыма, но в полной безопасности от потока огня, продолжавшего бешено нестись вперед.

Зрители смотрели на простое средство, употребленное траппером, с тем же изумлением, с каким, как говорят, царедворцы Фердинанда смотрели на способ Колумба поставить яйцо".

Этот прием тушения степных и лесных пожаров не так, однако, прост, как кажется с первого взгляда. Пользоваться встречным огнем для тушения пожара должен лишь человек очень опытный, — иначе бедствие может даже усилиться.

Вы поймете, какая для этого нужна сноровка, если зададите себе вопрос: почему огонь, зажженный траппером, побежал навстречу пожару, а не в обратном направлении? Ведь ветер дул со стороны пожара и гнал огонь на путников! Казалось бы, пожар, причиненный траппером, должен был направиться не навстречу огненному морю, а назад по степи. Если бы так случилось, путники оказались бы окруженными огненным кольцом и неминуемо погибли бы.

В чем заключался секрет траппера?

В знании простого физического закона. Хотя ветер дул по направлению от горящей степи к путникам, — *но впереди, близ огня*, должно было существовать обратное течение воздуха, *навстречу* пламени. В самом деле: нагреваясь над морем огня, воздух становится легче и вытесняется вверх

притекающим со всех сторон свежим воздухом со степи, не затронутой пламенем. Близ границы огня устанавливается поэтому *тяга воздуха навстречу пламени*. Зажечь встречный огонь необходимо в тот момент, когда пожар приблизится достаточно, чтобы ощутилась тяга воздуха. Вот почему траппер не спешил приниматься за дело раньше времени, а спокойно ждал нужного момента. Стоило поджечь траву немного раньше, когда встречная тяга еще не установилась, — и огонь распространился бы в обратном направлении, сделав положение людей безвыходным. Но и промедление могло быть не менее роковым: огонь подошел бы чересчур близко.

Можно ли воду вскипятить кипятком?

Возьмите небольшой пузырек (баночку или колбу), налейте в него воды и поместите в стоящую на огне кастрюлю с чистой водой так, чтобы склянка не касалась дна кастрюли; вам придется, конечно, подвесить этот пузырек на проволочной петле. Когда вода *в кастрюле* закипит, то, казалось бы, вслед за тем должна закипеть и вода в пузырьке. Можете, однако, ждать, сколько вам угодно, — вы не дождетесь этого: вода в пузырьке будет горяча, очень горяча, но кипеть она не будет. Кипяток оказывается недостаточно горячим, чтобы вскипятить воду.

Результат как будто неожиданный, между тем его надо было предвидеть. Чтобы довести воду до кипения, недостаточно только нагреть ее до 100°C : надо еще сообщить ей значительный запас тепла для того, чтобы перевести воду в другое агрегатное состояние, а именно в пар.

Чистая вода кипит при 100°C ; выше этой точки ее температура при обычных условиях не поднимается, сколько бы мы ее ни нагревали. Значит, источник теплоты, с помощью которого мы нагреваем воду в пузырьке, имеет температуру 100°C ; он может довести воду в пузырьке также только до 100°C . Когда наступит это равенство температур, *дальнейшего перехода тепла от воды кастрюли к пузырьку не будет*.

Итак, нагревая воду в пузырьке таким способом, мы не можем доставить ей того избытка теплоты, который необходим для перехода воды в пар (каждый грамм воды, нагретый до 100°C , требует еще свыше 500 кал, чтобы перейти в пар). Вот почему вода в пузырьке хотя и нагревается, но не кипит.

Может возникнуть вопрос: чем же отличается вода в пузырьке от воды в кастрюле? Ведь в пузырьке та же вода,

только отделенная от остальной массы стеклянной перегородкой. Почему же не происходит с ней того же, что и с остальной водой?

Потому что перегородка мешает воде пузырька участвовать в тех течениях, которые перемешивают всю воду в кастрюле. Каждая частица воды в кастрюле может непосредственно коснуться нагретого дна, вода же пузырька соприкасается только с кипятком.

Итак, мы видели, что чистым кипятком вскипятить воду нельзя. Но стоит в кастрюлю всыпать горсть соли, и дело меняется. Соленая вода кипит не при 100 °С, а немного выше и, следовательно, может в свою очередь довести до кипения чистую воду в стеклянном пузырьке.

Можно ли вскипятить воду снегом?

“Если уж кипяток для этой цели непригоден, то что говорить о снеге!” — ответит иной читатель. Не торопитесь с ответом, а лучше сделайте опыт хотя бы с тем же стеклянным флаконом, который вы только что употребляли.

Налейте в него воды до половины и погрузите в кипящую *соленую* воду. Когда вода во флаконе закипит, выньте его из кастрюли и быстро закупорьте заранее приготовленной пробкой. Теперь переверните флакон и ждите, пока кипение внутри него прекратится. Выждав этот момент, облейте флакон кипятком, — вода не закипит. Но положите на его донышко немного снега или даже просто облейте его холодной водой, как показано на рис. 87, — и вы увидите, что вода закипит... Снег сделал то, чего не мог сделать кипяток!

Это тем более загадочно, что на ощупь флакон не будет особенно горяч. Между тем вы собственными глазами видите, как вода в нем кипит!

Разгадка в том, что снег охладил стенки флакона; вследствие этого пар внутри сгустился в водяные капли. А так как воздух из стеклянного флакона был выгнан еще при кипячении, то теперь вода подвержена в нем гораздо меньшему давлению. Но известно, что при уменьшении давления на жидкость она кипит при температуре более низкой. Мы имеем, следовательно, в нашем флаконе хотя и кипяток, но *кипяток негорячий*.

Если стенки флакона очень тонки, то внезапное сгущение паров внутри него может вызвать нечто вроде взрыва; давление внешнего воздуха, не встречая достаточного противодействия изнутри флакона, способно раздавить его (вы

видите, между прочим, что слово “взрыв” здесь неуместно). Лучше брать поэтому склянку круглую (колбу с выпуклым дном), чтобы воздух давил на свод.




Рис. 87. Закипание воды во флаконе, обливаемом холодной водой.




Рис. 88. Неожиданный результат охлаждения жестянки.

Всего безопаснее производить подобный опыт с жестяной для керосина, масла и т. п. Вскипятите в ней немного воды, завинтите плотно пробку и облейте посуду холодной водой. Тотчас же жестянка с паром сплющится давлением наружного воздуха, так как пар внутри нее превратится при охлаждении в воду. Жестянка будет измята давлением воздуха, словно по ней ударили тяжелым молотом (рис. 88).

“Суп из барометра”

В книге “Странствования за границей” американский юморист Марк Твен рассказывает об одном случае своего альпийского путешествия—случае, разумеется, вымышленном (рис. 89):

“Неприятности наши кончились; поэтому люди могли отдохнуть, а у меня, наконец, явилась возможность обратить внимание на научную сторону экспедиции. Прежде всего я хотел определить посредством барометра высоту места, где мы находились, но, к сожалению, не получил никаких результатов. Из моих научных чтений я знал, что не то термометр, не то барометр следует кипятить для получения показаний. Который именно из двух,—я не знал наверное и потому решил прокипятить оба.

И все-таки не получил никаких результатов. Осмотрев оба инструмента, я увидел, что они вконец испорчены: у барометра была только одна медная стрелка, а в шарике термометра болтался комок ртути...

Я отыскал другой барометр; он был совершенно новый и очень хороший. Полчаса кипятил я его в горшке с бобовой похлебкой, которую варил повар. Результат получился неожиданный: инструмент совершенно перестал действовать, но суп приобрел такой сильный привкус барометра, что главный повар — человек очень умный — изменил его название в списке кушаний. Новое блюдо заслужило всеобщее одобрение, так что я приказал готовить каждый день суп из барометра. Конечно, барометр был совершенно испорчен, но я не особенно жалел о нем. Раз он не помог мне определить высоту местности, значит, он больше мне не нужен".




Рис. 89. "Ученые изыскания" Марка Твена.

Отбросив шутки, постараемся ответить на вопрос: что же в самом деле следовало "кипятить", термометр или барометр?

Термометр, и вот почему.

Из предыдущего опыта мы видели, что чем меньше давление на воду, тем ниже температура ее кипения. Так как с поднятием в горы атмосферное давление уменьшается, то должна вместе с тем понижаться и температура кипения воды. И действительно, наблюдаются следующие температуры кипения чистой воды при различных давлениях атмосферы:

Температура кипения, °C	101	100	98	96	94	92	90	88	86
Давление, мм рт. ст.	787,7	760	707	657,5	611	567	525,5	487	450

В Берне (Швейцария), где среднее давление атмосферы 713 мм рт. ст., вода в открытых сосудах кипит уже при 97,5 °C, а на вершине Монблана, где барометр показывает 424 мм рт. ст., кипяток имеет температуру всего 84, 5 °C. С поднятием на каждый километр температура кипения воды падает на 3 °C. Значит, если мы измерим температуру, при которой кипит вода (по выражению Твена, если "будем кипятить термометр"), то, *справившись в соответствующей таблице*, сможем узнать высоту места. Для этого необходимо, конечно, иметь в распоряжении заранее составленные таблицы, о чем Марк Твен "просто" забыл.

Употребляемые для этой цели приборы—гипсотермометры³—не менее удобны для переноски, чем металлические барометры, и дают гораздо более точные показания.

Разумеется, и барометр может служить для определения высоты места, так как он прямо, без всякого “кипячения”, показывает давление атмосферы: чем выше мы поднимаемся, тем давление меньше. Но и тут необходимы либо таблицы, показывающие, как уменьшается давление воздуха по мере поднятия над уровнем моря, либо знание соответствующей формулы. Все это будто бы смешалось в голове юмориста и побудило его “варить суп из барометра”.

Всегда ли кипятки горяч?

Бравый ординарец Бен-Зуф, с которым читатель, без сомнения, познакомился по роману Жюль Верна “Гектор Сервадак”, был твердо убежден, что кипятки всегда и всюду одинаково горяч. Вероятно, он думал бы так всю жизнь, если бы случаю не угодно было забросить его, вместе с командиром Сервадаком, на... комету. Это капризное светило, столкнувшись с Землей, отрезало от нашей планеты как раз тот участок, где находились оба героя, и унесло их далее по своему эллиптическому пути. И вот тогда-то ординарец впервые убедился на собственном опыте, что кипятки вовсе не всюду одинаково горяч. Сделал он это открытие неожиданно, готовя завтрак.

“Бен-Зуф налил воды в кастрюлю, поставил ее на плиту и ждал, когда закипит вода, чтобы опустить в нее яйца, которые казались ему пустыми, так они мало весили.

Менее чем через две минуты вода уже закипела.

— Черт побери! Как огонь греет теперь! — воскликнул Бен-Зуф.

— Не огонь греет сильнее, — ответил, подумав, Сервадак, — а вода закипает скорее.

И, сняв со стены термометр Цельсия, он опустил его в кипящую воду.

Градусник показал только шестьдесят шесть градусов.

— Ого! — воскликнул офицер. — Вода кипит при шестидесяти шести градусах вместо ста!

— Итак, капитан? ...

— Итак, Бен-Зуф, советую тебе продержать яйца в кипятке четверть часа.

— Но они будут крутые!

— Нет, дружище, они будут едва сварены.

Причиной этого явления было, очевидно, уменьшение высоты атмосферной оболочки. Воздушный столб над поверхностью почвы

уменьшился приблизительно на одну треть, и вот почему вода, подверженная меньшему давлению, кипела при шестидесяти шести градусах вместо ста. Подобное же явление имело бы место на горе, высота которой достигает 11000 м. И если бы у капитана был барометр, он указал бы ему это уменьшение воздушного давления”

Наблюдения наших героев мы не станем подвергать сомнению: они утверждают, что вода кипела при 66°C , и мы примем это как факт. Но весьма сомнительно, чтобы они могли чувствовать себя хорошо в той разреженной атмосфере, в которой они находились.

Автор “Гектора Сервадака” совершенно правильно замечает, что подобное явление наблюдалось бы на высоте 11000 м: там вода, как видно из расчета*, действительно должна кипеть при 66°C . Но давление атмосферы при этом должно быть равно 190 мм рт. ст., ровно вчетверо меньше нормального. В воздухе, разреженном до такой степени, почти невозможно дышать! Ведь речь идет о высотах, находящихся уже в стратосфере! Мы внаем, что летчики, достигавшие такой высоты без масок, лишались сознания от недостатка воздуха, а между тем Сервадак и его ординарец чувствовали себя сносно. Хорошо, что у Сервадака под рукой не оказалось барометра: иначе романисту пришлось бы заставить этот инструмент показывать не ту цифру, которую он должен был бы показать согласно законам физики.

Если бы ваши герои попали не на воображаемую комету, а, например, на Марс, где атмосферное давление не превышает $60\text{—}70$ мм рт. ст.⁴, им пришлось бы пить еще менее горячий кипяток — всего в 45°C !

Наоборот, очень горячий кипяток можно получить на дне глубоких шахт, где давление воздуха значительно больше, чем на поверхности Земли. В шахте глубиной 300 м вода кипит при 101°C , на глубине 600 м — при 102°C .

При значительно повышенном давлении закипает вода и в котле паровой машины. Например, при 14 атм вода закипает при 200°C . Напротив, под колоколом воздушного насоса можно заставить бурно кипеть воду при обыкновенной комнатной температуре, получая “кипяток” всего в 20°C ⁵.

* В самом деле, если, как мы сказали в предыдущей статье, точка кипения воды падает на 3°C с поднятием на каждый километр, то для понижения температуры кипения до 66°C нужно подняться на $34 : 3 \approx 11$ км.

Горячий лед

Сейчас шла речь о прохладном кипятке. Есть и еще более удивительная вещь: *горячий лед*. Мы привыкли думать, что вода в твердом состоянии не может существовать при температуре выше 0°C . Исследования английского физика Бриджмена показали, что это не так: под весьма значительным давлением вода переходит в твердое состояние и остается такой при температуре значительно выше 0°C . Вообще Бриджмен показал, что может существовать не один сорт льда, а несколько. Тот лед, который он называет “льдом №5”, получается под чудовищным давлением в 20600 атм и остается твердым при температуре 76°C . Он обжег бы нам пальцы, если бы мы могли до него дотронуться. Но прикосновение к нему невозможно: лед №5 образуется под давлением мощного пресса в толстостенном сосуде из лучшей стали. Увидеть его или взять в руки нельзя, и о свойствах “горячего льда” узнают лишь косвенным образом.

Любопытно, что “горячий лед” плотнее обыкновенного, плотнее даже воды: его плотность $1,05\text{ г/см}^3$. Он должен был бы тонуть в воде, между тем как обыкновенный лед в ней плавает

Холод из угля

Получение из угля не жара, а, напротив, холода не является чем-то несбыточным: оно каждодневно осуществляется на заводах так называемого “сухого льда”. Уголь сжигается здесь в котлах, а образующийся дым очищается, причем содержащийся в нем углекислый газ улавливается щелочным раствором. Выделяемый затем в чистом виде путем нагревания углекислый газ при последующем охлаждении и сжатии переводится в жидкое состояние под давлением 70 атм. Это — та жидкая углекислота, которая в толстостенных баллонах доставляется на заводы шипучих напитков и употребляется для промышленных надобностей. Она достаточно холодна, чтобы заморозить грунт, как делалось при сооружении московского метро; но для многих целей требуется располагать углекислотой в твердом виде, тем, что называется *сухим льдом*.

Сухой лед, т. е. твердая углекислота, получается из жидкой при быстром ее испарении под уменьшенным давлением. Куски сухого льда по внешности напоминают скорее прессованный снег, нежели лед, и вообще во многом

отличаются от твердой воды. Углекислый лед тяжелее обыкновенного льда и тонет в воде. Несмотря на чрезвычайно низкую температуру (-78°C), холод его не ощущается пальцами, если бережно взять кусок в руки: образующийся при соприкосновении с нашим телом углекислый газ защищает кожу от действия холода. Лишь сжав брусок сухого льда, мы рискуем отморозить пальцы.

Название “сухой лед” чрезвычайно удачно подчеркивает главную физическую особенность этого льда. Он действительно никогда мокрым не бывает и ничего не увлажняет кругом себя. Под влиянием теплоты он переходит сразу в газ, минуя жидкое состояние: существовать в жидком виде углекислота под давлением в 1 атм не может.

Эта особенность сухого льда вместе с его низкой температурой делает его незаменимым охладительным веществом для практических надобностей. Продукты, сохраняемые при помощи углекислого льда, не только не увлажняются, но защищаются от порчи еще и тем, что образующийся углекислый газ является средой, препятствующей развитию микроорганизмов; поэтому на продуктах не появляется плесени и бактерий. Насекомые и грызуны также не могут жить в такой атмосфере. Наконец, углекислота является надежным противопожарным средством: несколько кусков сухого льда, брошенные в горящий бензин, гасят огонь. Все это обеспечило сухому льду самое широкое применение в промышленности и в бытовой технике.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

МАГНЕТИЗМ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

“Любящий камень”

Такое поэтическое название дали китайцы естественному магниту. Любящий камень (тшу-ши), — говорят китайцы, — притягивает железо, как нежная мать привлекает своих детей. Замечательно, что у французов — народа, живущего на противоположном конце материка, мы встречаем сходное название для магнита: французское слово “aimant” означает и “магнит”, и “любящий”¹.

Сила этой “любви” у естественных магнитов незначительна, и потому очень наивно звучит греческое название магнита — “геркулесов камень”. Если обитатели древней Эллады так поражались умеренной силой притяжения естественного магнита, то что сказали бы они, увидев на современном металлургическом заводе магниты, поднимающие глыбы в целые тонны! Правда, это не естественные магниты, а электромагниты, т. е. железные массы, намагниченные электрическим током, проходящим по окружающей их обмотке. Но в обоих случаях действует сила одной и той же природы — магнетизм.

Не следует думать, что магнит действует только на железо. Есть ряд других тел, которые тоже испытывают на себе действие сильного магнита, хотя и не в такой степени, как железо. Металлы: никель, кобальт, марганец, платина, золото, серебро, алюминий — в слабой степени притягиваются магнитом. Еще замечательнее свойства так называемых диамагнитных тел, например цинка, свинца, висмута: эти тела отталкиваются от сильного магнита!

Жидкости и газы также испытывают на себе притяжение или отталкивание магнита, правда, в весьма слабой степени; магнит должен быть очень силен, чтобы проявить свое влияние на эти вещества. Чистый кислород, например, притягивается магнитом; если наполнить кислородом мыльный пузырь и поместить его между полюсами сильного

электромагнита, пузырь заметно вытянется от одного полюса к другому, растягиваемый невидимыми магнитными силами. Пламя свечи между полюсами сильного электромагнита изменяет свою обычную форму, явно обнаруживая чувствительность к магнитным силам (рис. 90).




Рис. 90. Пламя свечи между полюсами электромагнита.

Задача о компасе

Мы привыкли думать, что стрелка компаса всегда обращена одним концом на север, другим — на юг. Нам покажется поэтому совершенно несурзным следующий вопрос: где на земном шаре магнитная стрелка показывает на север *обоими концами*?

И еще нелепее прозвучит вопрос: где на земном шаре магнитная стрелка обоими концами показывает на юг?

Вы готовы утверждать, что подобных мест на нашей планете нет и быть не может. Однако же они существуют.

Вспомните, что магнитные полюсы Земли не совпадают с ее географическими полюсами — и вы, вероятно, сами догадаетесь, о каких местах нашей планеты идет в задаче речь. Куда будет показывать стрелка компаса, помещенная на южном географическом полюсе? Один ее конец будет направлен в сторону ближайшего магнитного полюса, другой — в противоположную. Но в какую бы сторону мы ни шли от южного географического полюса, мы всегда будем направляться на *север*; другого направления от южного географического полюса нет, — кругом него всюду север. Значит, помещенная там магнитная стрелка будет показывать на север обоими концами.

Точно так же стрелка компаса, перенесенного на северный географический полюс, обоими концами должна показывать на юг.

Линии магнитных сил

Любопытную картину изображает рис. 91, воспроизведенный с фотографии: от руки, положенной на полюсы электромагнита, торчат вверх пучки крупных булавок, словно жесткие волосы. Сама по себе




Рис. 91. Магнитные силы
“проходят” через руку.

рука совершенно не ощущает магнитной силы: невидимые нити проходят сквозь нее, ничем не выдавая своего присутствия. А железные булавки послушно подчиняются ее воздействию и располагаются в определенном порядке, обнаруживая перед нами направление магнитных сил.

У человека нет магнитного органа чувств; поэтому о существовании магнитных сил, которые окружают магнит, мы можем лишь догадываться*

Однако нетрудно косвенным образом обнаружить картину распределения этих сил. Лучше всего сделать это с помощью мелких железных опилок. Насыпьте опилки тонким ровным слоем на кусок гладкого картона или на стеклянную пластинку; подведите под картон или пластинку обыкновенный магнит и встряхивайте опилки легкими ударами. Магнитные силы свободно “проходят” сквозь картон и стекло; следовательно, железные опилки

* Небезынтересно представить себе, что переживали бы мы, если бы обладали непосредственным магнитным чувством. Крейдлю удалось, так сказать, привить ракам род магнитного чувства. Он заметил, что молодые раки засовывают себе в ухо маленькие камешки; эти камешки под действием силы тяжести действуют на чувствительный волосок, являющийся составной частью органа равновесия рака. Подобные же камешки, называемые отолитами, имеются и в ухе человека, поблизости от основного органа слуха. Действуя в направлении вертикали, эти камешки указывают направление силы тяжести. Вместо камешков Крейдль подложил ракам железные опилки, чего они не заметили. При поднесении магнита к раку последний располагался в плоскости, перпендикулярной к слагающей из магнитной силы и силы тяжести.

“В последнее время соответствующие опыты в измененной форме удалось произвести и над человеком. Келер приклеивал небольшие железные частицы к ушной барабанной перепонке; благодаря этому ухо воспринимало колебания магнитной силы как звук” (О. Винер).

под действием магнита намагнитятся; когда мы встряхиваем их, они на мгновение отделяются от картона и могут под действием магнитных сил легко повернуться, заняв то положение, которое приняла бы в данной точке магнитная стрелка, т. е. вдоль магнитной “силовой линии”. В результате опилки располагаются изогнутыми рядами, наглядно обнаруживая распределение невидимых магнитных линий.




Рис. 92. Расположение железных опилок на пластинке, покрывающей полюсы магнита.

Поместим над магнитом пластинку с опилками и встряхнем ее. Мы получим фигуру, изображенную на рис. 92. Магнитные силы создают сложную систему изогнутых линий. Вы видите, как они лучисто расходятся от каждого магнита, как опилки соединяются между собой, образуя то короткие, то длинные дуги между обоими полюсами. Железные опилки воочию показывают здесь то, что мысленно рисует перед собой физик и что невидимым образом присутствует вокруг каждого магнита. Чем ближе к полюсу, тем линии опилок гуще и четче; напротив, с удалением от полюса они разрежаются и утрачивают отчетливость, наглядно доказывая ослабление магнитных сил с расстоянием.

Как намагничивается сталь?

Чтобы ответить на этот вопрос, который часто задают читатели, надо разъяснить прежде всего, чем отличается магнит от немагнитного бруска стали. Каждый атом железа, входящего в состав стали— намагниченной или немагниченной,— мы можем представлять себе как маленький магнитик ². В стали немагниченной атомные магнетики

расположены беспорядочно, так что действие каждого уничтожается действием противоположно расположенного магнетика (рис. 93, а). Напротив, в магните все атомные магнетики расположены упорядоченно, одноименными полюсами в одном и том же направлении (рис. 93, б).




Рис 93 Расположение атомных магнетиков в немагнитной (а) и в намагнитной (б) стали, а также при намагничивании (в)

Что же происходит в бруске стали, когда его натирают магнитом? Силой своего притяжения магнит поворачивает атомные магнетики стального бруска одноименными полюсами в одну и ту же сторону. На рис. 93, в показано, как атомные магнетики поворачиваются сначала южными полюсами к северному полюсу магнита, а затем, когда магнит отводится далее, располагаются вдоль направления его движения, южными полюсами к середине бруска.

Отсюда легко понять, как надо действовать магнитом при намагничивании бруска стали: надо приставить к концу бруска один полюс магнита и, плотно прижимая, вести магнит вдоль бруска. Это один из простейших и древнейших приемов намагничивания, годный, однако, для получения лишь слабых магнитов небольшого размера. Сильные магниты можно получить, если для намагничивания использовать магнитное действие электрического тока.

Исполинские электромагниты

На металлургических заводах можно видеть электромагнитные подъемные краны, переносящие огромные грузы. Такие краны оказывают при подъеме и перемещении железных масс неоценимые услуги на сталелитейных и тому подобных заводах. Массивные железные глыбы или части машин в десятки тонн с удобством переносятся электромагнитными подъемными кранами без прикрепления. Точно так же переносят они без ящиков и упаковки листо-

вое железо, проволоку, гвозди, железный лом и другие материалы, переноска которых иным способом потребовала бы немало хлопот.




Рис 94. Электромагнитный подъемный кран, переносящий железные плиты.




Рис 95 Электромагнитный подъемный кран, переносящий бочки с гвоздями.

Как хлопотливо было бы собирать и переносить кучу железных плит, которую разом собрал и перенес могучий электромагнитный подъемный кран, изображенный на рис. 94; здесь выгода не только в экономии сил, но и в упрощении самой работы. На рис. 95 вы видите, как электромагнитный кран переносит даже упакованные в бочках гвозди, сразу поднимая по пять бочек! На одном только металлургическом заводе четыре электромагнитных крана, каждый из которых может переносить сразу десять рельсов, заменяют ручной труд двухсот рабочих. Не надо заботиться о прикреплении этих тяжестей к подъемному крану: пока идет ток в обмотке электромагнита, до тех пор ни один груз не упадет с него.

Но если ток в обмотке почему-либо прервется, авария неизбежна. Такие случаи вначале бывали. Вот что было написано в одном журнале.

“На одном американском заводе электромагнит поднимал железные болванки, подвозимые в вагонах, и бросал их в печь. Внезапно на электростанции Ниагарского водопада, подающей ток, что-то случилось, ток был прерван; масса металла сорвалась с электромагнита и всей своей тяжестью обрушилась на голову рабочего. Чтобы избежать повторения подобных несчастных случаев, а также с целью сэкономить потребление электрической энергии, при электромагнитах устраива-

ются особые приспособления. После того как переносимые предметы подняты магнитом, сбоку опускаются и плотно закрываются прочные етальные подхватки, которые затем сами поддерживают груз, ток же во время транспортировки прерывается”.

Поперечник электромагнитов, изображенных на рис. 94 и 95, достигает 1,5 м; каждый магнит способен поднять до 16 тонн (товарный вагон). Один такой магнит переносит за сутки более 600 тонн груза. Есть электромагниты, способные поднять сразу до 75 тонн, т. е. целый паровоз!

При взгляде на такую работу электромагнитов у иного читателя, быть может, мелькнула мысль: как удобно было бы переносить при помощи магнитов *раскаленные* железные болванки! К сожалению, это возможно только до известной температуры, так как *раскаленное железо не намагничивается*. Нагретый до 800 °С магнит утрачивает магнитные свойства³.

Современная техника металлообработки широко пользуется электромагнитами для удержания и продвижения стальных, железных и чугунных изделий. Сконструированы сотни различных патронов, столов и других приспособлений, значительно упрощающих и ускоряющих обработку.

Магнитные фокусы

Силой электромагнитов пользуются иногда и фокусники; легко представить, какие эффектные трюки проделывают они с помощью этой невидимой силы. Дари, автор известной книги “Электричество в его применениях”, приводит следующий рассказ одного французского фокусника о представлении, данном им в Алжире:

“На сцене находится небольшой окованный ящик с ручкой на крышке. Я вызываю из зрителей человека посильнее. В ответ на мой вызов выступил араб среднего роста, но крепкого сложения, представляющий собой аравийского геркулеса. Выходит он с бодрым и самоуверенным видом и, немного насмешливо улыбаясь, останавливается около меня.

— Очень вы сильны? — спросил я его, оглядев с ног до головы

— Да, — отвечал он небрежно.

— Уверены ли вы, что всегда останетесь сильным?

— Совершенно уверен.

— Вы ошибаетесь: в одно мгновение ока я могу отнять у вас силу, и вы сделаетесь слабым, подобно малому ребенку.

Араб презрительно улыбнулся в знак недоверия к моим словам

— Подойдите сюда, — сказал я, — и поднимите ящик. Араб нагнулся, поднял ящик и высокомерно спросил:

— Больше ничего?

— Подождите немножко, — отвечал я.

Затем, приняв серьезный вид, я сделал повелительный жест и произнес торжественным тоном:

— Вы теперь слабее женщины. Попробуйте снова поднять ящик.

Силач, несколько не усташась моих чар, опять взялся за ящик, но на этот раз ящик оказывает сопротивление и, несмотря на отчаянные усилия араба, остается неподвижным, словно прикованный к месту. Араб силится поднять ящик с такой силой, которой хватило бы для поднятия огромной тяжести, но все напрасно. Утомленный, запыхавшись и сгорая от стыда, он, наконец, останавливается. Теперь он начинает верить в силу чародейства.

Секрет чародейства представителя “цивилизаторов” был прост. Железное дно ящика помещено на подставке, представляющей полюс сильного электромагнита. Пока тока нет, ящик поднять нетрудно; но стоит пустить ток в обмотку электромагнита, и ящик нельзя будет оторвать даже усилиями двух-трех человек.

Магнит для тренировок спортсменов

Неожиданное применение нашел себе сильный магнит для тренировок тяжелоатлетов. Электромагнит, употребляемый для подъемных кранов, подвешивается на некоторой высоте над полом, немного выше человеческого роста, а атлет, держа в руках железный утюг, стремится побороть магнитное притяжение электромагнитного аппарата. В зависимости от тока, который регулируется тренером, притяжение бывает различно и может достигать такой силы, что атлет, не желающий выпустить утюга из рук, рискует повиснуть на магните, если товарищи соединенными усилиями не помогут ему удержаться на месте.

Магнит в земледелии

Еще любопытнее та полезная служба, которую несет магнит в сельском хозяйстве, помогая земледельцу очищать семена культурных растений от семян сорняков. Сорняки обладают ворсистыми семенами, цепляющимися за шерсть проходящих мимо животных и благодаря этому распространяющимися далеко от материнского растения. Этой особенностью сорняков, выработавшейся у них в течение миллионов лет борьбы за существование, воспользовалась сельскохозяйственная техника для того, чтобы отделить с

помощью магнита шероховатые семена сорняков от гладких семян таких полезных растений, как лен, клевер, люцерна.

Если засоренные семена культурных растений обсыпать железным порошком, то крупинки железа плотно облепят семена сорняков, но не пристанут к гладким семенам полезных растений. Попадая затем в поле действия достаточно сильного электромагнита, смесь семян автоматически разделяется на чистые семена и на сорную примесь: магнит вылавливает из смеси все те семена, которые облеплены железными опилками ⁴.

Магнитная летательная машина

В начале этой книги я ссылался на занимательное сочинение французского писателя Сирано де Бержерака “История государств на Луне и Солнце”. В ней, между прочим, описана любопытная летательная машина, действие которой основано на магнитном притяжении и с помощью которой один из героев повести прилетел на Луну. Привожу это место сочинения дословно:

“Я приказал изготовить легкую железную повозку, войдя в нее и устроившись удобно на сиденье, я стал подбрасывать высоко над собой магнитный шар. Железная повозка тотчас же поднималась вверх. Каждый раз, как я приближался к тому месту, куда меня притягивал шар, я снова подбрасывал его вверх. Даже когда я просто приподнимал шар в руках, повозка поднималась, стремясь приблизиться к шару. После многократного бросания шара вверх и поднятия повозки я приблизился к месту, откуда началось мое падение на Луну. И так как в этот момент я крепко держал в руках магнитный шар, повозка прижималась ко мне и не покидала меня. Чтобы не разбиться при падении, я подбрасывал свой шар таким образом, чтобы падение повозки замедлялось его притяжением. Когда я был уже всего в двух-трех сотнях саженей от лунной почвы, я стал бросать шар под прямым углом к направлению падения, пока повозка не оказалась совсем близко к почве. Тогда я выпрыгнул из повозки и мягко опустился на песок”

Никто, конечно,— ни автор романа, ни читатели его книг— не сомневается в полной непригодности описанной летательной машины. Но не думаю, чтобы многие умели правильно сказать, в чем, собственно, кроется причина неосуществимости этого проекта: в том ли, что нельзя подкинуть магнит, находясь в железной повозке, в том ли, что повозка не притянется к магниту, или в чем-либо ином?

Нет, подбросить магнит можно, и он подтянул бы повозку, если достаточно силен, — а все-таки летательная машина несколько не подвигалась бы вверх.

Случалось ли вам бросать тяжелую вещь с лодки из берег? Вы, без сомнения, замечали при этом, что сама лодка отодвигается от берега. Ваши мускулы, сообщая бросаемой вещи толчок в одном направлении, отталкивают одновременно ваше тело (а с ним и лодку) в обратном направлении. Здесь проявляется тот закон равенства действующей и противодействующей сил, о котором нам не раз уже приходилось говорить. При бросании магнита происходит то же самое: седок, подкидывая магнитный шар вверх (с большим усилием, потому что шар притягивается к железной повозке), неизбежно отталкивает всю повозку вниз. Когда же затем шар и повозка снова сближаются взаимным притяжением, они только возвращаются на первоначальное место. Ясно, следовательно, что если бы даже повозка ничего не весила, то бросанием магнитного шара можно было бы сообщить ей только колебания вокруг некоторого среднего положения; заставить ее таким способом двигаться поступательно невозможно.

Во времена Сирано де Бержерака (в середине XVII века) закон действия и противодействия еще не был провозглашен; сомнительно поэтому, чтобы французский сатирик мог отчетливо объяснить несостоятельность своего шутивого проекта.

Наподобие “магометова гроба”

Любопытный случай наблюдался однажды при работе с электромагнитным подъемным краном. Один из рабочих заметил, что электромагнитом был притянут тяжелый железный шар с короткой, приделанной к полу цепью, которая не дала шару вплотную приблизиться к магниту: между шаром и магнитом оставался промежуток в ладонь шириной. Получилась необычайная картина: цепь, торчащая отвесно вверх! Сила магнита оказалась так велика, что цепь сохранила свое вертикальное положение, даже когда на ней повис рабочий наподобие легендарного “магометова гроба” (рис. 96)*.

* Это указывает на огромную силу электромагнита, тогда как притягивающее действие магнитов значительно ослабевает с увеличением расстояния.

Кстати, с “магометовом гробе”. Правоверные мусульмане убеждены, что гроб с останками “пророка” покоится в воздухе, вися в усыпальнице без всякой опоры между полом и потолком

Возможно ли это?



Рис 96 Железная цепь с грузом, торчащая вверх

“Повествуют,— писал Эйлер в своих ”Письмах о разных физических материях”,— будто гробницу Магомета держит сила некоторого магнита; это кажется не невозможным, потому что есть магниты, искусством сделанные, которые поднимают до 100 фунтов”*.

Такое объяснение несостоятельно; если бы указанным способом (т. е. пользуясь *притяжением* магнита) подобное равновесие было достигнуто на один момент, то малейшего толчка, малейшего дуновения воздуха было бы достаточно, чтобы его нарушить,— и тогда гроб либо упал бы на пол, либо подтянулся бы к потолку. Удержать его неподвижно практически так же невозможно, как поставить конус на его вершине, хотя теоретически последнее и допустимо.

Впрочем, явление “магометова гроба” вполне можно воспроизвести и с помощью магнитов,— но только пользуясь не взаимным их *притяжением*, а, напротив, взаимным *отталкиванием*. (О том, что магниты могут не только притягиваться, но и отталкиваться, часто забывают даже люди, еще недавно изучавшие физику.)

Как известно, одноименные полюсы магнитов взаимно отталкиваются. Два намагниченных бруска, расположенных так, что их одноименные полюсы приходятся один над другим, отталкиваются; подобрав массу верхнего бруска надлежащим образом, нетрудно добиться того, чтобы он

яния между полюсом и притягиваемым телом Подковообразный магнит, удерживающий при непосредственном соприкосновении груз в сотню граммов, уменьшает свою подъемную силу вдвое когда между ним и грузом вводится листок бумаги Вот почему концы магнита обычно не покрывают краской, хотя она и предохраняла бы их от ржавчины

* Написано в 1774 г когда электромагниты еще не были известны .

вита́л над нижним, держа́сь без прикосновения к нему, в устойчивом равновесии. Надо лишь стойками из немагнитного материала — например, стеклянными — предупредить возможность поворота верхнего магнита в горизонтальной плоскости. В подобной обстановке мог бы витать в воздухе и легендарный гроб Магомета⁵




Рис 97 “Вагон” мчащийся без трения

Наконец, явление этого рода осуществимо и силой магнитного *притяжения*, если добиваться его для тела движущегося. На этой мысли основан замечательный проект электромагнитной железной дороги *без трения* (рис 97), предложенный советским физиком Б. П. Вейнбергом. Проект настолько поучителен, что каждому интересующемуся физикой полезно с ним познакомиться.

Электромагнитный транспорт

В железной дороге, которую предлагал устроить Б. П. Вейнберг, вагоны *совершенно невесомы*; их вес уничтожается электромагнитным притяжением. Вы не удивитесь поэтому, если узнаете, что согласно проекту вагоны не катятся по рельсам, не плавают по воде, даже не скользят в воздухе, — они летят без всякой опоры, не прикасаясь ни к чему, висят на невидимых нитях могучих магнитных сил. Они не испытывают ни малейшего трения и, следовательно, будучи раз приведены в движение, сохраняют по инерции свою скорость, не нуждаясь в работе локомотива.

Осуществляется это следующим образом. Вагоны движутся внутри медной трубы, из которой выкачан воздух, чтобы его сопротивление не мешало движению вагонов. Трение о дно уничтожается тем, что вагоны движутся, *не касаясь стенок трубы*, поддерживаемые в безвоздушном

пространстве силой электромагнитов. С этой целью вдоль всего пути над трубой расставлены, на определенных расстояниях друг от друга, очень сильные электромагниты. Они притягивают к себе *железные* вагоны, движущиеся внутри трубы, и мешают им падать. Сила магнитов рассчитана так, что железный вагон, проносящийся в трубе, все время остается между ее “потолком” и “полом”, не прикасаясь ни к тому, ни к другому. Электромагнит подтягивает проносящийся под ним вагон вверх, — но вагон не успевает удариться о потолок, так как его влечет сила тяжести; едва он готов коснуться пола, его поднимает притяжение следующего электромагнита... Так, подхватываемый все время электромагнитами, вагон мчится по волнистой линии без трения, без толчков, как планета в мировом пространстве.

Что же представляют собой вагоны? Это — сигарообразные цилиндры диаметром 90 см, длиной 2,5 м. Конечно, вагон герметически закрыт, — ведь он движется в безвоздушном пространстве, — и подобно подводным лодкам снабжен аппаратами для автоматической очистки воздуха.

Способ отправления вагонов в путь также совершенно отличен от всего, что применялось до сих пор: его можно сравнить разве только с пушечным выстрелом. И действительно, вагоны эти буквально “выстреливаются”, как снаряды, только “пушка” здесь электромагнитная ⁶. Устройство станции отправления основано на свойстве спирально закрученной, в форме катушки, проволоки (обмотки соленоида) при прохождении тока втягивать в себя железный стержень; втягивание происходит с такой стремительностью, что стержень при достаточной длине обмотки и силе тока может приобрести огромную скорость. В новой магнитной дороге эта-то сила и будет выбрасывать вагоны. Так как внутри трубы трения нет, то скорость вагонов не уменьшается, и они мчатся по инерции, пока их не задержит соленоид станции назначения.

Вот несколько подробностей, приводимых автором проекта:

“Опыты, которые я ставил в 1911 — 1913 гг. в физической лаборатории Томского технологического института, производились с медной трубой (диаметром 32 см), над которой находились электромагниты, а под ними на подставке вагончик — кусок железной трубы с колесами спереди и сзади и с “носом”, которым он для остановки ударялся в кусок доски, опиравшейся о мешок с песком. Вагончик этот весил 10 кгс. Можно было придать вагончику скорость около 6 км/ч, выше которой при ограниченности размеров комнаты и кольцевой трубы (диаметр кольца был 6,5 м) нельзя было идти. Но в разра-

ботанном мною проекте при трехверстной длине соленоидов на станции отправления скорость легко довести до 800—1000 км/ч, а благодаря отсутствию воздуха в трубе и отсутствию трения о пол или потолок не надо тратить никакой энергии для ее поддержания.

Несмотря на большую стоимость сооружения и, в особенности, самой медной трубы, все же благодаря отсутствию трат на мощность для поддержания скорости, на каких-либо машинистов, кондукторов и т. п., стоимость километра — от нескольких тысячных до 1—2 сотых копейки, а пропускная способность двухтрубного пути — 15000 пассажиров или 10 000 тонн в сутки в одном направлении”⁷

Идея Б. П. Вейнберга, в видоизмененном виде, нашла себе практическое применение на Московском почтамте для передвижения легких грузов. Длина опытного участка была 120 м, скорость передвижения 30 м/с. Подобная же электромагнитная почта была устроена в Ленинградской Публичной библиотеке для передачи читательских заказов

Сражение марсиан с жителями Земли

Естествоиспытатель Древнего Рима Плиний передает пространенный в его время рассказ о магнитной скале где-то в Индии, у берега моря, которая с необычайной силой притягивала к себе всякие железные предметы. Горе моряку, дерзнувшему приблизиться на своем корабле к этой скале. Она вытянет из судна все гвозди, винты, железные скрепы, — и корабль распадется на отдельные доски.

Впоследствии это сказание вошло в сборник сказок “Тысяча и одна ночь”.

Конечно, это не более как легенда. Мы знаем, что магнитные горы, т. е. горы, богатые магнитным железняком, действительно существуют, — вспомним знаменитую Магнитную гору, где высятся домны Магнитогорска. Однако сила притяжения подобных гор чрезвычайно мала, почти ничтожна. А таких гор или скал, о каких писал Плиний, на земном шаре никогда не существовало.

Если в настоящее время и строятся суда без железных и стальных частей, то делается это не из боязни магнитных скал, а для удобного изучения земного магнетизма⁸.

Научный романист Курт Лассвиц воспользовался идеей легенды Плиния, чтобы придумать грозное военное оружие, к которому в его романе “На двух планетах” прибегают пришельцы с Марса в борьбе с земными армиями. Располагая таким магнитным (вернее, электромагнитным)

оружием, марсиане даже не вступают в борьбу с земными жителями, а обезоруживают их еще до начала сражения.

Вот как описывает романист этот эпизод сражения между марсианами и жителями Земли.

“Блестящие ряды всадников неудержимо ринулись вперед. И казалось, будто самоотверженная решимость войска понудила наконец могущественного неприятеля (марсиан. — *Я. П.*) к отступлению, так как между его воздушными кораблями возникло новое движение. Они поднялись на воздух, словно собираясь уступить дорогу

Одновременно с этим, однако, опустилась сверху какая-то темная широко раскинувшаяся масса, теперь только появившаяся над полем. Подобно развевающемуся покрывалу, масса эта, со всех сторон окруженная воздушными кораблями, быстро развернулась над полем. Вот первый ряд всадников попал в район ее действия, — и тотчас же странная машина распростерлась над всем полком. Действие, произведенное ею, было неожиданно и чудовишно! С поля донесся пронзительный вопль ужаса. Лошади и всадники клубком валялись на земле, а воздух был наполнен густой тучей копий, сабель и карабинов. с громом и треском летевших вверх к машине, к которой они и пристали

Машина скользнула немного в сторону и сбросила свою железную жатву на землю. Еще два раза возвращалась она и словно скосила все находящееся на поле оружие. Не нашлось ни одной руки, которая оказалась бы в силах удержать саблю или копье.

Машина эта была новым изобретением марсиан: она с неодолимой силой притягивала к себе все сделанное из железа и стали. С помощью этого витающего в воздухе магнита марсиане вырывали из рук своих противников оружие, не причиняя им никакого вреда.

Воздушный магнит пронесся далее и приблизился к пехоте. Тщетно солдаты старались обеими руками удержать свои ружья, — непреодолимая сила вырывала их из рук; многие, все-таки не выпускавшие их, были сами увлечены на воздух. В несколько минут первый полк был обезоружен. Машина понеслась вдогонку за марширующими в городе полками, готовая для них ту же участь.

Подобная же судьба постигла и артиллерию”

Часы и магнетизм

При чтении предыдущей статьи естественно возникает вопрос: нельзя ли защититься от действия магнитных сил, укрыться от них за какой-нибудь непроницаемой для них преградой?

Это вполне возможно, и фантастическое изобретение марсиан могло бы быть обезврежено, если бы заранее были приняты надлежащие меры.

Как ни странно, веществом, непроницаемым для магнитных сил, является то же самое железо, которое так легко

намагничивается! *Внутри* кольца из железа стрелка компаса не отклоняется магнитом, помещенным вне кольца.

Железным *футляром* можно защитить от магнитных сил стальной механизм карманных часов (рис. 98). Если бы вы положили золотые часы на полюсы сильного подковообразного магнита, то все стальные части механизма, прежде всего тонкая волосяная пружинка при балансире*, на-




Рис. 98. Что предохраняет стальной механизм часов от намагничивания?

магнитились бы и часы перестали бы ходить правильно. Удалив магнит, вы не вернете часов к прежнему состоянию, стальные части механизма останутся намагниченными, и часы потребуют самой радикальной починки, замены многих частей механизма новыми. Поэтому с золотыми часами не следует делать подобного опыта, — он обойдется чересчур дорого ⁹.

Напротив, с часами, механизм которых плотно закрыт железными или стальными крышками, вы можете смело произвести этот опыт, — магнитные силы через железо и сталь не проникают. Поднесите такие часы к обмоткам сильнейшей динамо, — верность хода не пострадает ни в малейшей степени. Для электротехников такие железные часы являются идеальными, тогда как золотые или серебряные скоро приходят в негодность от воздействия магнитов.

Магнитный “вечный” двигатель

В истории попыток изобрести “вечный” двигатель магнит сыграл не последнюю роль. Неудачники-изобретатели на разные лады старались использовать магнит, чтобы устроить механизм, который вечно двигался бы сам собой. Вот один из проектов подобного “механизма” (описанный в XVII веке англичанином Джоном Вилкенсом, епископом в Честере).

* Если только этот волосок не сделан из особого сплава *инвара* — металла, не способного намагничиваться, хотя в состав его и входят железо и никель.

Сильный магнит *A* помещается на колонке (рис. 99). К ней прислонены два наклонных желоба *M* и *N*, один под другим, причем верхний *M* имеет небольшое отверстие *C* в верхней части, а нижний *N* изогнут. Если, — рассуждал изобретатель, — на верхний желоб положить небольшой железный шарик в точке *B*, то вследствие притяжения магнитом *A* шарик покатится вверх; однако, дойдя до отверстия, он провалится в нижний желоб *N*; покатится по




Рис 99 Мнимый вечный двигатель.

нему вниз, поднимется по закруглению *D* этого желоба и попадет на верхний желоб *M*; отсюда, притягиваемый магнитом, он снова покатится вверх, снова провалится через отверстие, вновь покатится вниз и опять окажется на верхнем желобе, чтобы начать движение сначала. Таким образом, шарик безостановочно будет бегать взад и вперед, осуществляя “вечное движение”.

В чем абсурдность этого изобретения?

Указать ее нетрудно. Почему изобретатель думал, что шарик, скатившись по желобу *N* до его нижнего конца, будет еще обладать скоростью, достаточной для поднятия его вверх по закруглению *D*? Так было бы, если бы шарик катился под действием одной лишь силы тяжести: тогда он катился бы ускоренно. Но наш шарик находится под действием двух сил. тяжести и магнитного притяжения. Последнее по предположению настолько значительно, что может заставить шарик подняться от точки *B* до *C*. Поэтому по желобу *N* шарик будет скатываться не ускоренно, а замедленно, и если даже достигнет нижнего конца, то во всяком случае не накопит скорости, необходимой для поднятия по закруглению *D*.

Описанный проект много раз вновь всплывал впоследствии во всевозможных видоизменениях. Один из подобных проектов был даже, как ни странно, запатентован в Германии в 1878 г., т. е. тридцать лет спустя после провозглашения закона сохранения энергии! Изобретатель так замаскировал нелепую основную идею своего магнитного “вечного” двигателя, что ввел в заблуждение техническую комиссию, выдающую патенты. И хотя, согласно уставу, патенты на изобретения, идея которых противоречит зако-

нам природы, не должны выдаваться, изобретение на этот раз было формально запатентовано. Вероятно, счастливый обладатель этого единственного в своем роде патента скоро разочаровался в своем детище, так как уже через два года перестал вносить пошлину, и курьезный патент потерял законную силу. “изобретение” стало всеобщим достоянием

Музейная задача

В практике музейного дела нередко возникает надобность читать древние свитки, настолько ветхие, что они ломаются и рвутся при самой осторожной попытке отделить один слой рукописи от соседнего.

Как разъединить такие листы?

При Академии наук СССР имеется лаборатория реставрации (восстановления) документов, которой и приходится разрешать подобные задачи. В указанном сейчас случае лаборатория справляется с задачей, прибегнув к услугам электричества: свиток электризуется; соседние его части, получающие одноименный заряд, отталкиваются друг от друга— и аккуратно, без повреждения разделяются. Такой оттопыренный свиток уже сравнительно нетрудно умелыми руками развернуть и наклеить на плотную бумагу

Еще воображаемый вечный двигатель

Большую популярность среди искателей вечного двигателя получила идея соединения динамомашины с электромотором. Все подобные проекты сводятся к следующему. Надо шкивы электромотора и динамомашины соединить приводным ремнем, а провода от динамомашины подвести к электромотору. Если динамомашине дать первоначальный импульс, то порождаемый ею ток, поступая в электромотор, приведет его в движение, энергия же движения электромотора будет передаваться ремнем шкиву динамомашины и приведет ее в движение. Таким образом,— полагают изобретатели,— машины станут двигать одна другую, и движение это никогда не прекратится, пока обе машины не износятся.

Идея эта представляется изобретателям чрезвычайно заманчивой; однако те, кто пытался ее осуществить на практике, с удивлением убеждались, что ни одна из двух машин при таких условиях не работает. Ничего иного от этого проекта и ожидать не следовало. Даже если бы каждая из соединенных

машин обладала стопроцентным коэффициентом полезного действия, мы могли бы заставить их указанным образом безостановочно двигаться только при полном отсутствии трения. Соединение названных машин (их “агрегат”) представляет собой, в сущности, одну машину, которая должна сама себя приводить в движение. При отсутствии трения агрегат, как и любой шкив, двигался бы вечно, но пользы от такого движения нельзя было бы извлечь никакой: стоило бы заставить “двигатель” совершать внешнюю работу, и он немедленно остановился бы. Перед нами было бы “вечное движение”, но не “вечный двигатель”. При наличии же трения агрегат не двигался бы вовсе.

Странно, что людям, которых увлекает эта идея, не приходит в голову более простое осуществление той же мысли: соединить ремнем два каких-нибудь шкива и завертеть один из них. Руководствуясь той же логикой, что и в случае предыдущего сочетания машин, мы должны ожидать, что первый шкив приведет во вращение второй, а от второго будет вращаться первый. Можно обойтись и одним шкивом: завертим его — правая часть станет увлекать во вращение левую, левая же при движении будет поддерживать вращение правой. В последних двух случаях нелепость слишком очевидна, и потому подобные проекты никого не вдохновляют. Но, по существу, все три описанных “вечных двигателя” исходят из одного и того же заблуждения.

Почти вечный двигатель

Для строгого математика выражение “почти вечный” не представляет ничего заманчивого. Движение может быть либо вечным, либо не вечным; “почти вечное” значит, в сущности, *невечное*.

Но для практической жизни это не так. Многие, вероятно, были бы вполне удовлетворены, если бы получили в свое распоряжение не совсем вечный двигатель, а “почти вечный”, способный двигаться хотя бы, например, тысячу лет. Жизнь человека коротка, и тысячелетие для нас то же, что вечность. Люди практической складки, наверно, сочли бы, что проблема вечного двигателя решена и что больше не над чем ломать голову.

Таких людей можно обрадовать сообщением, что тысячелетний двигатель уже изобретен; каждый может при известной затрате средств иметь у себя подобие такого “вечного двигателя”. Патент на это изобретение никем не взят, и

секрета он не представляет. Устройство прибора, придуманного Стреттом в 1903 г. и обычно называемого “радиевыми часами”, весьма несложно (рис. 100).

Внутри стеклянного баллона, из которого выкачан воздух, подвешена на кварцевой нити *В* (не проводящей электричества) небольшая стеклянная трубочка *А*, заключающая в себе несколько тысячных долей грамма *радиевой соли*. К концу трубочки подвешены, как в электроскопе, два золотых листочка. Радий, как известно, испускает лучи трех родов: альфа, бета и гамма. В данном случае основную роль играют легко проходящие через стекло бета-лучи, которые состоят из потока отрицательно заряженных частиц (электронов). Разбрасываемые радием во все стороны частицы уносят с собой *отрицательный* заряд, а потому сама трубочка с радием постепенно заряжается *положительно*. Этот положительный заряд переходит на золотые листочки *С* и заставляет их раздвигаться.

Раздвинувшись, листочки прикасаются к стенкам баллона, теряют здесь свой заряд (в соответствующих местах стенок приклеены полоски фольги, по которым электричество уходит) и вновь смыкаются. Вскоре накапливается новый заряд, листочки вновь расходятся, опять отдают заряд стенкам и смыкаются, чтобы вновь наэлектризоваться. Каждые две-три минуты совершается одно колебание золотых листочков, с регулярностью часового маятника, — отсюда и название “радиевые часы”. Это будет длиться целые годы, десятилетия, столетия, пока будет продолжаться испускание радием его лучей.

Читатель видит, конечно, что перед ним отнюдь не “вечный”, а только даровой двигатель.

Долго ли радий испускает свои лучи?

Установлено, что уже через 1600 лет способность радия испускать лучи ослабнет вдвое. Поэтому радиевые часы будут идти безостановочно не менее тысячи лет, постепенно уменьшая лишь частоту своих колебаний, вследствие ослаб-




Рис. 100. Радиевые часы с “почти вечным” заводом на 1600 лет.

ления электрического заряда. Если бы в эпоху начала Руси созданы были такие радиевые часы, они действовали бы еще в наше время!

Можно ли использовать этот даровой двигатель для каких-нибудь практических целей? К сожалению, нет. Мощность этого двигателя, т. е. количество работы, совершаемой им в единицу времени, так ничтожна, что никакой механизм не может приводиться им в действие. Чтобы достичь сколько-нибудь осязаемых результатов, необходимо располагать гораздо большим запасом радия. Если вспомним, что радий— чрезвычайно редкий и дорогой элемент, то согласимся, что даровой двигатель подобного рода оказался бы чересчур разорительным.

Птицы на проводах

Все знают, как опасно для человека прикосновение к электрическим проводам трамвая или высоковольтной сети, когда они под напряжением. Такое прикосновение смертельно для человека и для крупных животных. Известно много случаев, когда лошадь или корову убивает током, если их задевает оборвавшийся провод.




Рис 101 Птицы безнаказанно садятся на электрические провода
Почему?

Чем же объяснить то, что птицы спокойно и совершенно безнаказанно усаживаются на провода? Подобные картинки можно часто наблюдать в городах (рис. 101).

Чтобы понять причину подобных противоречий, примем во внимание следующее: тело сидящей на проводе птицы представляет собой как бы ответвление цепи, сопротивление которого по сравнению с другой ветвью (короткого участка между ногами птицы) огромно. Поэтому сила

тока в этой ветви (в теле птицы) ничтожна и безвредна. Но если бы птица, сидя на проводе, коснулась столба крылом, хвостом или клювом — вообще каким-нибудь образом соединилось с землей, — она была бы мгновенно убита током, который устремился бы через ее тело в землю. Это нередко и наблюдается.

Птицы имеют повадку, усевшись на кронштейн линии высоковольтной передачи, чистить клюв о токонесущий провод. Так как кронштейн не изолирован от земли, то прикосновение заземленной птицы к проводу, находящемуся под током, неизбежно кончается гибелью. Насколько подобные случаи многочисленны, видно хотя бы из того, что в некоторых странах в свое время принимали особые меры, чтобы оградить птиц от гибели. С этой целью на кронштейнах линий высоковольтной передачи устанавливали изолированные насесты, на которых птица могла бы не только сидеть, но и безнаказанно чистить о провод свой клюв (рис. 102). В других случаях опасные места делают с помощью особых приспособлений недоступными для прикосновения птиц.




Рис 102. Изолированный насест для птиц на кронштейне линии высоковольтной передачи

При том широком развитии, которое получает в СССР растущая сеть высоковольтных передач, нам следует в интересах лесоводства и земледелия позаботиться об ограждении пернатого населения от истребления электрическим током.

При свете молнии

Случалось ли вам во время грозы наблюдать картину оживленной городской улицы при кратких вспышках молнии? Вы, конечно, заметили при этом одну странную особенность: улица, только что полная движения, кажется в такие мгновения словно застывшей. Лошади останавливаются в напряженных позах, держа ноги в воздухе; экипажи также неподвижны: отчетливо видна каждая спица колеса...

Причина кажущейся неподвижности заключается в ничтожной продолжительности молнии. Молния, как и всякая электрическая искра, длится чрезвычайно малый промежуток времени — настолько малый, что его даже нельзя

измерить обычными средствами. При помощи косвенных приемов удалось, однако, установить, что молния длится иногда лишь тысячные доли секунды ¹⁰. За столь короткие промежутки времени мало что успевает переместиться заметным для глаза образом. Неудивительно поэтому, что улица, полная разнообразных движений, представляется при свете молнии совершенно неподвижной: ведь мы замечаем на ней только то, что длится тысячные доли секунды! Каждая спица в колесах быстро движущегося экипажа успевает переместиться лишь на ничтожную долю миллиметра; для глаза это все равно, что полная неподвижность.

Сколько стоит молния?

В ту отдаленную эпоху, когда молнии приписывали богам, подобный вопрос звучал бы кощунственно. Но в наши дни, когда электрическая энергия превратилась в товар, который измеряют и оценивают, как и всякий другой, вопрос о том, какова стоимость молнии, вовсе не должен казаться бессмысленным. Задача состоит в том, чтобы учесть электрическую энергию, потребную для грозового разряда, и оценить ее хотя бы по таксе электрического освещения.

Вот расчет. Потенциал грозового облака равен примерно 50 млн. вольт. Максимальная сила тока оценивается при этом в 200 тыс. ампер. (Ее определяют, заметим кстати, по степени намагничивания стального стержня тем током, который пробегает в его обмотке при ударе молнии в громоотвод.) Мощность в ваттах получим перемножением числа вольт на число ампер; при этом однако, надо учесть то, что, пока длится разряд, потенциал падает до нуля, поэтому при вычислении мощности разряда надо взять средний потенциал, иначе говоря — половину начального потенциала. Имеем

$$\text{мощность разряда} = \frac{(5 \cdot 10^7 \text{В}) \cdot (2 \cdot 10^5 \text{А})}{2} = 5 \cdot 10^{12} \text{ Вт},$$

т. е. 5 млрд. киловатт.

Получив столь внушительную мощность, естественно ожидаешь, что и денежная стоимость молнии выражается огромной цифрой. Однако, чтобы получить энергию в киловатт-часах (ту, которая фигурирует в счетах за электрическое освещение), необходимо учесть время. Отдача столь значительной мощности длится около тысячной доли секунды. За это время израсходуется

$$\text{энергия} = \frac{5 \cdot 10^9 \text{ кВт} \cdot \text{ч}}{3600 \cdot 1000} = 1400 \text{ кВт} \cdot \text{ч}.$$

Один киловатт-час по тарифу обходится потребителю электрического тока в 4 копейки. Отсюда нетрудно вычислить денежную стоимость молнии:

$$4 \text{ коп.} \cdot 1400 = 5600 \text{ коп.} = 56 \text{ руб.}$$

Результат поразительный: молния, энергия которой раз в сто больше энергии выстрела тяжелого артиллерийского орудия, должна была бы стоить, по тарифу электростанции, всего лишь 56 рублей!

Интересно, насколько современная электротехника приблизилась к возможности воспроизвести молнию. В лабораториях достигнуто напряжение до 10 млн. вольт и получена искра длиной в 15 м. Дистанция не очень значительная..

Грозовой ливень в комнате

Очень легко устроить дома небольшой фонтан из резиновой трубки, один конец которой погружают в ведро, поставленное на возвышении, или надевают на водопроводный кран. Выходное отверстие трубки должно быть очень мало, для того чтобы фонтан разбивался тонкими струйками; проще всего достигнуть этого, вставив в свободный конец трубки кусочек карандаша, из которого вынут графит. Ради удобства обращения с фонтаном этот свободный конец укрепляют в перевернутой воронке (рис. 103) ¹¹

Пустив такой фонтан высотой в полметра и направив струю вертикально вверх, приблизьте к нему натертую сукном палочку сургуча или эбонитовый гребень. Вы тотчас увидите довольно неожиданную вещь: отдельные струйки ниспадающей части фонтана сольются в одну сплошную струю, которая с заметным шумом ударяет о дно подставленной тарелки. Звук напоминает характерный шум грозового ливня, “Не подлежит сомнению, — замечает по этому поводу физик Бойс, — что именно по этой причине капли дождя во время грозы отличаются такой величиной”. Удалите сургуч, — и фонтан тотчас же снова




Рис 103 Грозовой ливень в миниатюре

распылится, а характерный стук сменится мягким шумом раздробленной струи.

Перед непосвященными вы можете действовать палочкой сургуча, как фокусник “волшебным” жезлом.

Объяснение столь неожиданного действия электрического заряда на фонтан основано на том, что капли электризуются через влияние, причем обращенные к сургучу части капле электризуются положительно, противоположные — отрицательно; таким образом, разноименно наэлектризованные части капле оказываются в близком соседстве и, притягиваясь, заставляют капли сливаться.




Рис 104 Водяная струя отклоняется при приближении наэлектризованного гребня

Действие электричества на водяную струю вы можете обнаружить и проще; достаточно приблизить проведенный по волосам эбонитовый гребень к тонкой струе воды, вытекающей из водопроводного крана: струя становится сплошной и заметно искривляется по направлению к гребню, резко отклонившись в сторону (рис. 104). Объяснение этого явления сложнее, чем предыдущего; оно связано с изменением поверхностного натяжения под действием электрического заряда.

Заметим между прочим, что легкостью, с какой образуется электрический заряд при трении, объясняется и электризация передаточных ремней, трущихся о шкивы. Выделяющиеся электрические искры представляют на некоторых производствах серьезную опасность в пожарном отношении. Чтобы этого избежать, серебрят передаточные ремни: тонкий слой серебра делает ремень проводником электричества, и накопление заряда становится невозможным ¹².

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕЛОМЛЕНИЕ СВЕТА. ЗРЕНИЕ

Пятикратный снимок

Одним из курьезов фотографического искусства являются снимки, на которых фотографируемый изображен в пяти различных поворотах. На рис. 105, воспроизведенном с подобной фотографии, можно видеть эти пять положений.




Рис 105 Пятикратная фотография одного и того же лица.

Такие фотографии имеют то несомненное преимущество перед обыкновенными, что дают более полное представление о характерных особенностях оригинала: известно, как много заботятся фотографы о том, чтобы придать лицу снимаемого наиболее выгодный поворот; здесь же сразу получается лицо в нескольких поворотах, среди которых больше возможности уловить самый характерный.

Как получаются эти фотографии? Конечно, с помощью зеркал (рис. 106). Фотографируемый садится спиной к аппарату *A* и лицом к двум отвесным плоским зеркалам *C*,

сходящимся под углом в одну пятую долю от 360° , т. е. в 72° . Такая пара зеркал должна давать четыре изображения, повернутые различным образом по отношению к аппарату. Эти изображения плюс натуральный объект и фотографируются аппаратом, причем сами зеркала (не имеющие рам) на снимке, конечно, не получаются. Чтобы в зеркалах не отразился фотографический аппарат, его заслоняют двумя экранами (ВВ) с небольшой щелью для объектива




Рис 106 Способ получения пятикратных фотографий снимаемый помещается между зеркалами СС

Число изображений зависит от угла между зеркалами чем он меньше, тем число получающихся изображений больше. При угле $360^\circ/4 = 90^\circ$ мы получили бы четыре изображения, при угле $360^\circ/6 = 60^\circ$ — шесть изображений, при $360^\circ/8 = 45^\circ$ — восемь, и т. д. Однако при большом числе отражений изображения тусклы и слабы, поэтому обычно ограничиваются пятикратными снимками¹

Солнечные двигатели и нагреватели

Очень заманчива мысль использовать энергию солнечных лучей для нагревания котла двигателя. Произведем несложный расчет. Энергия, в единицу времени получаемая от Солнца каждой единицей поверхности внешней части нашей атмосферы, расположенной под прямым углом к солнечным лучам, тщательно подсчитана. Количество ее, по-видимому, неизменно: оттого оно и названо “солнечной постоянной”. Солнечная постоянная равна (с округлением) $1,4 \text{ кВт/м}^2$. Этот тепловой поток, регулярно посылаемый Солнцем, достигает поверхности Земли не полностью: около 25 % его поглощается в атмосфере. Можно считать, что квадратный метр земной поверхности перпендикуляр

но озаряемый солнечными лучами, получает ежесекундно около 1 кДж энергии.

Такую работу могла бы произвести лучистая энергия Солнца при самых благоприятных условиях— при перпендикулярном падении и стопроцентном превращении. Однако до сих пор осуществляющиеся попытки прямого использования Солнца как двигательной силы были далеки от таких идеальных условий: их полезное действие не превышало 5—6%. Из осуществленных установок наибольший коэффициент полезного действия имел солнечный двигатель известного физика Аббота: 15% ²




Рис 107 Солнечная водонагревательная установка в Ташкенте

Легче воспользоваться лучистой энергией Солнца не для получения механической работы, а для нагревания. В Ташкенте в начале 30-х годов открылась солнечная баня, пропускавшая 70 человек в сутки. В том же Ташкенте была оборудована гелиоустановка на крыше одного из домов (рис. 107). Здесь было установлено 20 солнечных котлов на 200 ведер воды, которые целиком обеспечивали ею весь дом. По заявлению гелиотехников, солнце бесперебойно согревало котлы 7—8 месяцев в году; остальные 4—5 месяцев котлы могли нагревать воду только в ясные дни ³. Средний КПД водонагревателей был сравнительно высок— он составлял 47% (максимальный достигал 61%).

В Туркмении был испытан солнечный холодильник (рис 108). Температура охлаждающих батарей в камерах

холодильника была -3°C при температуре окружающего воздуха 42°C в тени. Это первый пример промышленной солнечной холодильной установки

Отличные результаты дали опыты солнечной плавки серы (температура плавления 120°C) ⁴. Упомянем еще о солнечных опреснителях для получения пресной воды на побережье Каспийского и Аральского морей, о солнечных водоподъемниках для замены первобытных среднеазиатских чигирей, о солнечных сушилках для фруктов и рыбы, о




Рис. 108. Солнечный склад-холодильник в Туркменской ССР.

кухне, где все блюда приготавливаются “на лучах Солнца”, и т. п. Все это не исчерпывает разнообразных применений искусственно уловленных солнечных лучей, которым предстоит сыграть видную роль в народном хозяйстве Средней Азии, Кавказа, Крыма, Нижней Волги и южной Украины.

Мечта о шапке-невидимке

Седой древностью оставлена нам легенда о чудесной шапке, которая делает невидимым каждого, кто ее наденет. Пушкин, ожививший в “Руслане и Людмиле” преданья старины глубокой, дал классическое описание волшебных свойств шапки-невидимки:

И девице пришло на ум,
В волненьи своенравных дум,
Примерить шапку Черномора..
Людмила шапкой завертела;
На брови, прямо, набекрень.
И задом наперед надела.
И что ж? О, чудо старых дней!
Людмила в зеркале пропала;
Перевернула — перед ней

Людмила прежняя предстала;
Назад надела — снова нет;
Сняла — и в зеркале! "Прекрасно!"
Добро, колдун! Добро, мой свет!
Теперь мне здесь уж безопасно"...

Способность становиться невидимой была единственной защитой для пленной Людмилы. Под надежным покровом невидимости она ускользала от пристальных взоров своих стражей. О присутствии незримой пленницы могли догадываться только по ее действиям:

Везде всечасно замечали
Ее минутные следы:
То позлащенные плоды
На шумных ветвях исчезали,
То капли ключевой воды
На луг измятый упали,
Тогда наверно в замке знали,
Что пьет иль кушает княжна
Едва редела ночи мгла, —
Людмила к водопаду шла
Умыться холодной струею.
Сам Карла утренней порою
Однажды видел из палат,
Как под невидимой рукою
Плескал и брызгал водопад.

Давно уже осуществлены многие заманчивые мечты древности; немало сказочных волшебств сделалось достоянием науки. Пробираются горы, улавливаются молнии, летают на коврах-самолетах... Нельзя ли изобрести и "шапку-невидимку", т. е. найти средство сделать себя совершенно невидимым? Об этом мы сейчас побеседуем.

Невидимый человек

В романе "Человек-невидимка" английский писатель Уэллс стремится убедить своих читателей, что возможность стать невидимым вполне осуществима. Его герой (автор романа представляет его нам как "гениальнейшего физика, какого когда-либо видел мир") открыл способ делать человеческое тело невидимым. Вот как излагает он знакомому врачу основания своего открытия:

"Видимость зависит от действия видимых тел на свет. Вы знаете, что тела или поглощают свет, или отражают его, или преломляют. Если тело не поглощает, не отражает и не преломляет света, оно не может

быть видимо само по себе. Видишь, например, непрозрачный красный ящик потому, что краска поглощает некоторую долю света и отражает (рассеивает) остальные лучи. Если бы ящик не поглощал никакой доли света, а отражал его весь, он казался бы блестящим белым ящиком, серебряным. Бриллиантовый ящик поглощал бы мало света, общая его поверхность отражала бы его также немного; только местами, на ребрах, свет отражался бы и преломлялся, давая нам блестящую видимость сверкающих отражений — нечто вроде светового скелета. Стекланный ящик блестел бы меньше, был бы не так отчетливо виден, как бриллиантовый, потому что в нем было бы меньше отражений и меньше преломлений. Если же положить кусок обыкновенного белого стекла в воду и, тем более, если положить его в какую-нибудь жидкость плотнее воды, он исчезнет почти совершенно, потому что свет, попадающий сквозь воду на стекло, преломляется и отражается очень слабо. Стекло становится столь же невидимым, как струя углекислоты или водорода в воздухе, по той же самой причине.

— Да, — сказал Кемп (врач — Я П), — все это очень просто и в наше время известно каждому школьнику.

— А вот и еще факт, также известный каждому школьнику. Если кусок стекла растолочь и превратить в порошок, он становится гораздо более заметным в воздухе, — он становится непрозрачным белым порошком. Происходит это потому, что толчение умножает грани стекла, производящие отражение и преломление. У пластинки только две грани, а в порошке свет отражается и преломляется каждой крупинкой, через которую проходит, и сквозь порошок его проникает очень мало. Но если белое толченое стекло положить в воду, — оно сразу исчезнет. Толченое стекло и вода имеют приблизительно одинаковый показатель преломления, так что, переходя от одного к другому, свет преломляется и отражается очень мало.




Рис 109 Невидимая
стеклянная палочка

Положив стекло в какую-нибудь жидкость с почти одинаковым показателем преломления, вы делаете его невидимым: *всякая прозрачная вещь становится невидимой, если ее поместить в среду с одинаковым с ней показателем преломления.* Достаточно подумать самую малость, чтобы убедиться, что стекло можно сделать невидимым и в воздухе: надо устроить так, чтобы его показатель преломления равнялся показателю преломления воздуха, потому что тогда, переходя от стекла к воздуху, свет не будет ни отражаться, ни преломляться вовсе*.

* Полной невидимости совершенно прозрачного предмета мы можем добиться, если окружим его стенками, рассеивающими свет строго равномерно. Глаз, который смотрит внутрь через небольшое боковое

— Да, да, — сказал Кемп. — Но ведь человек — не то, что стекло.

— Нет, он прозрачнее.

— Вздор!

— И эта говорит естественник! Неужели за десять лет вы успели совсем забыть физику? Бумага, например, состоит из. прозрачных волоконцев, она бела и непроницаема потому же, почему же бел и непроницаем стеклянный порошок. Намажьте белую бумагу, наполните маслом промежутки между волокнами так, чтобы преломление и отражение происходили только на поверхностях, — и бумага станет прозрачной, как стекло. И не только бумага, но и волокна полотна, волокна шерсти, волокна дерева, наши кости, мускулы, волосы, ногти и нервы! Словом, весь состав человека, кроме красного вещества в его крови и темного пигмента волос, — все состоит из прозрачной, бесцветной ткани; вот как немного делает нас невидимыми друг другу! “

Подтверждением этих соображений может служить тот факт, что не покрытые шерстью животные-альбиносы (такие которых не содержат красящих веществ) отличаются в значительной мере прозрачностью. Зоолог, нашедший летом 1934 г. в Детском Селе экземпляр белой лягушки-альбиноса, описывал ее так: “Тонкие кожные и мышечные ткани просвечивают: видны внутренности, скелет... Очень хорошо у лягушки-альбиноса видно через брюшную стенку сокращение сердца и кишок”.

Герой романа Уэллса изобрел способ делать прозрачными ткани человеческого организма и даже его красящие веще-

отверстие, получит тогда от всех точек предмета как раз столько света, как если бы предмета вовсе не существовало: никакие блики или тени не обнаружат его присутствия.

Вот как может быть обставлен подобный опыт. Воронку, диаметром в полметра, из белого картона устанавливают, как показано на рис. 109, на некотором расстоянии от 25-свечовой электрической лампочки. Снизу вводят стеклянную палочку, по возможности строго вертикально. Малейшее отклонение от вертикального положения делает то, что палочка кажется темной по оси и светлой по краям либо же, наоборот, светлой по оси и темной по краям. Обе картины освещения переходят одна в другую при легком изменении положения палочки. После ряда проб можно добиться совершенно равномерного освещения палочки, — и тогда она для глаза, смотрящего сквозь узкое (не шире 1 см) боковое отверстие, *исчезает совершенно*. При такой обстановке опыта достигается полная невидимость стеклянного предмета, несмотря на то, что его преломляющая способность сильно отличается от преломляющей способности воздуха.

Другой прием, с помощью которого можно сделать невидимым, например, кусок граненого стекла, состоит в том, чтобы поместить его в ящик, покрытый изнутри светящейся краской. — Я. П.

тва (пигменты) Он с успехом применил свое открытие к собственному телу Опыт удался блестяще,— изобретатель стал совершенно невидимым. О дальнейшей судьбе этого невидимого человека мы сейчас узнаем.

Могущество невидимого

Автор романа “Человек-невидимка” с необыкновенным остроумием и последовательностью доказывает, что человек, сделавшись прозрачным и невидимым, приобретает благодаря этому почти безграничное могущество Он может незаметно проникать в любое помещение и безнаказанно похищать любые вещи, неуловимый, благодаря своей невидимости, он успешно борется с целой толпой вооруженных людей. Угрожая всем видимым людям неизбежной тяжелой карой, невидимый человек держит в полном подчинении население целого города. Неуловимый и неуязвимый, он в то же время имеет полную возможность вредить всем остальным людям; как бы ни ухитрялись они защищаться, невидимый враг рано или поздно настигает их и поражает. Столь исключительное положение среди прочих людей дает герою английского романа возможность обращаться к уstraшенному населению своего города с приказами, например, такого содержания

“Город отныне уже не под властью королевы! Скажите это вашему полковнику, полиции и всем, он под моей властью! Нынешний день— первое число первого года новой эры, эры Невидимого! Я— Невидимый Первый Сначала правление мое будет милостиво В первый день будет всего одна казнь, ради примера, казнь человека, имя которого Кемп Сегодня же его постигнет смерть. Пусть запирается, пусть прячется, пусть окружит себя стражей, пусть закует себя в броню,— смерть, невидимая смерть идет к нему! Пусть принимает меры предосторожности,— это произведет впечатление на мой народ. Смерть идет к нему! Не помогай ему, народ мой, чтобы и тебя не постигла смерть”

И на первых порах невидимый человек торжествует. Лишь с величайшим трудом удастся запуганному населению справиться с невидимым врагом, мечтавшим сделаться его властелином.

Прозрачные препараты

Верны ли физические рассуждения, которые положены в основу этого фантастического романа? Безусловно. Всякий прозрачный предмет в прозрачной среде становится

невидимым уже тогда, когда разница в показателях преломления меньше 0,05. Спустя десять лет после того, как английский романист написал своего “Невидимку”, немецкий анатом Шпальтегольц осуществил его идею на практике,— правда, не для живых организмов, а для мертвых препаратов. Можно видеть теперь эти прозрачные препараты частей тела, даже целых животных, во многих музеях.

Способ приготовления прозрачных препаратов, разработанный (в 1911 г.) Шпальтегольцем, состоит в том, что после известной обработки— беления и промывания— препарат пропитывается метиловым эфиром салициловой кислоты (это бесцветная жидкость, обладающая сильным лучепреломлением). Приготовленный таким образом препарат погружают в сосуд, наполненный той же жидкостью.

При этом, разумеется, не стремятся достичь *полной* прозрачности препаратов, так как в таком случае они стали бы совершенно невидимыми, а потому и бесполезными для анатома. Но при желании возможно было бы достичь и этого.

Конечно, отсюда еще далеко до осуществления уэллсовой утопии о *живом* человеке, прозрачным настолько, что он совершенно невидим. Далеко потому, что надо еще, во-первых, найти способ пропитать просветляющей жидкостью ткани *живого* организма, не нарушая его отправлений.

Во-вторых, препараты Шпальтегольца только прозрачны, но не невидимы; ткани этих препаратов могут быть невидимы лишь до тех пор, пока они погружены в сосуд с жидкостью соответствующей преломляемости. Они будут невидимы в воздухе только тогда, когда показатель их преломления будет равняться показателю преломления *воздуха*, а как этого достигнуть, мы еще не знаем.

Но допустим, что удастся со временем добиться того и другого, а следовательно, осуществить на деле мечту английского романиста.

В романе все предусмотрено и обдуманно автором с такой тщательностью, что невольно поддаешься убедительности описываемых событий. Кажется, что невидимый человек в самом деле должен быть могущественнейшим из смертных. Но это не так.

Есть одно маленькое обстоятельство, которое упустил остроумный автор “Невидимки”. Это вопрос о том,— может ли невидимый видеть.

Может ли невидимый видеть?

Если бы Уэллс задал себе этот вопрос прежде, чем написать роман, изумительная история “Невидимки” никогда не была бы написана...

В самом деле, в этом пункте разрушается вся иллюзия могущества невидимого человека. *Невидимый должен быть слеп!*

Отчего герой романа невидим? Оттого, что все части его тела — в том числе и глаза — сделались прозрачными, и притом показатель их преломления равен показателю преломления воздуха.

Вспомним, в чем состоит роль глаза: его хрусталик, стекловидное тело и другие части преломляют лучи света так, что на сетчатой оболочке получается изображение внешних предметов. Но если преломляемость глаза и воздуха одинакова, то тем самым устраняется единственная причина, вызывающая преломление: переходя из одной среды в другую *равной преломляемости*, лучи не меняют своего направления, а потому и не могут собираться в одну точку. Лучи будут проходить через глаза невидимого человека совершенно беспрепятственно, не преломляясь и не задерживаясь в них, ввиду отсутствия пигмента

Итак, *невидимый человек не может ничего видеть*. Все его преимущества оказываются для него бесполезными. Грозный претендент на власть бродил бы ощупью, прося милостыню, которой никто не мог бы ему подать, так как проситель невидим. Вместо могущественнейшего из смертных перед нами был бы беспомощный калека, обреченный на жалкое существование... **.

* Чтобы вызвать какое-нибудь ощущение у животного, лучи света должны произвести в его глазу некоторые, хотя бы самые незначительные, изменения, т. е. выполнить определенную *работу*. Для этого лучи должны хотя бы в некоторой части *задерживаться* глазом. Но совершенно прозрачный глаз, конечно, не может задерживать лучи: иначе он не был бы прозрачен. У всех животных, которые защищаются тем, что они прозрачны, глаза, если они имеются, не бывают вполне прозрачны. “Непосредственно под поверхностью моря, — пишет известный океанограф Меррей, — большинство животных прозрачно и бесцветно; когда их извлекают сетью, их можно отличить *только по маленьким черным глазам*, так как кровь их лишена гемоглобина (красящего вещества) и совершенно прозрачна”

** Возможно, что романист допустил этот существенный промах вполне

Итак, в поисках “шапки-невидимки” бесполезно идти по пути, указываемому Уэллсом, — этот путь, даже при полном успехе поисков, не может привести к цели ⁵.

Охранительная окраска

Но есть и другой путь к разрешению задачи “шапки-невидимки”. Он состоит в окраске предметов соответствующим цветом, делающим их незаметными для глаза. К нему постоянно прибегает природа: наделяя свои создания “охранительной” окраской, она в самом широком масштабе пользуется этим простым средством, чтобы защищать свои создания от врагов или облегчать им трудную борьбу за существование.

То, что военные называют “защитным цветом”, зоологи со времени Дарвина называют охранительной или покровительственной окраской. Примеров такой защиты в мире животных можно привести целые тысячи; мы встречаемся с ними буквально на каждом шагу. Животные, обитающие в пустыне, имеют большей частью характерный желтоватый “цвет пустыни”; вы находите этот цвет и у льва, и у птицы, и у ящерицы, у паука, у червя, — словом, у всех представителей пустынной фауны. Напротив, животные, населяющие снежные равнины Севера, — будь то опасный полярный медведь или безобидная гагара — наделены от природы белой окраской, делающей их незаметными на фоне снега. Бабочки и гусеницы, живущие на коре деревьев, имеют соответствующую окраску, с поразительной точностью воспроизводящую цвет древесной коры (“монашенка” и др.).

Каждый собиратель насекомых знает, как трудно найти их из-за “защитного цвета”, которым наделила их природа. Попробуйте поймать зеленого кузнечика, стрекочущего на лугу у ваших ног, — вы не сможете различить его на зеленом фоне, поглощающем его бесследно.

сознательно. Известно, к какому литературному приему прибегает обычно Уэллс в своих фантастических произведениях: он заслоняет для читателей основной дефект фантастического построения обилием реалистических подробностей. В предисловии к американскому изданию его фантастических романов он прямо пишет: “Как только магический фокус проделан, нужно все прочее показать правдоподобным и обыденным. Надеяться нужно не на силу логических доводов, а на иллюзию, создаваемую искусством”

То же относится и к водным обитателям. Морские животные, водящиеся среди бурых водорослей, все имеют “защитный” бурый цвет, делающий их неуловимыми для глаз. В зоне красных водорослей преобладающим “защитным цветом” является красный. Серебристый цвет рыбьей чешуи — тоже “защитный”. Он оберегает рыб и от хищных птиц, высматривающих их сверху, и от хищников водной стихии, угрожающих им снизу: водная поверхность имеет зеркальный вид не только при рассмотрении сверху, но еще больше при взгляде снизу, из самой толщи воды (“полное отражение”), и с этим-то блестящим металлическим фоном сливается серебристая рыба чешуя. А медузы и другие прозрачные обитатели вод — черви, ракообразные, моллюски, сальпы — избрали своим “защитным цветом” полную бесцветность и прозрачность, делающую их невидимыми в окружающей бесцветной и прозрачной стихии.

“Уловки” природы в этом отношении далеко превосходят человеческую изобретательность. Многие животные обладают способностью изменять оттенок своего “защитного” цвета сообразно переменам окружающей обстановки. Серебристо-белый горноста́й, незаметный на фоне снега, утратил бы все преимущества защитной окраски, если бы с таянием снегов не изменил цвета своей шкурки; и вот, каждую весну белый зверек получает новую шубку рыжего цвета, сливающуюся с окраской обнаженной от снега почвы, а с наступлением зимы вновь седеет, облакаясь в белоснежный зимний наряд ⁶.

Защитный цвет

Люди переняли у изобретательной природы это полезное искусство делать свое тело незаметным, сливаться с окружающим фоном. Пестрые краски блестящего обмундирования прежних времен, придававшие живописность батальным картинам, навсегда отошли в прошлое: их вытеснила знакомая одноцветная обмундировка защитного цвета. Серо-стальная окраска военных судов — тоже защитный цвет, делающий суда мало-различимыми на фоне моря.

Сюда же относится к так называемый “тактический камуфляж”: военная маскировка отдельных предметов — укреплений, орудий, танков, кораблей, искусственный туман и тому подобные меры введения противника в заблуждение.

Маскируют лагерь особыми сетями, в ячейки которых вплетены пучки травы; бойцы надевают халаты с пучками мочалы, окрашенной в цвет травы, и т. п.

Широко применяется защитный цвет и маскировка в военной авиации. Самолет, окрашенный в коричневый, темно-зеленый и фиолетовый цвета (соответствующие расцветке поверхности Земли), при наблюдении с самолета сверху становится трудно отличимым от фона земной поверхности.

Маскировка же нижних поверхностей самолета от наблюдения с Земли производится окрашиванием их под цвет, соответствующий фону неба: светло-голубой, светло-розовый и белый. Краска эта располагается на поверхности самолета небольшими пятнами. На высоте 750 м эти цвета сливаются в общий малозаметный фон. На высоте 3000 м самолеты, имеющие подобную маскировку, становятся невидимыми. Бомбовозы, предназначенные для налетов в ночное время, окрашиваются в черный цвет.

Защитным цветом, пригодным для *всякой* обстановки, была бы *зеркальная* поверхность, отражающая фон. Предмет с такой поверхностью автоматически принимает вид и окраску окружающей среды; обнаружить его присутствие с дальнего расстояния почти невозможно. Немцы во время первой мировой войны применяли этот принцип для цеппелинов: поверхность многих цеппелинов была блестящая алюминиевая, отражающая небо и облака; заметить такой цеппелин при полете очень трудно, если его не выдает шум мотора.

Так осуществляются в природе и военной технике мечты народных сказок о шапке-невидимке.

Человеческий глаз под водой

Вообразите, что вам дана возможность оставаться под водой сколь угодно долго и что вы при этом держите глаза открытыми. Могли бы вы там видеть?

Казалось бы, раз вода прозрачна, ничто не должно мешать видеть под водой так же хорошо, как и в воздухе. Вспомните, однако, о слепоте “невидимого человека”, который не в состоянии видеть потому, что показатели преломления его глаза и воздуха одинаковы. Под водой мы находимся приблизительно в тех же условиях, как и “невидимка” в воздухе. Обратимся к цифрам,— дело станет яснее. Показатель преломления воды 1,36. А вот

показатели преломления прозрачных сред человеческого глаза:

Роговая оболочка и стекловидное тело	1,34
Хрусталик	1,43
Водянистая влага	1,34

Вы видите, что преломляющая способность хрусталика всего на $1/10$ сильнее, чем у воды, у остальных же частей нашего глаза она *одинакова* с преломляемостью воды. Поэтому под водой фокус лучей получается в глазу человека далеко позади сетчатой оболочки; следовательно, на самой сетчатке изображение должно вырисовываться смутно, различить что-либо можно лишь с трудом. Только очень близорукие люди видят под водой более или менее нормально.




Рис. 110. Глаз рыбы в разрезе.

Если хотите наглядно представить себе, как должны рисоваться нам вещи под водой, наденьте очки с сильно рассеивающими (*двоояковогнутыми*) стеклами; тогда фокус лучей, преломляющихся в глазу, отодвинется далеко за сетчатку, и окружающее предстанет перед вами в неясных, туманных образах.

Не может ли человек под водой помочь своему зрению, пользуясь сильно преломляющими стеклами?

Обыкновенные стекла, употребляемые для очков, здесь мало пригодны: показатель преломления простого стекла 1,5, т. е. лишь немногим больше, чем у воды (1,34); такие очки будут преломлять под водой очень слабо. Нужны стекла особого сорта, отличающиеся чрезвычайно сильной преломляющей способностью (так называемый “тяжелый флинтглас” имеет показатель преломления, почти равный 2). С такими очками мы могли бы более или менее отчетливо видеть под водой (о специальных очках для ныряющих см. далее).

Теперь понятно, почему у рыб хрусталик имеет чрезвычайно выпуклую форму; он шарообразен, и показатель его преломления — самый большой из всех, какие нам известны в глазах животных. При аккомодации хрусталик не изменяет форму, а перемещается так, как показано на рис. 110. Не

будь этого, глаза были бы почти бесполезны рыбам, обреченным на жизнь в сильно преломляющей прозрачной среде

Как видят водолазы?

Многие, вероятно, спросят: как же могут водолазы, работающие в своих скафандрах, видеть что-либо под водой, если глаза наши в воде почти не преломляют лучей света? Ведь водолазные шлемы всегда снабжаются плоскими, а не выпуклыми стеклами... Далее, могли ли пассажиры жюльвернова “Наутилуса” любоваться через окно своей подводной каюты ландшафтом подводного мира?

Перед нами новый вопрос, на который, впрочем, нетрудно ответить. Ответ станет ясен, если принять во внимание, что, когда мы находимся под водой без водолазного костюма, вода *непосредственно* прилегает к нашему глазу; в водолазном же шлеме (или в каюте “Наутилуса”) глаз *отделен от воды слоем воздуха* (и стекла). Это существенно меняет дело. Лучи света, выходя из воды и пройдя через стекло, попадают сначала в воздух и лишь отсюда проникают в глаз. Падая из воды на *плоскопараллельное* стекло под каким-либо углом, лучи, по законам оптики, выходят из стекла, *не меняя направления*; но далее, при переходе из воздуха в глаз, лучи, конечно, преломляются, — и глаз при этих условиях действует совершенно так же, как и на суше. В этом и кроется разгадка смутившего нас противоречия. Лучшая иллюстрация ее — это то, что мы вполне хорошо видим рыб плавающих в аквариуме.

Стеклянные чечевицы под водой

Пробовали ли вы делать такой простой опыт: погрузить “увеличительное” (двояковыпуклое) стекло в воду и рассматривать через него погруженные предметы? Попробуйте, — вас поразит неожиданность: увеличительное стекло в воде почти не увеличивает! Погрузите в воду “уменьшительное” (двояковогнутое) стекло, — и окажется, что оно почти утратит свойство уменьшать. Если вы проделаете опыт не с водой, а с растительным маслом (например, кедровым), имеющим показатель преломления больший, чем стекло, то двояковыпуклое стекло будет *уменьшать* предметы, двояковогнутое — *увеличивать* их!

Вспомните, однако, закон преломления лучей света, — и эти чудеса не будут удивлять вас своей необычностью. Двояковыпуклая чечевица увеличивает в воздухе потому, что стекло преломляет свет сильнее, нежели окружающий ее воздух. Но между преломляющей способностью стекла и воды разница невелика; поэтому если вы поместите стеклянную чечевицу в воду, то лучи света, переходя из воды в




Рис 111 Очки для ныряющих состоят из полых плоско-вогнутых линз

стекло, не испытают большого отклонения. Оттого-то под водой увеличительное стекло гораздо слабее увеличивает, чем в воздухе, а уменьшительное — слабее уменьшает.

Растительное же масло преломляет лучи сильнее, чем стекло, и потому в этой жидкости “увеличительные” стекла уменьшают, а “уменьшительные” увеличивают. Так же действуют под водой и полые (вернее, воздушные) линзы: вогнутые увеличивают, выпуклые —

уменьшают. Очки для ныряющих представляют собой именно такие полые линзы (рис. 111). Луч MN , преломляясь, следует по пути $MNOP$, удаляясь внутри линзы от перпендикуляра падения и *приближаясь* к нему (т. е. к OR) вне линзы. Поэтому полая линза действует как увеличительное стекло.

Неопытные купальщики

Неопытные купальщики нередко подвергаются большой опасности только потому, что забывают об одном любопытном следствии закона преломления света: они не знают, что преломление словно поднимает все погруженные в воду предметы выше истинного их положения. Дно пруда, реки, каждого водоема представляется глазу *приподнятым* почти на третью часть глубины; полагаясь на эту обманчивую мелкость, люди нередко попадают в опасное положение. Особенно важно знать это детям и вообще людям невысокого роста, для которых ошибка в определении глубины может оказаться роковой.

Причина — преломление световых лучей. Тот же оптический закон, который придает полупогруженной в

воду ложке изломанный вид (рис. 112), обуславливает и кажущееся поднятие дна.

Вы можете проверить это.

Посадите товарища за стол так, чтобы он не мог видеть дна стоящей перед ним чашки. На дно ее положите монету, которая, разумеется, будет заслонена стенкой чашки от глаз вашего товарища. Теперь попросите товарища не поворачивать головы и налейте в чашку воды. Произойдет нечто неожиданное (рис. 113): монета делается для вашего гостя видимой! Удалите воду из чашки спринцовкой, — и дно с монетой опять опустится.

Рис. 114 объясняет, как это происходит. Участок дна m кажется наблюдателю (глаз которого — над водой, в точке A) в приподнятом положении; лучи преломляются, и, переходя из воды в воздух, вступают в глаз, который видит участок на продолжении этих линий, т. е. над m . Чем наклоннее идут лучи, тем выше поднимается m . Вот почему при рассмотрении, например, с лодки ровного дна пруда нам всегда кажется, что оно наиболее глубоко прямо под нами, а кругом — все мельче и мельче.




Рис. 112.
Искаженное
изображение
ложки, опущенной
в стакан с водой.




Рис. 113. Опыт с монетой в чашке.




Рис. 114. Почему монета кажется приподнявшейся.

Итак, дно пруда кажется *вогнутым*. Наоборот, если бы мы могли со дна пруда смотреть на перекинутый через него мост, он казался бы нам *выпуклым* (как изображено на рис. 115; о

способе получения этой фотографии будет сказано позже) В данном случае лучи переходят из слабо преломляющей среды (воздуха) в сильно преломляющую (воду), поэтому и эффект получается обратный, чем при переходе лучей из воды в воздух. По сходной причине и ряд людей, стоящих,




Рис 115 В таком виде представляется подводному наблюдателю железнодорожный мост, перекинутый через реку

например, возле аквариума с плоскими стенками, должен казаться рыбам не прямой шеренгой, а дугой, обращенной своей выпуклостью к рыбе. О том, как видят рыбы, или, вернее, как они должны были бы видеть, если бы имели человеческие глаза, мы далее побеседуем подробнее.

Невидимая булавка

Воткните булавку в плоский пробковый кружок и положите его булавкой вниз на поверхность воды в миске. Если пробка не чересчур широка, то, как бы ни наклоняли вы голову, вам не удастся увидеть булавку — хотя, казалось бы, она достаточно длинна, чтобы пробка не заслоняла ее от вас (рис 116).

Почему же лучи света не доходят от булавки до вашего глаза? Потому что они претерпевают то, что в физике называется ‘полным внутренним отражением’.

Напомним, в чем состоит это явление.

На рис 117 можно проследить за ходом лучей, переходящих из воздуха в воду (вообще из среды менее преломляющей в среду более преломляющую) и обратно. Когда лучи идут *из воздуха в воду*, то они приближаются к “перпендикуляру падения”, например, луч, падающий на воду под углом β к перпендикуляру к плоскости падения, вступает в нее уже под углом α , который *меньше*, чем β (рис. 117, а).




Рис. 116 Опыт с булавкой, невидимой в воде

Но что бывает, когда падающий луч, скользя по поверхности воды, падает на водную поверхность почти под прямым углом к перпендикуляру? Он вступает в воду под углом, меньшим чем прямой, а именно под углом всего в $48,5^\circ$. Под большим углом к перпендикуляру, чем $48,5^\circ$, луч вступить в воду не может, это для воды “предельный” угол (рис. 117, б).

Необходимо уяснить себе эти несложные соотношения, чтобы понять дальнейшие следствия закона преломления




Рис 117 Преломление лучей при переходе из воздуха в воду.

Мы сейчас узнали, что лучи, падающие на воду под всевозможными углами, сжимаются *под водой* в довольно тесный конус с углом раствора $48,5^\circ + 48,5^\circ = 97^\circ$ (рис. 117, в)

Проследим теперь за ходом лучей, идущих обратно (из точки Р) — из воды в воздух (рис. 118). По законам оптики пути будут те же самые, и все лучи, заключенные в упомянутом 97-градусном конусе, выйдут в воздух под различными углами, распределяясь по всему 180-градусному пространству над водой.

Но куда же денется подводный луч, находящийся вне упомянутого конуса? Оказывается, *он не выйдет вовсе из-под воды, а отразится целиком от ее поверхности, как от зеркала*. Вообще всякий подводный луч ⁷, встречающий поверхность воды под углом большим “предельного” (т. е. большим

48,5°), не преломляется, а отражается. он претерпевает, как говорят физики, “полное внутреннее отражение” *

Если бы рыбы изучали физику, то главнейшим отделом оптики было бы для них учение о “внутреннем отражении”, так как в их подводном зрении оно играет первостепенную роль ⁸.




Рис. 118. Преломление лучей при переходе из воды в воздух.

В связи с особенностями подводного зрения находится, по всей вероятности, то обстоятельство, что многие рыбы имеют серебристую окраску. По мнению зоологов, такая окраска есть результат приспособления рыб к цвету расстилающейся над ними водной поверхности: при наблюдении *снизу* поверхность воды, как мы знаем, кажется зеркальной — вследствие “полного внутреннего отражения”; а на таком фоне серебристо-окрашенные рыбы остаются незаметными для охотящихся на них водных хищников.

Мир из-под воды


Многие и не подозревают, каким необычайным казался бы мир, если бы мы стали рассматривать его из-под воды: он должен представляться наблюдателю измененным и искаженным почти до неузнаваемости.

Вообразите, что вы погружены в воду и смотрите из-под водной скатерти в мир надводный. Облако, висящее в небо прямо над вашей головой, нисколько не изменит своего

* Отражение называется в данном случае *полным* потому, что здесь отражаются все падающие лучи, между тем как даже самое лучшее зеркало (из полированного магния или серебра) отражает только *часть* падающих на него лучей, остальную же поглощает. Вода при указанных условиях является идеальным зеркалом.

вида: отвесный луч не преломляется. Но все остальные предметы, лучи которых встречают водную поверхность под острыми углами, представляются искаженными: они словно сожмутся по высоте — тем сильнее, чем острее угол встречи луча с водной гладью (рис. 119). Это и понятно: весь мир, видимый над водой, должен уместиться в тесном подводном конусе: 180° должны сжаться почти вдвое — до 97° , и изображения неизбежно будут искажаться. Предметы, лучи которых встречают водную гладь под углом в 10° , сжимаются в воде настолько, что почти перестают различаться. Но всего более поразил бы вас вид самой водной поверхности: из-под

Рис 119. Дуга надводного мира в 180° сокращается для подводного наблюдателя до дуги в 97°



воды она представляется вовсе не плоской, а в форме конуса! Вам покажется, что вы находитесь на дне огромной воронки, бока которой наклонены друг к другу под углом немного больше прямого (97°). Верхний край этого конуса окружен радужным кольцом из красной, желтой, зеленой, синей и фиолетовой каемок. Почему? Белый солнечный свет состоит из смеси лучей разных цветов; каждый цвет лучей имеет свой показатель преломления, а потому и свой “пределный угол”. Следствием этого является то, что при рассматривании из-под воды предмет кажется окруженным пестрым ореолом из цветов радуги.

Что же видно далее, за краями конуса, заключающего в себе весь надводный мир? Там расстилается блестящая поверхность воды, в которой, как в зеркале, отражаются *подводные* предметы.

Совершенно необычайный вид приобрели бы для подводного наблюдателя те предметы, которые частью погружены в воду, частью же выступают над ней. Пусть в реку погружена водомерная рейка (рис. 120). Что увидит наблюдатель, помещенный под водой, в точке *A*? Разделим обозреваемое им пространство (360°) на участки и займемся каждым участком отдельно. В пределах угла *1* он увидит дно реки,

если только, конечно, оно достаточно освещено. В угле 2 он увидит подводную часть рейки без искажений. Примерно в угле 3 он увидит отражение той же части рейки, т. е. перевернутую погруженную половину ее (вспомните, что сказано было о “полном внутреннем отражении”). Еще выше подводный наблюдатель увидит выступающую часть




Рис 120 Вид водомерной рейки для подводного наблюдателя

рейки,— но она не составит продолжения подводной, а переместится гораздо выше, совершенно отделившись от своего основания. Разумеется, наблюдателю в голову не придет, что эта витающая рейка составляет продолжение первой! К тому же рейка покажется сильно сжатой, особенно в нижней части,— там деления будут заметно сближены. В угле 4 отражается дно. В угле 5 виден весь надводный мир в форме конической трубы. В угле 6 видно отражение дна от нижней поверхности воды. Дерево на берегу, затопленном разливом, должно из-под воды казаться таким, каким оно изображено на рис 121.

А если бы на месте рейки находились купальщики, то с точки зрения наблюдателя из-под воды (например, рыб) каждый из них как бы раздваивался, превращался в два существа (рис 122): верхнее—безногое, нижнее—безголовое с четырьмя ногами! Когда купальщик удаляется от подводного наблюдателя, верхняя половина его тела все сильнее сжимается в нижней части, на некотором расстоянии почти вся надводная половина туловища пропадает,— остается лишь одна свободно реющая голова




Рис 121. Как представляется из-под воды полузатопленное дерево
(ср. с рис. 120).




Рис. 122. Как купальщики, погруженные до груди в воду,
представляются подводному наблюдателю (ср. с рис. 120)

Можно ли непосредственно, на опыте, проверить эти необычайные выводы? Нырять под воду, мы увидели бы очень мало, даже если бы и приучили себя держать глаза открытыми. Во-первых, водная поверхность *не успевает успокоиться* в те немногие секунды, какие мы способны провести под водой, а сквозь *волнующуюся* поверхность трудно что-либо различить. Во-вторых, как мы уже объяснили ранее, преломление воды мало отличается от преломления прозрачных сред нашего глаза, и на сетчатке получается поэтому неясное изображение; окружающее будет казаться туманным, размытым (см. с. 422). Наблюдение из водолазного колокола, шлема или через стеклянное окно подводной лодки также не может дать желаемых результатов. В этих случаях,— как мы также уже разъяснили,— наблюдатель хотя и находится под водой, но вовсе не в условиях “подводного зрения”: прежде чем попасть в его глаз, лучи света в этих случаях, пройдя стекло, *вновь попадают в воздушную среду* и, следовательно, испытывают обратное преломление; при этом либо восстанавливается прежнее направление луча, либо же он получает новое направление, но во всяком случае не то, которое имел в воде. Вот почему наблюдения из стеклянных окон подводных помещений не могут дать *правильного представления* об условиях “подводного зрения”.

Однако нет надобности быть *самому* под водой, чтобы познакомиться с тем, каким кажется мир из-под воды. Условия подводного зрения можно изучать с помощью особой фотографической камеры, которая внутри наполнена водой. Вместо объектива пользуются при этом металлической пластинкой с просверленной в ней дырочкой. Легко понять, что если все пространство между отверстием и светочувствительной пластинкой наполнено водой, то внешний мир должен изобразиться на пластинке в таком виде, в каком рисуется он подводному наблюдателю. Этим способом американский физик Вуд и получил чрезвычайно любопытные фотографии, одну из которых мы воспроизвели на рис 115. Что касается причины искажения формы надводных предметов для подводного наблюдателя (прямые линии железнодорожного моста получались на фотографии Вуда в виде дуг), то мы указали на нее, когда объясняли, почему плоское дно пруда кажется вогнутым (см. с. 425).

Есть и другой способ непосредственно познакомиться с тем, каким кажется мир подводным наблюдателям: в воду

спокойного пруда можно погрузить зеркало и, дав ему надлежащий наклон, наблюдать в нем отражение надводных предметов. Результаты таких наблюдений подтверждают во всех подробностях те теоретические соображения, которые изложены выше.

Итак, прозрачный слой воды между глазом и предметами вне этого слоя искажает всю картину надводного мира, придает ему фантастические очертания. Существо, которое после жизни на суше очутилось бы в воде, не узнало бы родного мира,— так изменился бы он при рассматривании из глубины прозрачной водной стихии.

Цвета в глубине вод

Картинно описывает смену световых оттенков под водой американский биолог Бийб.

“Мы погрузились в батисфере в воду, и внезапный переход от золотисто-желтого мира в зеленый был неожидан. После того как пена и пузыри сошли с окон, нас залил зеленый свет; наши лица, баллоны, даже вычерненные стены были окрашены им. Между тем, с палубы казалось, что мы погружаемся в темный ультрамарин.

Первое же погружение в воду лишает глаз теплых * (т. е. красных и оранжевых) лучей спектра. Красный и оранжевый цвета словно никогда не существовали, а вскоре и желтые тона были поглощены зелеными. Хотя радостные теплые лучи составляют лишь небольшую часть видимого спектра, но, когда они исчезают на глубине 30 или более метров, остается только холод, мрак и смерть.

По мере того как мы спускались, постепенно исчезали и зеленые тона; на глубине 60 метров уже нельзя было сказать, была ли вода зеленовато-синей или сине-зеленой.

На глубине 180 метров все казалось окрашенным густым, сияющим синим светом. В нем настолько мало было силы освещения, что писать и читать стало невозможно.

На глубине 300 метров я попытался определить цвет воды— черно-синий, темно-серино-синий. Странно, что, когда синий цвет пропадает, его не заступает фиолетовый— последний в видимом спектре: он, по-видимому, уже поглощен. Последний намек на синее переходит в неопределимый серый цвет, а серый, в свою очередь, в черный. Начиная с этого уровня солнце побеждено, и цвета изгнаны навсегда, пока не проникнет сюда человек и не пронизет электрическим лучом то, что в течение миллиардов лет было абсолютной чернотой.”

* Здесь слово “теплый” употреблено в том смысле, какой придают этому слову художники, характеризуя оттенки цветов; “теплыми” они называют красный и оранжевый, в отличие от “холодных”— синего и голубого. — Я П

О темноте на большой глубине тот же исследователь пишет в другом месте следующее:

“Тьма на глубине 750 метров казалась черней, чем можно вообразить, — и все же теперь (на глубине около 1000 метров) она казалась чернее черного. Казалось, все предстоящие ночи в верхнем мире будут восприниматься только как относительные степени сумерек. И никогда более не мог я применять слово “черный” с твердым убеждением”⁹.

Слепое пятно нашего глаза

Если вам скажут, что в поле вашего зрения есть участок, который вы совершенно не видите, хотя он находится прямо перед вами, вы этому, конечно, не поверите. Возможно ли, чтобы мы всю жизнь не замечали такого крупного недостатка своего зрения? А между тем, вот простой опыт, который убедит вас в этом.




Рис. 123. Фигура для обнаружения слепого пятна.

Держите рис. 123 на расстоянии сантиметров 20 от вашего правого глаза (закрывши левый) и смотрите на крестик, помещенный слева; медленно приближайте рисунок к глазу: непременно наступит момент, когда большое черное пятно на скрещении обеих окружностей *бесследно исчезнет!* Вы его не увидите, хотя оно будет оставаться в пределах видимого участка, а *обе окружности справа и слева от него будут отчетливо видны!*

Этот опыт, впервые произведенный в 1668 г. (в несколько ином виде) знаменитым физиком Мариоттом, очень забавлял придворных Людовика XIV. Мариотт проделывал опыт так: помещал двух вельмож на расстоянии 2 м друг против друга и просил их рассматривать одним глазом некоторую точку сбоку, — тогда каждому казалось, что у его визави нет головы.

Как это ни странно, но люди только в XVII веке узнали, что на сетчатке их глаз существует “слепое пятно”, о котором никто раньше не думал. Это то место сетчатой обо-

лочки, где зрительный нерв вступает в глазное яблоко и еще не разделяется на мелкие разветвления, снабженные элементами, чувствительными к свету.

Мы не замечаем черной дыры в поле нашего зрения вследствие долговременной привычки. Воображение невольно заполняет этот пробел подробностями окружающего фона; так, на рис. 123 мы, не видя пятна, мысленно продолжаем линии окружностей и убеждены, будто ясно видим то место, в котором они пересекаются.

Если вы носите очки, то можете проделать такой опыт: наклейте кусочек бумаги на стекло очков (не в самой середине, а сбоку). В первые дни бумажка будет мешать смотреть; но пройдет неделя, другая, и вы так привыкнете к ней, что перестанете даже ее замечать. Впрочем, это




Рис. 124. При рассматривании здания одним глазом небольшой участок c' поля зрения, отвечающий слепому пятну (c) глаза, нами не воспринимается вовсе.

хорошо знает каждый, кому приходилось носить очки с треснувшим стеклом: трещина замечается только в первые дни. Точно так же, в силу долговременной привычки, не замечаем мы слепого пятна нашего глаза. Кроме того, оба слепых пятна отвечают различным участкам поля зрения каждого глаза, так что при зрении двумя глазами не бывает пробела в их общем поле зрения.

Не думайте, что слепое пятно нашего поля зрения незначительно; когда вы смотрите (одним глазом) на дом с расстояния 10 м, то, из-за слепого пятна, не видите довольно обширной части его фасада, имеющей в поперечнике более 1 м; в нем умещается целое окно (рис. 124). А на небе остается невидимым пространство, равное по площади 120 дискам полной Луны!

Какой величины нам кажется Луна?

Кстати — о видимых размерах Луны. Если вы станете расспрашивать знакомых, какой величины *представляется* им Луна, то получите самые разнообразные ответы. Большинство скажет, что Луна величиной с тарелку, но будут и такие, которым она кажется величиной с блюдо для варенья, с вишню, с яблоко. Одному школьнику Луна всегда казалась “величиной с круглый стол на двенадцать персон”. А один беллетрист утверждал, что на небо была “Луна диаметром в аршин”.

Откуда такая разница в представлениях о величине одного и того же предмета?

Она зависит от различия в оценке *расстояния*, — оценке всегда бессознательной. Человек, видящий Луну величиной с яблоко, представляет ее себе находящейся на расстоянии гораздо меньшем, нежели те люди, которым она кажется с тарелку или круглый стол.

Большинство людей, впрочем, представляет себе Луну величиной с тарелку. Отсюда можно сделать любопытный вывод. Если вычислить (способ расчета станет ясен из дальнейшего), на какое расстояние помещает каждый из нас Луну, имеющую такие *видимые* размеры, то окажется, что удаление не превышает 30 м¹⁰. Вот на какое скромное расстояние отодвигаем мы бессознательно наше ночное светило!

На ошибочной оценке расстояний основано немало иллюзий зрения. Я хорошо помню оптический обман, который испытал в раннем детстве, “когда мне были новы все впечатленья бытия”. Уроженец города, я однажды весной,

во время загородной прогулки, в первый раз в жизни увидел пасущееся на лугу стадо коров; так как я неправильно оценил расстояние, коровы эти показались мне карликовыми! Таких крошечных коров я с тех пор ни разу не видел и, конечно, никогда не увижу*.

Видимый размер светил астрономы определяют размером того угла, под которым мы их видим. “Угловым размером”, “углом зрения” называют угол, который составляют две прямые, проведенные к глазу от крайних точек рассматрива-




Рис 125 Что такое угол зрения

емого тела (рис. 125). Углы же, как известно, измеряются градусами, минутами и секундами. На вопрос о видимом размере лунного диска астроном не скажет, что диск равен яблоку или тарелке, а ответит, что он равен $0,5^\circ$; это значит, что прямые линии, проведенные от краев лунного диска к нашему глазу, составляют угол в $0,5^\circ$. Такое определение видимых размеров есть единственно правильное, не порождающее недоразумений.

Геометрия учит**, что предмет, удаленный от глаза на расстояние, в 57 раз большее его поперечника, должен представляться наблюдателю под углом почти в 1° . Например, яблоко диаметром 5 см будет иметь угловой размер 1° , если его держать от глаза на расстоянии 5,57 см. На расстоянии вдвое большем оно представится под углом $0,5^\circ$, т. е. такой же величины, какой мы видим Луну.

Если угодно, вы можете сказать, что Луна кажется вам величиной с яблоко,— но при условии, что яблоко это

* Впрочем, и взрослые иногда поддаются подобной иллюзии. Об этом свидетельствует следующий отрывок из повести Григоровича “Пахарь”:
“Окрестность открылась как на ладони; деревня казалась подле самого моста; дом, холм и березовая рощица казались примыкающими теперь к деревне. Все это— и дом, и сад, и деревня— приняло теперь вид тех игрушек, где стебли мха изображают деревья, кусочки зеркала— речку”

** Читатель, заинтересовавшийся относящимися к углу зрения геометрическими расчетами, найдет разъяснения и примеры в моей книге “Занимательная геометрия”

удалено от глаза на 570 см (около 6 м). При желании сравнить видимый размер Луны с тарелкой вам придется отодвинуть тарелку метров на 30. Большинство людей не хочет верить, что Луна представляется такой маленькой; но попробуйте поместить гривенник на таком расстоянии от глаза, которое в 114 раз больше его диаметра: он как раз покроет Луну, хотя удален от глаза на расстояние 2 м.

Если бы вам предложили нарисовать на бумаге кружок, изображающий диск Луны, видимый простым глазом, задача показалась бы вам недостаточно определенной: кружок может быть и большим и маленьким, смотря по тому, как далеко он отодвинут от глаза. Но условия определятся, если остановимся на том расстоянии, на каком мы обыкновенно держим книги, чертежи и т. п., т. е. на расстоянии лучшего зрения. Оно равно для нормального глаза 25 см.

Итак, вычислим, какой величины должен быть кружок хотя бы на странице этой книги, чтобы видимый размер его равнялся лунному диску. Расчет прост: надо разделить расстояние 25 см на 114. Получим довольно незначительную величину— чуть больше 2 мм! Примерно такой ширины буква “о” типографского шрифта этой книги. Прямо не верится, что Луна, а также равное ей по *видимым* размерам Солнце кажутся нам под таким небольшим углом!

Вы замечали, вероятно, что после того, как глаз ваш был направлен на Солнце, в поле зрения долго мелькают цветные кружки. Эти так называемые “оптические следы” имеют тот же угловой размер, что и Солнце. Но кажушиеся размеры их меняются: когда вы смотрите на небо, они имеют величину солнечного диска; когда же бросаете взгляд на лежащую перед вами книгу, “след” Солнца занимает на странице место кружка с диаметром около 2 мм, наглядно подтверждая правильность нашего расчета.

Видимые размеры светил

Если бы, сохраняя угловые размеры, мы пожелали изобразить на бумаге созвездие Большой Медведицы, то получили бы фигуру, представленную на рис. 126. Глядя на нее с расстояния лучшего зрения, мы видим созвездие таким, каким оно рисуется нам на небесном своде. Это, так сказать, карта Большой Медведицы с сохранением угловых размеров. Если вам хорошо знакомо зрительное впечатление от этого созвездия,— не только *фигура*, а именно непосредственное зрительное *впечатление*,— то,

всматриваясь в рис. 126, вы словно вновь переживаете это впечатление. Зная угловые расстояния между главными звездами всех созвездий (они приводятся в астрономических календарях и подробных справочных изданиях), вы можете начертить в “натуральном виде” целый астрономический




Рис 126 Созвездие Большой Медведицы с сохранением угловых размеров.

атлас. Для этого достаточно запастись миллиметровой бумагой и считать на ней каждые 4, 5 мм за градус (площади кружков, изображающих звезды, надо чертить пропорциональными яркости).

Обратимся теперь к планетам. Видимые размеры их, как и звезд, настолько малы, что невооруженному глазу они кажутся лучистыми точками. Это и понятно, потому что ни одна планета (кроме разве Венеры в период ее наибольшей яркости) не представляется простому глазу под углом более 1 угл. мин., т. е. той предельной величины, при которой мы вообще можем различать предмет как тело, имеющее размеры (под меньшим углом каждый предмет кажется нам точкой без очертаний).

Вот размеры некоторых планет (в угловых секундах); против каждой планеты показаны две цифры — первая соответствует наименьшему расстоянию светила от Земли, вторая — наибольшему:

Меркурий	13— 5	Юпитер	50— 31
Венера	64— 10	Сатурн	20— 15
Марс	25— 3, 5	Кольца Сатурна	48— 35

Представить эти размеры в “натуральном масштабе” на бумаге нет возможности: даже делая угловая минута, т. е. 60 угловых секунд, отвечает, на расстоянии лучшего зрения, лишь 0,04 мм — величине, неразличимой для простого глаза. Изобразим поэтому планетные диски такими, какими они кажутся в телескоп, увеличивающий в 100 раз. На рис. 127 перед вами схема видимых размеров планет при таком увеличении. Нижняя дуга изображает край лунного (или

солнечного) диска в телескопе со 100-кратным увеличением. Над ним — Меркурий в наибольшей близости и наибольшем удалении от Земли. Еще выше Венера в разных фазах; в ближайшем к нам положении эта планета совершенно не видна, так как обращена к Земле неосвещен-




Рис 127 Если держать этот чертеж на расстоянии 25 см от глаза, то начерченные на нем планетные диски представятся нам по размерам в точности такими; какими видны планеты в телескоп, увеличивающий в 100 раз

ной половиной*; затем становится видимым ее узкий серп, — это наибольший из всех планетных “дисков”; в дальнейших фазах Венера все уменьшается, и полный диск имеет поперечник, в 6 раз меньший, нежели у узкого серпа.

Выше над Венерой изображен Марс. Слева вы видите его в наибольшем приближении к Земле; таким показывает его нам труба со 100-кратным увеличением. Что можно различить на этом маленьком диске? Вообразите тот же кружок увеличенным в 10 раз, и получите представление о том, что видит астроном, изучающий Марс в могущественнейший телескоп с 1000-кратным увеличением. Можно ли на столь тесном пространстве уловить с несомненностью такие тонкие подробности, как пресловутые “каналы”, или заметить легкое изменение окраски, связанное будто бы с растительностью на дне “океанов” этого мира? Неудивительно, что свидетельства одних наблюдателей существенно расходятся с показаниями других, и одни

* Ее можно видеть в этом положении только в те крайне редкие моменты, когда она проектируется на диск Солнца в виде черного кружочка (так называемое “прохождение Венеры”)

считают оптической иллюзией то, что будто бы отчетливо видят другие... 11.

Великан Юпитер со своими спутниками занимает очень видное место в нашей схеме; его диск значительно больше диска прочих планет (исключая серп Венеры), а четыре главных спутника расположены по линии, равной почти половине лунного диска. Здесь Юпитер изображен в наибольшем приближении к Земле. Наконец, Сатурн с кольцами и самым крупным из его спутников (Титаном) представляет собой также довольно заметный объект в моменты наибольшей близости к нам.

После сказанного читателю ясно, что каждый видимый предмет кажется нам тем меньшим, чем ближе мы его себе представляем. И обратно: если почему-либо мы преувеличим расстояние до предмета, то и сам предмет покажется нам соответственно больших размеров.

Далее приведен поучительный рассказ Эдгара По, описывающий именно такую иллюзию зрения. При кажущемся неправдоподобии он вовсе не фантастичен. Я сам сделался однажды жертвой почти такой же иллюзии, — да и многие из читателей, вероятно, вспомнят сходные случаи из собственной жизни.

“Сфинкс”*

“В эпоху ужасного владычества холеры в Нью-Йорке я получил приглашение от одного из моих родственников провести две недели на его уединенной даче. Мы провели бы время очень недурно, если бы не ужасные вести из города, получавшиеся ежедневно. Не было дня, который бы не принес нам известий о смерти кого-либо из знакомых. Под конец мы со страхом ожидали газету. Самый ветер с юга, казалось нам, был насыщен смертью. Эта леденящая мысль всецело овладела моей душой. Мой хозяин был человек более спокойного темперамента и старался ободрить меня.

На закате жаркого дня я сидел с книгой в руках у раскрытого окна, из которого открывался вид на отдаленный холм за рекой. Мысли мои давно уже отвлеклись от книги к унынию и отчаянию, царившим в соседнем городе. Подняв глаза, я случайно взглянул на обнаженный склон холма и увидел нечто странное: отвратительное чудовище быстро спускалось с вершины холма и исчезло в лесу у его подножия. В первую минуту, увидев чудовище, я усомнился в здравом состоянии моего рассудка или, по крайней мере, глаз, и только спустя несколько минут убедился, что я не брежу. Но если я опишу это чудовище (которое я

* Перевод М. А. Энгельгардта. В тексте сделаны несущественные пропуски. — Я. П

видел совершенно ясно и за которым наблюдал все время, пока оно спускалось с холма), мои читатели, пожалуй, не так легко поверят этому.

Определяя размеры этого существа по сравнению с диаметром огромных деревьев, я убедился, что оно далеко превосходит величиной любой линейный корабль. Я говорю линейный корабль, потому что форма чудовища напоминала корабль. корпус семидесятичетырехфутового судна может дать довольно ясное представление об его очертаниях. Пасть животного помещалась на конце хобота футов в шестьдесят или семьдесят длиной и приблизительно такой же толщины, как туловище обыкновенного слона. У основания хобота находилась густая масса косматых волос, а из нее выдавались, изгибаясь вниз и вбок, два блестящих клыка, подобные кабаньим, только несравненно больших размеров. По обеим сторонам хобота помещались два гигантских прямых рога, футов в тридцать или сорок длиной, по-видимому, хрустальных, они ослепительно сияли в лучах солнца. Туловище имело форму клина, обращенного вершиной к земле. Оно было снабжено двумя парами крыльев, — каждое имело футов около 300 в длину, — помешавшимися одна над другой. Крылья были густо усажены металлическими пластинками, каждая имела футов десять-двенадцать в диаметре. Но главную особенность этого страшного существа составляло изображение мертвой головы, занимавшей почти всю поверхность груди, она резко выделялась на темной поверхности своим ярким белым цветом, точно нарисованная.

Пока я с чувством ужаса смотрел на это страшное животное, в особенности на зловещую фигуру на его груди, оно внезапно разинуло пасть и испустило громкой стон. Нервы мои не выдержали, и, когда чудовище исчезло у подошвы холма в лесу, я без чувств повалился на пол.

Когда я очнулся, первым моим побуждением было рассказать моему другу о том, что я видел. Выслушав меня до конца, он сначала расхохотался, а затем принял очень серьезный вид, как будто несколько не сомневался в моем помешательстве.

В эту минуту я снова увидел чудовище и с криком указал на него моему другу. Он посмотрел, но уверял, что ничего не видит, хотя я подробно описывал ему положение животного, пока оно спускалось с холма.

Я закрыл лицо руками. Когда я отнял их, чудовище уже исчезло.

Мой хозяин принялся расспрашивать меня о внешнем виде чудовища. Когда я рассказал ему все подробно, он перевел дух, точно избавившись от какой-то невыносимой тяжести, подошел к книжному шкафу и достал учебник естественной истории. Затем, предложил мне поменяться местами, так как у окна ему легче было разбирать мелкую печать книги, он уселся на стул и, открыв учебник, продолжал:

— Если бы вы не описали мне так подробно чудовище, я, пожалуй, никогда не мог бы объяснить вам, что это такое было. Прежде всего, позвольте, я вам прочту из этого учебника описание рода *Sphinx* из семейства *Sperusculariae* (сумеречных) отряда *Lepidoptera* (чешуекрылых, или бабочек) класса *Insecta*, т. е. насекомых. Вот оно:

“Две пары перепончатых крыльев, покрытых мелкими окрашенными чешуйками металлического блеска, ротовые органы, образо-

вавшиеся из удлинённых нижних челюстей, по бокам их зачатки пушистых щупальцев, нижние крылья соединены с верхними крепкими волосками, усики в виде призматических отростков, брюшко заостренное. Сфинкс Мертвая Голова является иногда предметом суеверного ужаса среди простонародья ввиду издаваемого им печального звука и фигуры черепа на груди”.*

Тут он закрыл книгу и наклонился к окну в той же самой позе в какой сидел я, когда увидел “чудовище”.

— Ага, вот оно! — воскликнул он, — оно поднимается по склону холма и, признаюсь, выглядит очень курьезно. Но оно вовсе не так велико и не так далеко, как вы воображали, так как взбирается по нити прикрепленной каким-нибудь пауком к нашему окну!”

Почему микроскоп увеличивает?

“Потому что он изменяет ход лучей определенным образом”, — вот что чаще всего приходится слышать в ответ на этот вопрос. Но в таком ответе указывается причина, самая же сущность дела не затрагивается. В чем же основная причина увеличительного действия микроскопа и телескопа?

Я узнал ее не из учебника, а постиг случайно, когда школьником заметил однажды чрезвычайно любопытное и сильно озадачившее меня явление. Я сидел у закрытого окна и смотрел на кирпичную стену дома в противоположной стороне узкого переулка. Вдруг я в ужасе отшатнулся: с кирпичной стены — я ясно видел это! — смотрел на меня исполинский человеческий глаз в несколько метров шириной... В то время я еще не читал приведенного выше рассказа Эдгара По и потому не сразу сообразил, что исполинский глаз был отражением моего собственного, отражением, которое я проектировал на отдаленную стену и потому представлял себе соответственно увеличенным.

Догадавшись же, в чем дело, я стал размышлять о том, нельзя ли устроить микроскоп, основанный на этом обмане зрения. И вот тогда, когда я потерпел неудачу, мне стало ясно, в чем сущность увеличительного действия микроскопа: вовсе не в том, что рассматриваемый предмет кажется больших размеров, а в том, что он рассматривается нами *под*

* Теперь эту бабочку относят к роду *Acherontia*. Это одна из немногих бабочек, способных издавать звуки — свист, напоминающий мышинный визг, — и единственная, производящая звуки с помощью ротовых органов. Голос ее довольно громок, — он слышен за много метров. В данном случае он мог показаться наблюдателю особенно громким, так как источник звука мысленно отнесен был на весьма далекое расстояние (см. статью “Курьезы слуха” в конце книги).

большим углом зрения, а следовательно, — и это самое важное, — его изображение занимает *больше места на сетчатке нашего глаза* (рис. 128).

Чтобы понять, почему столь существенное значение имеет здесь угол зрения, мы должны обратить внимание на




Рис. 128. Линза увеличивает изображение на сетчатке глаза.

важную особенность нашего глаза: каждый предмет или каждая его часть, представляющиеся нам под углом, меньшим одной угловой минуты, сливаются для нормального зрения *в точку*, в которой мы не различаем ни формы, ни частей. Когда предмет так далек от глаза или так мал сам по себе, что весь он или отдельные части его представляются под углом зрения менее одной угловой минуты, мы перестаем различать в нем подробности его строения. Происходит же это потому, что при таком угле зрения изображение предмета на дне глаза (или изображение какой-либо части предмета) захватывает не множество нервных окончаний в сетчатке сразу, а уместается целиком на одном чувствительном элементе: подробности формы и строения тогда исчезают, — мы видим *точку*.

Роль микроскопа и телескопа состоит в том, что, изменяя ход лучей от рассматриваемого предмета, они показывают его нам под большим углом зрения; изображение на сетчатке растягивается, захватывает больше нервных окончаний, и мы различаем уже в предмете такие подробности, которые раньше сливались в точку. “Микроскоп или телескоп увеличивает в 100 раз”, — это значит, что он показывает нам предметы под углом зрения в 100 раз большим, чем мы видим их без инструмента. Если же оптический инструмент не увеличивает

угла зрения, то он не дает никакого увеличения, хотя бы нам и казалось, что мы видим предмет увеличенным. Глаз на кирпичной стене казался мне огромным,— но я не видел в нем ни одной лишней подробности по сравнению с тем, что вижу, глядя в зеркало. Луна низко у горизонта кажется нам заметно большей, чем высоко на небе,— но разве на этом увеличенном диске замечаем мы хоть одно лишнее пятнышко, неразличимое при высоком стоянии Луны?

Если обратимся к случаю увеличения, описанному в рассказе Эдгара По “Сфинкс”, мы убедимся, что и здесь в увеличенном объекте не было усмотрено никаких новых частных. Угол зрения оставался неизменным, бабочка видна под одним и тем же углом, относим ли мы ее далеко в лес или близко к раме окна. А раз не меняется угол зрения, то увеличение предмета, как бы ни поражал он ваше воображение, не открывает наблюдателю ни одной новой подробности. Как истинный художник, Эдгар По верен природе даже и в этом пункте своего рассказа. Заметили ли вы, как описывает он “чудовище” в лесу: перечень отдельных членов насекомого не включает ни одной новой черты по сравнению с тем, что представляет “мертвая голова” при наблюдении невооруженным глазом. Сравните оба описания,— они не без умысла приведены в рассказе,— и вы убедитесь, что отличаются они только в словесных выражениях (10-футовые пластинки— чешуйки, гигантские рога— усики; кабаньи клыки— щупальца и т. д.), но никаких новых подробностей, неразличимых простым глазом, в первом описании нет.

Если бы действие микроскопа заключалось лишь в *таком* увеличении, он был бы бесполезен для науки, превратившись в любопытную игрушку, не более. Но мы знаем, что это не так, что микроскоп открыл человеку новый мир, далеко раздвинув границы нашего естественного зрения:

Хоть острым взором нас природа одарила,
Но близок оног конец имеет сила.
Коль много тварей он еще не достигает,
Которых малый рост пред вами сокращает!

— писал наш первый натуралист Ломоносов в “Письме о пользе стекла”. Но “в нынешних веках” нам микроскоп открыл строение мельчайших, невидимых существ:

Коль тонки члены в них, составы, сердце, жилы
И верим, что хранят в себе животны силы!
Не меньше, нежели в пучине тяжкий кит.
Нас малый червь частей сложением дивит...

Коль много микроскоп нам тайности открыл
Невидимых частиц и тонких в теле жил!

Теперь мы можем уже дать себе ясный отчет в том, почему именно микроскоп открывает нам “тайность”, которую не усмотрел на своем чудовище-бабочке наблюдатель в рассказе Эдгара По: потому что— подведем итог сказанному— микроскоп не просто представляет нам предметы в увеличенном виде, а показывает их *под большим углом зрения*; вследствие этого на задней стенке глаза рисуется *увеличенное изображение* предмета, действующее на более многочисленные нервные окончания и тем доставляющее нашему сознанию большее число отдельных зрительных впечатлений. Коротко говоря: микроскоп увеличивает не предметы, а их изображения на дне глаза ¹².

Зрительные самообманы

Мы часто говорим об “обмане зрения”, “обмане слуха”, но выражения эти неправильны. Обманов *чувств* нет. Философ Кант метко сказал по этому поводу: “Чувства не обманывают нас,— не потому, что они всегда правильно судят, а потому, что вовсе не судят”

Что же тогда обманывает нас при так называемых “обманах” чувств? Разумеется, то, что в данном случае *судит*, т.е. наш собственный мозг. Действительно, большая часть




Рис 129 Что шире: правая или левая фигура?




Рис 130 Что больше в этой фигуре: высота или ширина?

обманов зрения зависит исключительно от того, что мы не только видим, но и бессознательно *рассуждаем*, причем невольно вводим себя в заблуждение. Это— обманы *суждения*, а не чувств.

Еще два тысячелетия назад древний поэт Лукреций писал

Наши глаза познавать не умеют природу предметов
А потому не навязывая им заблуждений рассудка.

Возьмем общеизвестный пример оптической иллюзии: левая фигура на рис. 129 кажется уже, нежели правая, хотя обе ограничены строго одинаковыми квадратами. Причина кроется в том, что оценка *высоты* фигуры слева получается у нас как результат бессознательного сложения отдельных промежутков, и потому она кажется нам больше, чем равная ей *ширина* той же фигуры. Напротив, на фигуре справа в силу того же бессознательного рассуждения *ширина* кажется больше *высоты*. По этой же причине высота фигуры на рис. 130 кажется больше ее ширины ¹³.

Иллюзия, полезная для портных

Если только что описанную иллюзию зрения вы пожелаете применить к более крупным фигурам, которые не могут быть охвачены сразу глазом, то ожидания вами не оправдаются. Всем известно, что низкий полный человек в костюме с поперечными полосами кажется не только не тоньше, а напротив, еще шире. И наоборот, надев костюм с продольными полосами и складками, полные люди могут до некоторой степени скрывать свою полноту.

Чем объяснить это противоречие? Тем, что, рассматривая такой костюм, мы не можем охватить его сразу, не двигая глаз; мы невольно следуем глазами вдоль полос; усилие глазных мускулов при этом заставляет нас бессознательно преувеличивать размеры предмета в направлении полос; мы привыкли связывать с усилием глазных мышц представление о больших предметах, которые не умещаются в поле зрения. Между тем, когда мы рассматриваем *маленький* полосатый чертеж, глаза наши остаются неподвижными и мускулы их не утомляются ¹⁴.

Что больше?

Какой эллипс на рис. 131 больше: нижний или внутренний верхний? Трудно отделаться от мысли, что нижний больше верхнего. Между тем *оба равны*, и только присутствие наружного, окаймляющего эллипса создает иллюзию, будто заключенный в нем эллипс меньше нижнего. Иллюзия усиливается и тем, что вся фигура представляется нам




Рис. 131 Какой эллипс больше: нижний или внутренний верхний?

не плоской, а объемной — в виде ведра: эллипсы невольно превращаются нами в перспективно сжатые круги, а боковые прямые линии — в стенки ведра.




Рис 132. Какое расстояние больше: ab или mn ?

На рис. 132 расстояние между точками a и b кажется больше, нежели между точками m и n . Присутствие третьей прямой, исходящей из той же вершины, усиливает иллюзию.

Сила воображения

Большинство обманов зрения, как уже указывалось, зависит от того, что мы не только *смотрим*, но и бессознательно при этом *рассуждаем*. “Мы смотрим не глазами, а мозгом”, — говорят физиологи. Вы охотно согласитесь с этим, когда познакомитесь с иллюзиями, где воображение смотрящего *сознательно* участвует в процессе зрения.

Взгляните на рис. 133. Если вы станете показывать этот рисунок другим, то получите троякого рода ответы на вопрос, что он изображает. Одни скажут, что это лестница; другие — что это ниша, углубленная в стене; третьи, наконец, увидят в нем бумажную полосу, согнутую “гармоникой” и протянутую наискось в белом поле квадрата.

Как ни странно, все три ответа верны! Вы можете сами увидеть все названные вещи, если, глядя на рисунок, направите свой взгляд различным образом. А именно: рассматривая чертеж, попробуйте прежде всего направить взор на левую часть рисунка, — вы увидите лестницу. Если взгляд ваш скользнет по рисунку справа налево, — вы увидите нишу. Если взгляд ваш следует по направлению диагонали от нижнего правого края к верхнему левому, — вы увидите сложенную “гармоникой” бумажную полосу ¹⁵.

Впрочем, при продолжительном рассматривании внимание утомится, и вы будете видеть попеременно то одно, то другое, то третье, уже независимо от вашего




Рис. 133. Что вы видите: лестницу, нишу или бумажную полосу, согнутую “гармоникой”?




Рис. 134. Как расположены кубы? Где два куба: вверху или внизу?

желания. Рис. 134 отличается теми же особенностями.

Любопытна иллюзия рис. 135: мы невольно поддаемся впечатлению, будто расстояние AB короче AC . Между тем они равны.




Рис. 135. Что длиннее: AB или AC ?

Еще иллюзии зрения

Не все иллюзии зрения мы в состоянии объяснить. Часто и догадаться нельзя, какого рода умозаключения совершаются бессознательно в нашем мозгу и обуславливают тот или иной обман зрения. На рис. 136 отчетливо видны две дуги, обращенные выпуклостями друг к другу. Даже не возникает сомнения, что это так. Но стоит лишь приложить линейку к этим мнимым дугам или взглянуть на них вдоль, держа фигуру на уровне глаз, чтобы убедиться в их пря-

молинейности. Объяснить эту иллюзию не так просто ¹⁶ Иллюзия пропадает; 1) если, подняв фигуру на уровень глаз, смотреть на нее так, чтобы взгляд скользил вдоль линий; 2) если, поместив конец карандаша в какой-нибудь точке фигуры, сосредоточить взгляд на этой точке.




Рис. 136. Две средние параллельные линии кажутся дугами.

Укажем еще несколько примеров иллюзий в том же роде. На рис. 137 прямая кажется разбитой на неравные отрезки;




Рис. 137. На равные ли отрезки разделена эта прямая?

измерение убедит вас, что отрезки равны. На рис. 138 и 139 параллельные прямые представляются непараллельными.







Рис. 138. Параллельные прямые кажутся непараллельными.







Рис. 139. Видоизменение иллюзии рис. 138.

На рис. 140 круг производит впечатление овала. Замечательно, что оптические иллюзии, показанные на рис. 137—139, перестают обманывать глаз, если их рассматривают при свете электрической искры. Очевидно, иллюзии эти связаны с движением глаз; при кратковременной вспышке искры такое движение не успевает произойти.

Вот не менее любопытная иллюзия. Взгляните на рис. 141 и скажите: какие черточки длиннее,— те, что слева, или те, что справа? Первые кажутся более длинными, хотя те и другие строго равны*. Иллюзия эта носит название иллюзии “курительной трубки”.




Рис. 140. Круг ли это?

Предлагалось много объяснений этих любопытных иллюзий, но они малоубедительны, и мы не станем приводить их здесь. Одно, по-видимому, несомненно: причина этих иллюзий кроется в бессознательном рассуждении, в невольном “лукавом мудрствовании” ума, мешающем нам видеть то, что есть в действительности**.

Рис. 141. Правые черточки кажутся короче, нежели равные им левые.



Что это?

При взгляде на рис. 142 вы едва ли сразу догадаетесь, что он изображает. “Просто черная сетка, ничего больше”,— скажете вы. Но поставьте книгу отвесно на стол, отойдите шага на 3—4 и смотрите оттуда. Вы увидите человеческий

* Чертеж представляет собой, между прочим, иллюстрацию известного геометрического принципа Кавальери (площади, занятые обеими частями “курительной трубки”, равны).

** Интересующихся зрительными иллюзиями позволю себе отослать к составленному мною маленькому альбому “Обманы зрения”, где собрано свыше 60 образчиков разнообразных оптических иллюзий.

глаз. Подойдите ближе, — перед вами снова появится ничего не выражающая сетка...

Вы, конечно, подумаете, что это какой-нибудь искусный “трюк” изобретательного гравера. Нет, это лишь грубый




Рис. 142. Рассматривая эту сетку издали, легко различить на ней глаз.

пример той иллюзии зрения, которой мы поддаемся всякий раз, когда рассматриваем так называемые “тоновые” иллюстрации, или “автотипии”. В книгах и журналах фон рисунка всегда кажется нам сплошным; но рассмотрите его в лупу, — и перед вами появится такая же сетка, какая изображена на рис. 142. Этот озадачивший вас рисунок представляет собой не что иное, как увеличенный раз в 10 участок обыкновенной тоновой иллюстрации. Разница лишь в том, что, когда сетка мелка, она сливается в сплошной фон уже на близком расстоянии, на том, на каком мы обыкновенно держим книгу при чтении. Когда же сетка крупна, слияние происходит на большем расстоянии. Читатель без труда поймет сказанное, если вспомнит наши рассуждения относительно угла зрения.

Необыкновенные колеса

Случалось ли вам через щель забора или, еще лучше, на экране кино следить за спицами колес быстро движущейся

повозки или автомобиля? Вероятно, вы замечали при этом странное явление: автомобиль мчится с головокружительной быстротой, колеса же едва вращаются, а то и вовсе не вращаются. Мало того! они вращаются иной раз даже в противоположном направлении!


Эта иллюзия зрения так необычайна, что приводит в недоумение всех, кто замечает ее впервые.

Объясняется она следующим образом. Следя за вращением колеса через щель в заборе (перемещая взгляд вдоль забора), мы видим колесные спицы не непрерывно, а через равные промежутки времени, так как доски забора каждое мгновение заслоняют их от вас. Точно так же и кинематографическая лента запечатлевает изображение колес с перерывами, в отдельные моменты 24 кадра в секунду).

Здесь возможны *три* случая, которые мы сейчас и рассмотрим один за другим.

1. За время перерыва между съемками колесо успевает сделать *целое число оборотов*— безразлично сколько, 2 или 20, только бы число это было целое. Тогда спицы колеса на новом снимке займут то же положение, что и на прежнем. В следующий промежуток колесо сделает опять *целое* число оборотов (величина промежутка и скорость автомобиля не изменяются),— и положение спиц остается прежнее. Видя все время одно и то же положение спиц, мы заключаем, что колесо вовсе не вращается (средний столбец на рис. 143).

Действительное направление вращения



неподвижно
Кажущееся направление вращения

Рис. 143. Причина загадочного движения колес на экране кино.

2. Колесо успевает за каждый промежуток сделать целое число оборотов и еще *часть оборота*, весьма небольшую (например, 45° , как в левом столбце на рис. 143). Наблюдая за сменой таких изображений, мы о целом числе оборотов не будем и догадываться, а увидим лишь медленное вращение колеса (каждый раз на небольшую долю оборота). В результате нам покажется, что, несмотря на быстрое перемещение автомобиля, колеса вращаются медленно.

3. В течение промежутка между съемками колесо делает *неполный оборот*, отличающийся от полного на небольшую долю (например, поворачивается на 315° , как в правом столбце на рис. 143). Тогда какая-либо определенная спица будет казаться вращающейся *в обратном направлении*. Это обманчивое впечатление будет до тех пор, пока колесо не изменит скорости вращения.

Остается внести маленькие дополнения в наше объяснение. В первом случае мы, ради простоты, говорили о числе *полных оборотов* колеса; но так как спицы колеса похожи одна на другую, то достаточно, чтобы колесо повернулось на целое число *промежутков* между спицами.

То же относится и к другим случаям.

Возможны и еще курьезы. Если *на обод* колеса имеется метка, спицы же все похожи друг на друга, то случается, что обод движется в одном направлении, спицы же бегут *в обратном*! Если же имеется метка *на спице*, то спицы могут двигаться в обратном направлении, нежели метка, — она будет словно перескакивать со спицы на спицу.

Когда в кино показывают обыкновенные сцены, иллюзия эта мало вредит естественности впечатления. Но если хотят на экране объяснить действие какого-нибудь механизма, то этот обман зрения может породить серьезные недоразумения и даже совершенно извратить представление о работе машины.

Внимательный зритель, видя на экране мнимо-неподвижное колесо мчащегося автомобиля, легко может, сосчитав его спицы, судить до некоторой степени о том, сколько оборотов делает оно в единицу времени. Обычная скорость подачи ленты — 24 кадра в секунду. Если число спиц автомобильного колеса 12, то число его оборотов в секунду равно 24: 12, т. е. 2, или по одному целому обороту за 0,5 секунды. Это — наименьшее число оборотов; оно может быть и больше в целое число раз (т. е. вдвое, втрое и т. д.).

Оценив диаметр колеса, можно делать заключение и о скорости движения автомобиля. Например, при диаметре колеса 80 см имеем в рассмотренном случае скорость около 18 км/ч (36 км/ч, 54 км/ч и т. д.).

Рассмотренная сейчас иллюзия зрения используется в технике для подсчета числа оборотов быстро вращающихся валов. Объясним, на чем основан этот способ. Сила света лампы, питаемой переменным током, не остается постоянной: через каждую сотую долю секунды свет ослабевает, хотя при обычных условиях мы никакого мерцания не замечаем. Но представим себе, что таким светом освещен вращающийся диск, изображенный на рис. 144. Если диск вращается так, что делает четверть оборота в сотую долю секунды, то произойдет нечто неожиданное: вместо обычного ровного серого круга глаз увидит черные и белые секторы, словно бы диск оставался неподвижным.




Рис. 144. Диск для определения скорости вращающегося вала.

Причина явления, надеюсь, понятна читателю, разобравшемуся в иллюзии с автомобильными колесами. Легко догадаться также, как можно применить это явление для определения числа оборотов двигателя.

“Микроскоп времени” в технике

В первой книге “Занимательная физика” описана “лупа времени”, основанная на использовании киноаппарата. Здесь расскажем о другом способе достижения подобного эффекта, опирающемся на явление, которое было рассмотрено в предыдущей статье.

Мы знаем уже, что, когда диск с зачерненными секторами (рис. 144), делающий 25 об/с, освещается каждую сотую долю секунды вспышками лампы, он кажется глазу неподвижным. Представьте себе, однако, что число вспышек сделалось равным 101 в секунду. В течение промежутка между такими двумя последовательными учащенными вспышками диск не успеет повернуться, как прежде, на полную четверть оборота, и, значит, соответствующий сектор не дойдет до первоначального положения.

Глаз увидит его отставшим на сотую долю окружности. При следующей вспышке он покажется отставшим еще на

сотую долю окружности и т. д. Нам покажется, что диск вращается *назад*, делая 1 об/с. Движение замедлилось в 25 раз.

Нетрудно сообразить, как можно увидеть то же замедленное вращение, но не в обратную сторону, а в нормальном направлении. Для этого нужно число вспышек света не увеличить, а *уменьшить*. Например, при 99 вспышках в секунду диск покажется вращающимся вперед, делая 1 об/с.

Мы имеем здесь “микроскоп времени” с 25-кратным замедлением. Но вполне возможно получить еще большее замедление. Если, например, число вспышек доведено до 999 за 10 секунд (т. е. 99,9 в секунду), диск будет казаться совершающим один оборот за 10 секунд; он имеет, значит, 250-кратное замедление.

Любое быстрое периодическое движение можно изложенным приемом замедлить для нашего глаза в желаемой степени. Это дает удобную возможность изучать особенности движения весьма быстрых механизмов, замедляя их движение нашим “микроскопом времени” в 100, в 1000 и т. д. раз ¹⁷.




Рис. 145. Измерение скорости полета пули.

Опишем в заключение способ измерения скорости полета пули, основанный на возможности точно определить число оборотов вращающегося диска. На быстро вращающийся вал надевают картонный диск, который имеет форму открытой цилиндрической коробки (рис. 145). Стрелок пускает пулю вдоль диаметра этой коробки, пробивая ее стенку в двух местах. Если бы коробка была неподвижна, оба отверстия лежали бы на концах одного диаметра. Но коробка вращалась, и за то время, пока пуля летела от края до края, коробка успела немного повернуться, подставив пуле взамен точки *b* точку *c*. Зная число оборотов коробки и ее диаметр, можно по длине дуги *bc* вычислить скорость

движения пули. Это — несложная геометрическая задача, с которой без труда справятся читатели, немного владеющие математикой¹⁸.

Диск Нипкова

Замечательное техническое применение обмана зрения представлял так называемый “диск Нипкова”, употреблявшийся в первых телевизионных установках. На рис. 146




Рис. 146. Диск Нипкова.




Рис. 147. Картинка при вращении диска становится видимой.

вы видите сплошной диск, у краев которого разбросана дюжина дырочек с просветом 2 мм; дырочки расположены равномерно по спиральной линии, каждая на размер просвета ближе к центру, чем соседняя. Такой диск не обещает как будто ничего особенного. Но установите его на оси, устройте перед ним окошечко, а позади поместите таких же размеров картинку (рис. 147). Если теперь привести диск в быстрое вращение, то произойдет неожиданное явление:




Рис. 148. При быстром вращении из диска словно вырезается отверстие.

картинка, заслоняемая неподвижным диском, становится при его вращении отчетливо видимой в переднее окошечко. Замедлите вращение — картинка сделается смутной и, наконец, при остановке диска исчезает совершенно; теперь от картинки остается видимым лишь то, что можно рассмотреть сквозь крошечную двухмиллиметровую дырочку.

Разберемся, в чем секрет загадочного эффекта этого диска. Будем вращать диск медленно и проследим за прохождением последовательно каждой отдельной дырочки мимо окошечка. Самая удаленная от центра дырочка проходит близ верхнего края окошечка; если это движение быстро, она сделает видимой целую полосу картинки, прилегающую к ее верхнему краю. Следующая дырочка, пониже первой, при быстром прохождении в поле окошечка откроет вторую полосу картинки, смежную с первой (рис. 148); третья дырочка сделает видимой третью полосу, и т. д. При достаточно быстром вращении диска становится, благодаря этому, видимой вся картинка; против окошечка словно вырезается из диска соответствующее отверстие¹⁹.

Диск Нипкова нетрудно изготовить самому; для быстрого его вращения можно пользоваться намотанным на его ось шнурком, — лучше, конечно, воспользоваться маленьким электромотором.

Почему заяц косой?




Рис. 149. Поле зрения обоих глаз человека.

Человек — одно из многих существ, глаза которых приспособлены к одновременному рассматриванию какого-нибудь предмета: поле зрения правого глаза лишь немного не совпадает с полем зрения левого глаза. Большинство же животных смотрит каждым глазом отдельно. Видимые ими предметы не

отличаются той рельефностью, к которой мы привыкли, но зато их поле зрения гораздо обширнее, чем у нас.

На рис. 149 изображено поле зрения человека: каждый глаз видит — по горизонтальному направлению — в пределах угла в 120° , и оба угла почти покрывают друг друга (глаза предполагаются неподвижными).

Сравните этот чертеж с рис. 150, изображающим поле зрения зайца; не поворачивая головы, заяц своими широко расставленными глазами видит не только то, что находится впереди, *но и то, что позади*. Оба поля зрения его глаза смыкаются и спереди и сзади! Теперь вам понятно, почему так трудно подкрасться к зайцу, не спугнув его. Зато заяц, как ясно из чертежа, совершенно не видит того, что расположено *непосредственно* перед его мордой; ему приходится, чтобы видеть весьма близкий предмет, поворачивать голову набок. Почти все без исключения копытные и жвачные животные обладают такой способностью “всестороннего” зрения.




Рис. 150. Поле зрения обеих глаз зайца.




Рис. 151. Поле зрения обоих глаз лошади.

На рис. 151 показано расположение полей зрения лошади: они сзади не сходятся, но животному достаточно лишь слегка повернуть голову, чтобы увидеть предметы, расположенные позади. Зрительные образы здесь, правда, не так отчетливы, но зато от животного не ускользает ни малейшее движение, совершающееся далеко кругом. Подвижные хищные животные, которым приходится обычно самым быть нападающей стороной, лишены этой способности видеть кругом себя; они обладают “двуглазым” зрением, позволяющим зато точно оценивать расстояние для прыжка.

Почему в темноте все кошки серы?

Физик сказал бы: “в темноте все кошки *черны*”, потому что при отсутствии освещения никакие предметы не видны вовсе. Но поговорка имеет в виду не полный мрак, а темноту в обиходном смысле слова, т. е. весьма слабое освещение.

Совсем точно поговорка звучит так: ночью все кошки серы. Первоначальный, непереносный смысл поговорки тот, что при недостаточном освещении глаз наш перестает различать окраску— каждая поверхность кажется серой ²⁰.

Верно ли это? Действительно ли в полутьме и красный флаг и зеленая листва представляются одинаково серыми? Легко убедиться в правильности этого утверждения. Кто в сумерки приглядывался к окраске предметов, тот замечал, конечно, что цветовые различия стираются и все вещи кажутся более или менее темно-серыми: и красное одеяло, и синие обои, и фиолетовые цветы, и зеленые листья.

“Сквозь опущенные шторы,— читаем мы у Чехова (“Письмо”),— сюда не проникали солнечные лучи, было сумеречно, так что все розы в большом букете казались одного цвета”.

Точные физические опыты вполне подтверждают это наблюдение. Если окрашенную поверхность освещать слабым белым светом (или белую поверхность— слабым окрашенным светом), постепенно усиливая освещение, то глаз сначала видит просто серый цвет, без какого-либо цветового оттенка. И лишь когда освещение усиливается до определенной степени, глаз начинает замечать, что поверхность окрашена. Эта степень освещения называется “низшим порогом цветового ощущения”.

Итак, буквальный и вполне правильный смысл поговорки (существующей на многих языках) тот, что ниже порога цветового ощущения все предметы кажутся серыми.

Обнаружено, что существует и “высший порог цветового ощущения”. При чрезвычайно ярком освещении глаз снова перестает различать цветовые оттенки: все окрашенные поверхности кажутся одинаково *белыми*.

Существуют ли лучи холода?

Распространено мнение, будто наряду с лучами греющими существуют и лучи холодящие, лучи холода. На мысль о них наводит тот, например, факт, что кусок льда распространяет вокруг себя холод совершенно так же, как печка создает вокруг себя теплоту. Разве не говорит это о том, что от льда исходят лучи холода, как от печки исходят греющие лучи?

Нет, подобное толкование ошибочно. Лучей холода не существует. Предметы в соседстве со льдом становятся холоднее не под действием “лучей холода”, а потому, что они теряют путем лучеиспускания больше тепла, чем полу-

чают от льда. И теплый предмет, и холодный лед испускают путем излучения теплоту; предмет, нагретый сильнее, чем лед, отдает теплоты больше, чем получает. Приход тепла меньше расхода, — и предмет охлаждается.

Существует эффектный опыт, который также может навести на мысль о лучах холода. У двух противоположных стен длинного зала устанавливаются большие вогнутые зеркала. Если близ одного зеркала, в так называемом фокусе его, поместить сильный источник тепла, то испускаемые им лучи, отразившись от зеркала, направляются ко второму зеркалу, вновь отражаются и собираются им в одной точке — в фокусе; темная бумага, помещенная в этой точке, загорается. Это наглядно свидетельствует о существовании греющих лучей. Но если, вместо источника тепла, поместить в фокусе первого зеркала кусок льда, то окажется, что термометр, находящийся в фокусе второго зеркала, обнаружит здесь холод. Не значит ли это, что лед испускает холодные лучи, отражающиеся от зеркал и собирающиеся на шарике термометра?

Нет, и в этом случае можно объяснить явление без таинственных лучей холода. Шарик термометра путем излучения отдает льду больше теплоты, чем сам получает от льда; поэтому ртуть в нем охлаждается. Итак, здесь также нет причины допускать существование холодящих лучей. Никаких лучей холода в природе нет: все виды лучей сообщают энергию, а не отнимают ее.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ЗВУК. ВОЛНООБРАЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Звук и радиоволны

Звук распространяется примерно в миллион раз медленнее света; а так как скорость радиоволн совпадает со скоростью распространения световых колебаний, то звук в миллион раз медленнее радиосигнала. Отсюда вытекает любопытное следствие, сущность которого выясняется задачей: кто раньше услышит первый аккорд пианиста, посетитель концертного зала, сидящий в 10 метрах от рояля, или радиослушатель у аппарата, принимающий игру пианиста у себя на квартире, в 100 километрах от зала?

Как ни странно, радиослушатель услышит аккорд раньше, чем посетитель концертного зала, хотя первый сидит в 10 000 раз дальше от музыкального инструмента. В самом деле: радиоволны пробегают 100-километровое расстояние за

$$\frac{100}{300000} = \frac{1}{3000} \text{ секунды.}$$

Звук же проходит 10-метровое расстояние за

$$\frac{10}{340} = \frac{1}{34} \text{ секунды.}$$

Отсюда видно, что передача звука по радио потребует почти в сто раз меньше времени, чем передача звука через воздух.

Звук и пуля

Когда пассажиры жюль-вернова снаряда полетели на Луну, они были озадачены тем, что не слышали звука выстрела колоссальной пушки, извергнувшей их из своего жерла. Иначе и быть не могло. Как бы оглушительен ни был грохот, скорость распространения его (как и вообще всякого звука в воздухе)

равнялась всего лишь 340 м/с, снаряд же двигался со скоростью 11000 м/с. Понятно, что звук выстрела не мог достичь ушей пассажиров: снаряд обогнал звук ¹.

А как обстоит дело с настоящими снарядами и пулями: движутся ли они быстрее звука или, напротив, звук перегоняет их и предупреждает жертву о приближении смертоносного снаряда?

Современные винтовки сообщают пулям при выстреле скорость, почти втрое большую, чем скорость звука в воздухе — именно около 900 м/с (скорость звука при 0 °С равна 332 м/с). Правда, звук распространяется равномерно, пуля же летит, замедляя скорость своего полета. Однако в течение большей части пути пуля все же движется быстрее звука. Отсюда прямо следует, что если во время перестрелки вы слышите звук выстрела или свист пули, то можете не беспокоиться: *эта пуля вас уже миновала*. Пуля перегоняет звук выстрела, и если пуля поразит свою жертву, то последняя будет убита раньше, чем звук выстрела, которым послана эта пуля, достигнет ее уха.

Мнимый взрыв

Состязание в скорости между летящим телом и производимым им звуком заставляет нас иногда невольно делать ошибочные заключения, подчас совершенно не отвечающие истинной картине явления.

Любопытный пример представляет болид (или пушечный снаряд), пролетающий высоко над нашей головой. Болиды, проникающие в атмосферу нашей планеты из мирового пространства, обладают огромной скоростью, которая, даже будучи уменьшена сопротивлением атмосферы, все же *в десятки раз* больше скорости звука.

Прорезая воздух, болиды нередко производят шум, напоминающий гром. Вообразите, что мы находимся в точке *С* (рис. 152), а сверху над нами по линии *АВ* летит болид. Звук, производимый болидом в точке *А*, дойдет до нас (в *С*) только тогда, когда сам болид успеет уже переместиться в точку *В*; так как болид летит гораздо быстрее звука, то он может успеть дойти до некоторой точки *Д* и отсюда послать нам звук раньше, чем дойдет до нас звук из точки *А*. Поэтому мы услышим сначала звук из точки *Д* и лишь потом звук из точки *А*. И так как из точки *В* звук придет к нам тоже позже, чем из точки *Д*, то где-то над нашей головой должна быть такая точка *К*, находясь в которой болид подает свой звуковой сигнал

раньше всего. Любители математики могут вычислить положение этой точки, если задаться определенным отношением скорости болида и звука.

Вот результат: то, что мы *услышим*, будет вовсе не похоже на то, что мы *увидим*. Для глаза болид появится прежде всего в точке *A* и отсюда пролетит по линии *AB*. Но для уха болид появится прежде всего где-то над нашей головой в точке *K*, затем мы услышим в одно время два звука, затихающие по противоположным направлениям: от *K* к *A* и от *K* к *B*.




Рис. 152. Мнимый взрыв болида.

Другими словами, мы услышим, как болид словно распался на две части, которые унеслись в противоположные стороны. Между тем в действительности никакого взрыва не происходило. Вот до чего обманчивы могут быть слуховые впечатления! Возможно, что многие засвидетельствованные “очевидцами” взрывы болидов — именно такого рода обманы слуха.

Если бы скорость звука уменьшилась...

Если бы звук распространялся в воздухе не со скоростью 340 м/с, а гораздо медленнее, то обманчивые слуховые впечатления наблюдались бы гораздо чаще.

Вообразите, например, что звук пробегает в секунду не 340 м, а, скажем, 340 мм, т. е. движется медленнее пешехода. Сидя в кресле, вы слушаете рассказ вашего знакомого, который имеет привычку говорить, расхаживая взад и вперед по комнате. При обыкновенных обстоятельствах это

расхаживание нисколько не мешает вам слушать; но при уменьшенной скорости звука вы ровно ничего не поймете из речи вашего гостя: звуки, прежде произнесенные, будут догонять новые и перемешиваться с ними,— получится путаница звуков, лишенная всякого смысла.

Между прочим, в те моменты, когда гость к вам приближается, звуки его слов будут достигать вас *в обратном порядке*: сначала достигнут вас звуки, только что произнесенные, потом звуки, произнесенные ранее, затем— еще ранее и т. д., потому что произносящий обгоняет свои звуки и находится все время впереди их, продолжая издавать новые. Из всех фраз, произнесенных при подобных условиях, вы могли бы понять разве только ту, которой великовозрастный бурсак некогда изумил юного Караса из “Очерков бусы” Помяловского*:

“Я иду с мечом, судия”.

Самый медленный разговор

Если вы думаете, однако, что истинная скорость звука в воздухе— треть километра в секунду— достаточно велика, то сейчас измените свое мнение.

Вообразите, что между Москвой и Ленинградом вместо электрического телефона устроена обыкновенная переговорная труба вроде тех телефонов, которыми соединяли раньше отдельные помещения больших магазинов или которой пользовались на пароходах для сообщения с машинным отделением. Вы стоите у ленинградского конца этой 650-километровой трубы, а ваш друг— у московского. Задаете вопрос и ожидаете ответ. Проходит пять, десять, пятнадцать минут,—ответа нет. Вы начинаете беспокоиться и думаете, что с собеседником случилось несчастье. Но опасения напрасны: вопрос *еще не дошел до Москвы* и находится теперь только на половине пути. Пройдет еще четверть часа, прежде чем ваш знакомый в Москве услышит вопрос и сможет дать ответ. Но и его реплика будет идти из Москвы в Ленинград не менее получаса, так что ответ на свой вопрос вы получите только спустя час.

* Строго говоря, это не вполне верно: мы произносим в один прием не отдельные буквы, а целые слоги. Фраза будет слышна приблизительно так: я ди-су м-чо-мес ду-и-я.

Можете проверить расчет: от Ленинграда до Москвы 650 км; звук проходит в секунду $1/3$ км; значит, расстояние между городами он пробежит за 2160 с лишним секунд, или за 35 минут с небольшим. При таких условиях, разговаривая целый день с утра до вечера, вы едва успеете обменяться десятком фраз².

Скорейшим путем

Было, впрочем, время, когда даже и такой способ передачи известий считался бы очень быстрым. Сто лет назад никто не мечтал об электрическом телеграфе и телефоне, и передача новости за 650 км в течение нескольких часов признавалась бы идеалом быстроты.

Рассказывают, что при короновании царя Павла I извещение о моменте начала церемонии в Москве было передано в северную столицу следующим образом. Вдоль всего пути между обеими столицами были расставлены солдаты, в 200 м один от другого; при первом ударе колокола собора ближайший солдат выстрелил в воздух; его сосед, услышав сигнал, также немедленно разрядил ружье, за ним стрелял третий часовой, — и таким образом сигнал был передан в Петербург в течение всего трех часов. Спустя три часа после первого удара московского колокола уже грохотали пушки Петропавловской крепости, на расстоянии в 650 км.

Если бы звон московских колоколов можно было непосредственно услышать в Петербурге, то звук, как мы уже знаем, пришел бы в северную столицу с опозданием всего на полчаса. Значит, из трех часов, употребленных на передачу сигнала, 2,5 часа ушло на то, что солдаты воспринимали звуковое впечатление и делали необходимые для выстрела движения; как ни ничтожно это промедление, все же из тысяч таких маленьких промежутков накопилось 2,5 часа.

Сходным образом действовал в старину оптический телеграф, передававший световые сигналы до ближайшей станции, которая в свою очередь передавала их далее. Системой световой передачи сигналов нередко пользовались в царское время революционеры для охраны собраний подпольщиков: цепь революционеров протягивалась от места собрания до помещения полиции и при первых тревожных признаках давала об этом знать собранию вспышками карманных электрических фонариков.

Барабанный телеграф

Передача известий посредством звуковых сигналов распространена у некоторых племен Африки, Центральной Америки и Полинезии. Первобытные племена употребляют для этой цели особые барабаны, с помощью которых передают звуковые сигналы на огромное расстояние: условный сигнал, услышанный в одном месте, повторяется в другом, передается таким же образом далее, — и в короткое время обширная область уведомляется о каком-либо важном событии (рис. 153).



Рис. 153. Туземец, переговаривающийся с помощью барабанного “телеграфа”.

Во время первой войны Италии с Абиссинией все передвижения итальянских войск быстро становились известными негусу Менелику; обстоятельство это приводило в недоумение итальянский штаб, не подозревавший о существовании у противника барабанного “телеграфа”.

В начале второй войны Италии с Абиссинией подобным же образом был “опубликован” изданный в Аддис-Абебе приказ о всеобщей мобилизации: через несколько часов он стал известен в самых отдаленных селениях страны.

То же самое наблюдалось и во время англо-бурской войны: благодаря “телеграфу” кафров все военные известия с необыкновенной быстротой распространялись среди

обитателей Каплэнда, на несколько суток опережая официальные донесения через курьеров.

По свидетельству путешественников (Лео Фробениус), система звуковых сигналов разработана у некоторых африканских племен так хорошо, что их можно считать обладателями телеграфа, более совершенного, чем оптический телеграф европейцев, предшествовавший электрическому.

Вот что сообщалось об этом в одном журнале. Р. Гасельден, археолог Британского музея, находился в городе Ибада, расположенном в глубине Нигерии. Постоянный глухой барабанный бой непрерывно гудел днем и ночью.. Однажды утром ученый услышал, что черные о чем-то оживленно переговариваются. На его расспросы один сержант ответил: “Большой корабль белых людей потонул; много белых погибло”. Таково было известие, сообщенное на барабанном языке с побережья. Ученый не придал этому слуху никакого значения. Однако через три дня он получил запоздавшую (вследствие перерыва сообщения) телеграмму о гибели “Лузитании”. Тогда он понял, что негритянское известие было верно и что оно “прогремело” на барабанном языке через все земли от Каира до Ибады. Это было тем более удивительно, что племена, передавшие друг другу это сообщение, говорят на совершенно различных наречиях и некоторые из них в это время вели войны друг с другом.

Звуковые облака и воздушное эхо

Звук может отражаться не только от твердых преград, но и от таких образований, как облака. Более того, даже совершенно прозрачный воздух может при некоторых условиях отражать звуковые волны,— именно в том случае, когда он, по способности проводить звук, отличается почему-либо от остальной массы воздуха. Здесь происходит явление, сходное с тем, что в оптике называется “полным внутренним отражением”. Звук отражается от невидимого препятствия, и мы слышим загадочное эхо, идущее неизвестно откуда.

Тиндаль случайно открыл этот любопытный факт, когда производил опыты с звуковыми сигналами на берегу моря. “От совершенно прозрачного воздуха получалось эхо,— пишет он.— Эхо шло к нам, словно по волшебству, от невидимых звуковых облаков”³.

Звуковыми облаками знаменитый английский физик называл те участки прозрачного воздуха, которые заставляют

звук отражаться, порождая “эхо от воздуха”. Вот что говорит он по этому поводу:

“Звуковые облака постоянно плавают в воздухе. Они не имеют ни малейшего отношения к обыкновенным облакам, к туману или мгле. Самая прозрачная атмосфера может быть полна ими. Таким образом могут получаться воздушные эхо; вопреки господствующему мнению, они могут происходить и при самой ясной атмосфере. Существование таких воздушных эхо доказано наблюдениями и опытом. Они могут порождаться воздушными токами, различно нагретыми или содержащими различное количество пара”.

Существование звуковых облаков, непрозрачных для звука, объясняет нам некоторые загадочные явления, иногда наблюдаемые во время сражений. Тиндаль приводит следующий отрывок из воспоминаний очевидца о франко-прусской войне 1871 г.:

“Утро 6-го числа представляло полную противоположность с вчерашним утром. Вчера был пронизывающий холод и туман, не позволявший ничего видеть далее полумили. А 6-го было ясно, светло и тепло. Вчера воздух был наполнен звуками, а сегодня царствовала тишина Аркадии, не знающей войны. Мы с изумлением смотрели друг на друга. Неужели бесследно исчез Париж, его форты, орудия, бомбардировка? .. Я поехал в Монморанси, откуда моим глазам открылась обширная панорама северной стороны Парижа. Однако и здесь была мертвая тишина... Я встретил трех солдат, и мы начали обсуждать положение вещей. Они готовы были допустить, что начались переговоры о мире, так как с самого утра не слышали ни одного выстрела...

Я отправился дальше в Гонесс. С изумлением узнал я, что германские батареи энергично стреляли с 8 часов утра. На южной стороне бомбардировка началась около того же часа. Однако в Монморанси мы не слышали ни единого звука! ... Все это зависело от воздуха: сегодня он проводил звук так же дурно, как хорошо проводил вчера”.

Сходные явления не раз наблюдались и во время больших сражений 1914—1918 гг.

Беззвучные звуки

Есть люди, которые не слышат таких резких звуков, как пение сверчка или писк летучей мыши. Люди эти не глухи,— их органы слуха в исправности, и все же они не слышат очень высоких тонов. Тиндаль— знаменитый английский физик— утверждал, что некоторые люди не слышат даже чириканья воробья!

Вообще наше ухо воспринимает далеко не все колебания, происходящие близ нас. Если тело совершает в секунду менее 16 колебаний, мы звука не слышим. Если оно совершает более 15—22 тысяч колебаний, мы тоже не слышим его. Верхняя граница восприятия тонов у разных лиц различна; у пожилых людей она понижается до 6 тысяч колебаний в секунду. Поэтому и происходит то странное явление, что пронзительный высокий тон, отчетливо слышимый одним лицом, для другого не существует.

Многие насекомые (например, комар, сверчок) издают звуки, тон которых отвечает 20 тысячам колебаний в секунду; для одних ушей эти тона существуют, для других — нет. Такие нечувствительные к высоким тонам люди наслаждаются полной тишиной там, где другие слышат целый хаос пронзительных звуков. Тиндаль рассказывает, что наблюдал однажды подобный случай во время прогулки в Швейцарии со своим другом: “Луга по обеим сторонам дороги кишели насекомыми, которые для моего слуха наполняли воздух своим резким жужжанием, но мой друг ничего этого не слышал: музыка насекомых лежала вне границы его слуха”

Писк летучей мыши целой октавой ниже пронзительного пения насекомых, т. е. колебания воздуха при этом вдвое менее часты. Но попадают люди, для которых граница восприятия тонов лежит еще ниже, и летучие мыши для них — существа безгласные.

Напротив, собаки, как было установлено в лаборатории Павлова, воспринимают тона с числом колебаний до 38 тысяч в секунду.

Ультразвуки на службе техники

Физика и техника наших дней обладают средством создавать “бесзвучные звуки” гораздо большей частоты, чем те, о которых мы сейчас говорили: число колебаний может достигать в этих “сверхзвуках” (“ультразвуках”) до 700 тысяч в секунду. Такой “тон” примерно на 18 октав выше самого высокого “ля” рояля, — тона, имеющего 3480 колебаний в секунду⁴.

Один из способов получения ультразвуковых колебаний основан на свойстве поверхностей пластинок, определенным образом вырезанных из кристалла кварца, при сжатии электризоваться*; если же, наоборот, заряжать периодичес-

* Это свойство кристаллов называется пьезоэлектричеством.

ки поверхности такой пластинки, то под действием электрических зарядов она попеременно сжимается и расширяется, т. е. колеблется: получаются ультразвуковые колебания. Заряжают же пластинку с помощью лампового генератора, частота которого подбирается в соответствии с так называемым “собственным” периодом колебаний пластинки ⁵.

Хотя ультразвуки безмолвны для вас, они обнаруживают свое действие иными, весьма ощутимыми проявлениями. Если, например, колеблющуюся пластинку погрузить в сосуд с маслом, то на поверхности жидкости, охваченной ультразвуковыми колебаниями, вспучивается горка высотой 10 см, а масляные капельки разбрызгиваются до высоты 40 см. Погрузив в такую масляную ванну конец стеклянной трубки длиной 1 м, мы ощутим в руке, держащей другой конец, сильнейший ожог, оставляющий следы на коже. Соприкасаясь с деревом, конец трубки, находящийся в состоянии колебания, прожигает отверстие; энергия ультразвуков превращается в тепловую.

Ультразвуковые колебания оказывают сильное действие на живой организм: нити водорослей разрываются, животные клеточки лопаются, кровяные тельца разрушаются; мелкие рыбы и лягушки умерщвляются ультразвуками за 1—2 минуты; температура тела испытуемых животных повышается, — у мыши, например, до 45 °С. Ультразвуковые колебания находят себе применение в медицине; неслышимые ультразвуки разделяют судьбу невидимых ультрафиолетовых лучей, придя на помощь врачеванию.

Особенно успешно применяются ультразвуки в металлургии для обнаружения неоднородностей, раковин, трещин и других недостатков в толще металла. Метод “просвечивания” металла ультразвуком состоит в том, что испытуемый металл смачивают маслом и подвергают действию ультразвуковых колебаний. Звук рассеивается неоднородными участками металла, которые отбрасывают как бы звуковую тень; очертание неоднородностей так четко вырисовывается на фоне равномерной ряби, покрывающей масляный слой, что получающуюся картину можно даже сфотографировать ⁶.

“Просветить” ультразвуком можно металлическую толщу в целый метр и более, что совершенно недоступно для рентгеновского просвечивания; при этом обнаруживаются неоднородности весьма мелкие — до одного миллиметра. Несомненно, что перед сверхзвуковыми колебаниями большая перспектива ⁷.

Голоса лилипутов и Гулливера

В фильме “Новый Гулливер” лилипуты говорят высокими голосами, соответствующими маленьким размерам их гортани, а великан — Петя — низким голосом. При съемке говорили за лилипутов взрослые артисты, а Петю играл ребенок; как же было достигнуто требуемое изменение в тоне голоса? Я был немало удивлен, когда режиссер Птушко сказал мне, что исполнители говорили на съемке своими естественными голосами; изменение же тона достигалось в процессе съемки оригинальным приемом, основанным на физических особенностях звука.

Чтобы сделать голоса лилипутов высокими, а голос Гулливера низким, режиссер фильма записывал голоса артистов, игравших лилипутов, при *замедленном* движении ленты, голос же Пети, напротив, при *ускоренном* ее движении. На экран картина проектируется с нормальной скоростью. Нетрудно понять, что должно вследствие этого получиться. Голоса лилипутов воспринимаются слушателем при *учащенном* против нормального чередования звуковых колебаний; от этого тон их должен *повыситься*. Голос же Пети, напротив, воспринимается при *замедленном* чередовании колебаний и, значит, должен *понизиться* в тоне. В итоге лилипуты в “Новом Гулливере” говорят голосом, на квинту *выше* голоса нормального взрослого человека, а сам Гулливер — Петя — на квинту *ниже* нормального тона.

Так своеобразно была использована “лупа времени” для звука. Это явление часто наблюдается, когда патефонная пластинка проигрывается со скоростью, большей или меньшей, чем скорость записи (78 об/мин или 33 об/мин).

Для кого ежедневная газета выходит дважды в день?

Сейчас мы займемся задачей, которая на первый взгляд никакого отношения ни к звуку, ни к физике не имеет. Тем не менее я попрошу вас уделить ей внимание: она поможет вам легче уяснить себе дальнейшее.

Вероятно, вы уже встречались с этой задачей в одном из ее многочисленных видоизменений. Из Москвы во Владивосток каждый полдень выходит поезд. И каждый полдень из Владивостока в Москву также выходит поезд. Переезд длится, положим, 10 дней. Спрашивается: сколько

поездов дальнего следования встретится вам во время путешествия из Владивостока в Москву?

Чаще всего отвечают: 10 поездов.

Однако ответ неправилен: вы встретите не только 10 поездов, которые выйдут из Москвы *после* вашего отбытия, но и те, которые к моменту вашего отъезда *уже находились в пути*. Следовательно, правильный ответ 20, а не 10.

Далее. Каждый московский поезд везет с собой свежие номера газет. И если вы интересуетесь новостями, вы, конечно, будете на станциях усердно покупать газеты. Сколько же свежих номеров газеты купите вы за 10 дней пути?

Вас не затруднит теперь правильный ответ: 20. Ведь каждый встречаемый вами поезд везет новые номера, а так как вы встретите 20 поездов, то номеров прочтете тоже 20. Но путешествуете вы всего 10 дней, значит, *вы будете читать ежедневную газету дважды в день!*

Вывод немного неожиданный, и вы, вероятно, не сразу поверили бы ему, если бы вам не случилось на практике убеждаться в его правильности. Вспомните хотя бы, что во время двухдневного переезда из Севастополя в Ленинград вы успевали прочитать ленинградские газеты не за *два*, а за *четыре* дня: те два номера, которые уже вышли в Ленинграде к моменту вашего отъезда, да еще два номера, которые выходят в свет в течение двух дней пути.

Итак, вы знаете уже, для кого ежедневные столичные газеты выходят дважды в день: для пассажиров всех поездов, едущих в столицу.

Задача о паровозных свистках

Если вы обладаете развитым музыкальным слухом, то заметили, вероятно, как изменяется тон (не громкость, а именно *тон*, высота) паровозного свистка, когда встречный поезд проносится мимо вашего. Пока оба поезда сближались, тон был заметно *выше* того, который слышится вам, когда поезда удаляются друг от друга. Если поезда идут со скоростью 50 км/с, то разница в высоте звука достигает почти целого тона.

Отчего же это происходит?

Вам нетрудно будет догадаться о причине, если вы вспомните, что высота тона зависит от числа колебаний в секунду; сопоставьте же это с тем, что вы узнали при обсуждении предыдущей задачи. Свисток встречного паро-

воза все время испускает один и тот же звук, с определенной частотой. Но ваше ухо воспринимает различное число колебаний в зависимости от того, едете ли вы навстречу, стоите ли вы на месте или удаляетесь от источника колебаний.

И подобно тому как по пути в Москву вы читаете ежедневную московскую газету чаще раза в день, так и здесь, приближаясь к источнику звука, вы улавливаете колебания *чаще, чем они исходят от свистка локомотива*. Но здесь вы уже *не рассуждаете*: ваше ухо получает увеличенное число колебаний,— и вы непосредственно *слышите повышенный тон*. Удаляясь, вы получаете меньшее число колебаний— и *слышите пониженный тон*.




Рис. 154. Задача о паровозных свистках.

Если это объяснение не окончательно убедило вас, попробуйте непосредственно проследить (конечно, мысленно) за тем, как распространяются звуковые волны от свистка паровоза (рис. 154). Рассмотрите сначала *неподвижный* паровоз (верхняя волнистая линия). Свисток производит звуковые волны, и мы рассмотрим для простоты только четыре волны: от неподвижного паровоза они успеют распространиться в какой-нибудь промежуток времени на одно и то же расстояние по всем направлениям. Волна 0 дойдет до наблюдателя A и до наблюдателя B через одно и то же время; затем до обоих наблюдателей одновременно дойдет волна 1, 2, потом 3 и т. д. Уши обоих наблюдателей в секунду

получают одинаковое число толчков, и потому оба услышат один и тот же тон.

Другое дело, если свистящий паровоз *движется* от B' к A' (нижняя волнистая линия). Пусть в некоторый момент свисток находится в точке C' , а за время, когда он испустил четыре волны, он уже успел дойти до точки D .

Теперь сравните, как будут распространяться звуковые волны. Волна O , вышедшая из точки C' , дойдет одновременно до обоих наблюдателей A' и B' . Но четвертая волна, образовавшаяся в точке D , дойдет до них уже не одновременно: путь DA' меньше пути DB' и, следовательно, к A' она дойдет раньше, чем к B' . Промежуточные волны (1 и 2) также придут в B' позже, чем в A' , но промедление будет меньшее. Что же получается? Наблюдатель в точке A' будет *чаще* воспринимать звуковые волны, нежели наблюдатель в точке B' : первый услышит *более высокий тон*, нежели второй. Вместе с тем, как легко видеть из рисунка, длина волн, бегущих в направлении к точке A' , будет соответственно короче длины волн, идущих к B' .

Явление Доплера

Явление, которое мы только что описали, открыто было физиком Доплером и навсегда осталось связанным с именем этого ученого. Оно наблюдается не только для звука, но и для световых явлений, потому что свет тоже распространяется волнами. Учащение волн (воспринимаемое в случае звуковых волн как повышение тона) в случае световых волн воспринимается глазом как изменение *цвета*.

Правило Доплера дает астрономам чудесную возможность не только выяснить, приближается ли звезда к нам или удаляется, но позволяет даже измерить скорость этого перемещения.

Помощь астроному оказывает при этом боковое смещение темных линий, прорезывающих полосу спектра. Внимательное изучение того, в какую сторону и насколько сдвинулись темные линии в спектре небесного светила, позволило астрономам сделать целый ряд открытий. Так,

* Необходимо иметь в виду, что волнообразные линии на рисунке вовсе не изображают *формы* звуковых волн: колебание частиц в воздухе происходит *вдоль* направления звука, а не поперек. Волны изображены здесь *поперечными* только ради наглядности, и горб такой волны соответствует наибольшему сжатию в продольной звуковой волне.

благодаря явлению Доплера мы знаем, что яркая звезда Сириус каждую секунду удаляется от нас на 75 км. Эта звезда находится от нас на таком неимоверно огромном расстоянии, что удаление даже на миллиарды километров не изменяет заметно ее видимой яркости. Мы, вероятно, никогда не узнали бы о движении этого светила, если бы нам не помогло явление Доплера.

С поразительной наглядностью сказывается на этом примере то, что физика есть наука поистине *всеобъемлющая*. Установив закон для *звуковых* волн длиной в несколько метров, она применяет его к исчезающе маленьким *световым* волнам, длиной всего в несколько десятитысячных долей миллиметра, и пользуется этим знанием, чтобы измерять стремительные движения гигантских солнц в неимоверных далях мироздания.

История одного штрафа

Когда Доплер впервые (в 1842 г.) пришел к мысли, что взаимное сближение или удаление наблюдателя и источника звука или света должно сопровождаться изменением длины воспринимаемых звуковых или световых волн, он высказал смелое соображение, что именно в этом кроется причина окраски звезд. Все звезды, думал он, сами по себе белого цвета; кажутся же многие из них окрашенными потому, что они быстро движутся по отношению к нам. Быстро приближающиеся белые звезды посылают земному наблюдателю укороченные световые волны, порождающие ощущение зеленого, голубого или фиолетового цветов; напротив, быстро удаляющиеся белые звезды кажутся нам желтыми или красными.

Это была оригинальная, но безусловно ошибочная мысль. Для того чтобы глаз мог заметить изменение окраски звезд, обусловленное движением, надо было бы прежде всего наделить звезды огромными скоростями — порядка десятков тысяч километров в секунду. Но и это оказалось бы недостаточным: дело в том, что одновременно с превращением, например, голубых лучей приближающейся белой звезды в фиолетовые лучи зеленые превращаются в голубые, место ультрафиолетовых занимают фиолетовые, красных — инфракрасные; словом, составные части белого света остаются, так что, несмотря на общий сдвиг всех цветов спектра, глаз не должен был бы заметить никакого изменения общей окраски.

Другое дело — сдвиг темных линий в спектре звезд, движущихся по отношению к наблюдателю: эти перемещения хорошо улавливаются точными инструментами и позволяют определять скорость движения звезд по лучу зрения. Хороший спектроскоп устанавливает скорость звезды, равную даже 1 км/с⁸.

Заблуждение Доплера вспомнилось знаменитому физику Роберту Вуду, когда полисмен готовился однажды оштрафовать его за то, что он не остановил свой быстро мчавшийся автомобиль, несмотря на красный сигнал. Вуд, как рассказывают, стал тогда уверять блюстителя порядка, что при быстрой езде навстречу сигналу красный цвет воспринимается как зеленый. Будь полисмен сведущ в физике, он мог бы рассчитать, что для оправдания слов ученого автомобиль должен был мчаться с совершенно невероятной скоростью: 135 млн. км/ч.

Вот этот расчет. Если через l обозначить длину волн света, испускаемого источником (в данном случае сигнальным фонарем), через l' — длину волн, воспринимаемых наблюдателем (в автомобиле), через v — скорость автомобиля, а через c — скорость света, то зависимость между этими величинами, установленная теорией, такова:

$$\frac{l}{l'} = 1 + \frac{v}{c}.$$

Зная, что самая короткая на волн, отвечающая красному цвету, равна 630 нм, а самая длинная волна зеленого цвета равна 560 нм, подставляем эти значения в формулу; скорость света вам также известна: 300 тыс. км/с. Имеем

$$\frac{630}{560} = 1 + \frac{v}{300000},$$

откуда скорость автомобиля

$$v = \frac{300000 \cdot 8}{8} = 37500 \text{ км/с},$$

или 135 млн. км/ч. При такой скорости Вуд в течение часа с небольшим отъехал бы от полисмена дальше, чем до Солнца. Говорят, что его все-таки оштрафовали “за превышение дозволенной скорости”.

Со скоростью звука

Что слышали бы вы, если бы удалялись от играющего оркестра со скоростью звука?

Человек, едущий из Ленинграда на почтовом поезде, видит на всех станциях у газетчиков одни и те же номера газет, именно те, которые вышли в день его отбытия. Это и понятно, потому что номера газет едут вместе с пассажиром, а свежие газеты везутся поездами, идущими позади. На этом основании можно, пожалуй, заключить, что, удаляясь от оркестра со скоростью звука, мы будем все время слышать одну и ту же ноту, которую оркестр взял в начальный момент нашего движения.

Однако заключение это неверно; если вы удаляетесь со скоростью звука, то звуковые волны, оставаясь относительно вас в покое, вовсе не ударяют в вашу барабанную перепонку, а следовательно, вы не можете слышать никакого звука. Вы будете думать, что оркестр прекратил игру.

Но почему же сравнение с газетами привело к другому ответу? Да просто потому, что мы неправильно применили в данном случае рассуждение по аналогии. Пассажир, встречающий всюду одни и те же номера газет, вообразит (т. е. мог бы вообразить, если бы забыл о своем движении), что выпуск новых номеров в столице вовсе прекратился со дня его отъезда. Для него газетные издательства прекратили бы свое существование, как прекратилось бы существование звука для движущегося слушателя. Любопытно, что в этом вопросе могут иногда запутаться даже ученые, хотя, в сущности, он не так уж сложен. В споре со мной (я был тогда еще школьником) один астроном не соглашался с таким решением предыдущей задачи и утверждал, что, удаляясь со скоростью звука, мы должны слышать все время один и тот же тон. Он доказывал свою правоту следующим рассуждением (привожу отрывок из его письма):

“Пусть звучит нота известной высоты. Она звучала так с давнего времени и будет звучать неопределенно долго. Наблюдатели, размещенные в пространстве, слышат ее последовательно и, допустим, неослабно. Почему же вы не могли бы ее слышать, если бы с быстротой звука или даже мысли перенеслись на место любого из этих наблюдателей?”

Точно так же доказывал он, что наблюдатель, удаляющийся от молнии со скоростью света, будет все время непрерывно видеть эту молнию:

“Представьте себе непрерывный ряд глаз в пространстве. Каждый из них будет получать световое впечатление после предыдущего; представьте, что вы мысленно и последовательно можете побывать на месте каждого из этих глаз,— и очевидно, вы все время будете видеть молнию”.

Разумеется, ни то ни другое утверждение неверно: при указанных условиях мы не услышим звука и не увидим молнии. Это видно, между прочим, из формулы, полученной в предыдущей статье; если в ней положить $v = -c$, длина воспринимаемой волны l' получится бесконечной, что равносильно отсутствию волн.

Курьезы слуха

Когда мы грызем твердый сухарь, мы слышим оглушительный шум, между тем как наши соседи едят те же сухари без заметного шума. Как ухитряются они избегать этого грохота?

Дело в том, что шум и грохот существуют лишь в наших ушах и мало беспокоят уши наших соседей. Кости черепа, как и вообще твердые, упругие тела, очень хорошо проводят звуки, а звук в плотной среде усиливается иногда до чрезвычайных размеров. Доходя до уха *через воздух*, треск сухаря воспринимается как легкий шум; но тот же треск превращается в грохот, если доходит до слухового нерва через твердые кости черепа. Вот еще опыт из той же области: зажмите между зубами колечко карманных часов и плотно закройте уши пальцами: вы услышите тяжелые удары— так усилятся тиканье часов.

Бетховен, оглохнув, слушал, говорят, игру на рояле, приставив к нему одним кондом свою трость, другой конец которой он держал у зубов⁹. Точно так же те глухие, у которых уцелело внутреннее ухо, могут танцевать под музыку: звуки достигают до их слуховых нервов через пол и кости.

* * *

“Занимательная физика” закончена. Если она возбудила в читателе желание поближе познакомиться с необъятной областью той науки, откуда почерпнута эта пестрая горсть простейших сведений, то задача автора выполнена, цель достигнута, и с чувством удовлетворения ставит он последнюю точку после слова “конец”.

СТО ВОПРОСОВ КО ВТОРОЙ КНИГЕ “ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА”

1. Можно ли с воздушного шара заметить, как вращается под ним земной шар?

2. Падает ли вниз отвесно камень, выпущенный во время полета летчиком из рук?

3. Можно ли устроить так, чтобы пассажиры безопасно покидали железнодорожный поезд на полном ходу?

4. Когда ледорез дробит носом лед, равно ли его действие противодействию льда?

5. Почему взлетает ракета? Может ли взлететь зажатая ракета в безвоздушном пространстве?

6. Существуют ли животные, движущиеся по образцу ракеты?

7. Всегда ли силы, направленные несогласованно, не сообщают телу никакого движения?

8. Почему свод прочнее плоского потолка?

9. Как движется парусная лодка?

10. Можно ли, имея длинный рычаг и точку опоры, поднять земной шар?

11. Чем объясняется то, что узел крепко держит связанные им веревки?

12. Можно ли пользоваться узлами, если бы не было трения?

13. Укажите выгоды и невыгоды от отсутствия трения.

14. Когда половая щетка уравновешена на спинке стула, какая ее часть тяжелее: короткая или длинная?

15. Почему не опрокидывается вращающийся волчок?

16. Когда вода не выливается из опрокинутого стакана?

17. Когда шар не скатывается вниз по наклону?

18. Где сила тяжести больше: в Ленинграде или в Москве?

19. Почему мы не замечаем взаимного притяжения предметов?

20. Какой длины прыжок могли бы вы сделать на Луне?
21. На какую высоту взлетела бы на Луне пуля винтовки при стрельбе отвесно вверх? Начальная скорость пули 900 м/с.
22. Если просверлить земной шар по диаметру и в образовавшуюся сквозную шахту бросить гирю, то где остановилась бы она при отсутствии сопротивления воздуха?
23. Как надо прорыть туннель сквозь гору, чтобы дождевая вода его не затопляла?
24. Можно ли бросить с Земли тело так, чтобы оно нигде на земной поверхности не упало?
25. В каких водах на территории СССР не утонет даже не умеющий плавать человек?
26. Как ледокол разламывает лед?
27. Доходят ли до дна океана затонувшие корабли?
28. На каком физическом законе был основан подъем “Садко”?
29. Кем введены в русскую речь слова “газ”, “материя”, “атмосфера”, “барометр”?
30. В чем состоит “задача о бассейнах” и правильно ли решают ее в школьных учебниках?
31. Можно ли устроить так, чтобы жидкость вытекала из сосуда неослабевающей струей?
32. Разорвутся ли “магдебургские полушария”, если их будут растягивать с каждой стороны не 8 лошадей, а 8 слонов, каждый из которых впятеро сильнее лошади?
33. Чем объясняется действие пульверизатора?
34. Почему взаимно притягиваются два рядом плывущих корабля?
35. Какую роль играет при плавании рыбы ее пузырь?
36. Какие два рода течения жидкости различают в физике?
37. Почему дым из фабричной трубы выходит клубами?
38. Почему флаг на ветре полощется?
39. Почему на песке пустыни образуются волны?
40. На какую высоту надо подняться в атмосфере, чтобы давление ее упало на 1000-ю долю?

41. Применим ли закон Мариотта к воздуху под давлением 500 атм?
42. Показывает ли термометр в ветреную погоду более низкую температуру, чем при отсутствии ветра?
43. Почему в ветреную погоду мороз хуже переносится, чем в тихую?
44. Всегда ли в жаркую погоду ветер приносит прохладу?
45. На чем основано действие охлаждающих кувшинов?
46. Как устроить охлаждающий шкаф, не пользуясь льдом?
47. Может ли наш организм выносить жару в 100 °С?
48. Почему 36-градусный зной в Ташкенте переносится легче чем 24-градусная жара в Ленинграде?
49. Для чего служит стекло в керосиновой лампе?
50. Почему продукты горения не гасят пламени керосиновой лампы или свечи?
51. Как горело бы пламя при отсутствии силы тяжести?
52. Как нагрелась бы на примусе вода при отсутствии силы тяжести?
53. Почему вода гасит огонь?
54. На чем основано тушение степного пожара при помощи поджигания травы?
55. Закипит ли чистая вода в сосуде, нагреваемом кипящей водой?
56. Замерзнет ли вода в бутылке, погруженной в смесь воды со льдом?
57. Может ли вода кипеть при комнатной температуре?
58. Как с помощью термометра определить давление атмосферы?
59. Существует ли горячий лед?
60. Какие магниты сильнее: естественные или искусственные?
61. Какие металлы, кроме железа, притягиваются сильным магнитом?
62. Существуют ли металлы, отталкиваемые сильным магнитом?
63. Действует ли магнит на жидкости и газы?

64. Какое техническое применение можно предложить, основываясь на свойстве магнита отклонять пламя?

65. Какое притяжение сильнее: железа магнитом или магнита железом?

66. Какой орган чувств воспринимает действие магнитной силы?

67. Можно ли электромагнитным подъемным краном поднимать раскаленные болванки?

68. Почему вредно для золотых часов приближение к сильному магниту? Для каких часов оно безвредно?

69. Что такое радиевые часы? Можно ли их назвать “вечным двигателем”?

70. Как на основании радиоактивного распада определить древность минералов и возраст Земли?

71. Почему птицы безнаказанно садятся на провода высоковольтной передачи?

72. Сколько времени длится молния?

73. Под каким углом друг к другу надо поставить два зеркала, чтобы предмет дал в них семь отражений?

74. Какая разница между солнечным двигателем и солнечным нагревателем?

75. Что такое “гелиотехника”?

76. Почему у рыб хрусталик глаза круглый?

77. Можно ли, окунувшись под воду, читать там книжный шрифт?

78. Кто различает лучше предметы под водой: водолаз со шлемом на голове или человек, нырнувший без шлема?

79. Может ли двояковыпуклая линза служить уменьшительным стеклом? А двояковогнутая — увеличительным стеклом?

80. Почему дно пруда кажется глазу приподнятым?

81. Что такое “предельный угол”?

82. Что такое “полное внутреннее отражение”?

83. Полезна ли рыбам их серебристая окраска?

84. Что такое “слепое пятно” нашего глаза? Как убедиться в его существовании?

85. Что такое “угол зрения”?

86. На каком расстоянии от глаза надо держать копеечную монету, чтобы она как раз закрывала полную Луну?

87. На сколько расходятся стороны угла в $1'$ при расстоянии 10 м от вершины?

88. Диаметр Юпитера примерно в 10 раз больше диаметра Земли. На каком расстоянии от нас находится эта планета, когда диск ее наблюдается под углом в $40''$?

89. Как надо понимать выражения: “микроскоп увеличивает в 300 раз”, “телескоп приближает в 500 раз”?

90. Почему автомобильные колеса на кинокартине часто вращаются назад, когда автомобиль мчится вперед?

91. Можно ли устроить так, чтобы быстро вращающийся шкив остановился для нашего глаза?

92. Верно ли, что заяц, не поворачивая головы, видит предметы, находящиеся позади?

93. Верно ли, что в темноте все кошки серы?

94. Что распространяется быстрее: радиосигнал или звук в воздухе?

95. Что движется быстрее: ружейная пуля или звук выстрела?

96. Какие звуковые колебания не воспринимает наше ухо?

97. Имеют ли беззвучные звуки техническое применение?

98. Что такое “звуковое облако”?

99. Как изменяется тон свистка приближающегося паровоза?

100. Что слышали бы мы, удаляясь от оркестра со скоростью звука?

ДОПОЛНЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА

К главе первой

¹ В самых сильных тропических циклонах ветер достигает скорости 110 м/с. Наибольшая скорость ветра была зарегистрирована в 1934 г. в США. Она составляла 115,6 м/с (416 км/ч). Этот факт приводится в книге: *Оксанович Л. В. Невидимый конфликт*.— М.: Стройиздат, 1981, с. 27.

² Сейчас этот прием используется иногда на электрифицированных железных дорогах. Он дает заметный выигрыш в экономии электроэнергии на участках дорог, где возможны частые остановки поезда.

³ При равномерном движении телеги требуется прикладывать некоторую силу (это задача лошади), чтобы преодолеть силу трения, которая противодействует движению телеги.

С объяснением у Перельмана парадокса “лошадь—телега” можно поспорить. Конечно, силы приложены к разным телам: к лошади и к телеге. Но между ними существует жесткая связь— упряжка. И с этой точки зрения лошадь и телегу можно рассматривать как единое тело. Движение лошади с телегой легко объяснить, если мы обратим внимание на то, как действует земля, т. е. реакция опоры, на эти два объекта. Если бы не было опоры под ногами лошади, а она отталкивалась бы от телеги, то сколько бы лошадь не старалась и сколько бы возница не погонял ее кнутом, этот странный экипаж никуда бы не уехал (см. статью “Можно ли двигаться без опоры?” на с. 254).

⁴ Известно, что у восточных народов еще в X—XII веках имелись пороховые ракеты, которые прикреплялись к стрелам и использовались в бою (см.: *Варваров Н. А. Популярная космонавтика*.— М.: Машиностроение, 1981, с. 16).

⁵ Гидрореактивные двигатели сейчас применяют иногда на так называемых водометах. Этим кораблям не страшны ни водоросли, ни мели; они используются на малых реках, например в качестве тракторов-амфибий на лесосплаве.

⁶ Для строительства пароходика удобно использовать плотную фольгу. Топливом может служить одеколон.

⁷ Подробно о реактивных двигателях в природе можно прочитать во многих книгах по бионике. См., например: *Литинецкий И. Б.* Бионика. — М.: Просвещение, 1976, с. 194.

⁸ Сегодня, когда автоматические космические аппараты совершают полеты к ближайшим планетам, доставляют на Землю образцы лунного грунта, когда спутники запускаются почти ежедневно и человек уже ступил на поверхность Луны, агитация Я. И. Перельмана за межпланетные полеты может показаться наивной молодому читателю, вся сознательная жизнь которого (а может быть и вообще вся жизнь) прошла после наступления в 1957 г. космической эры. Но мы оставляем в книге этот раздел как имеющий исторический интерес. — Я. И. Перельман был одним из первых неутомимых пропагандистов космических полетов.

К главе второй

¹ Строго говоря, на телегу, кроме всего прочего, действует и реакция опоры со стороны полотна дороги.

² Для более подробного знакомства с вопросами прочности архитектурных сооружений советуем обратиться к книге: *Гордон Дж.* Конструкции, или почему не ломаются вещи. — М.: Мир, 1980.

³ Использовать только энергию ветра и двигаться строго против ветра можно, если парус заменить ветродвигателем типа ветряной мельницы, который будет вращать гребной винт корабля. Существует даже известная задача П. Л. Капицы о таком необычном на первый взгляд судне (см. также журнал: *Катера и яхты*, 1981, №1, с. 25).

⁴ В парусном спорте есть ряд вопросов, интересных с точки зрения физика. Подробнее об этом виде спорта и некоторых технических проблемах плавания под парусом

сами можно узнать, например, из книг: *Гловацкий В.* Увлекательный мир парусов: Очерки по истории парусного спорта.— М.: Прогресс, 1979; *Проктор Я.* Плавание под парусом. Ветер, волнение и течение.— Л.: Гидрометеоиздат, 1981.

⁵ Существует целая наука о трении. Рекомендуем читателям для более глубокого знакомства с этим вопросом книгу: *Силин А. А.* Трение и его роль в развитии техники.— М.: Наука, 1976.

⁶ До сих пор речь шла о силах, действующих на борт ледокола со стороны льда. Чтобы проанализировать движение льда, требуется на самом деле рассматривать силы, действующие со стороны ледокола на лед, используя при этом третий закон Ньютона.

⁷ Я. И. Перельман был одним из самых активных организаторов “Павильона занимательной науки”, который был открыт для ленинградской молодежи в предвоенные годы.

К главе третьей

¹ Вращение обеспечивает устойчивость снарядов и пуль в полете. Гироскопические приборы применяются для автоматического управления движением летательных аппаратов, ракет, морских судов. Известны также разнообразные навигационные гироскопические приборы, например гирокомпас, гировертикаль, указатель курса и т. д. Целый ряд измерительных гироскопических приборов предназначается для определения характеристик движения тела: угловой скорости, углового ускорения и некоторых других. Во всех перечисленных приборах основным элементом является гироскоп— быстро вращающееся твердое тело, ось вращения которого может изменять свое направление в пространстве.

² См.: *Перри Дж.* Вращающийся волчок.— Вологда: Северный печатник, 1926.

³ Об устойчивом равновесии тел на подставке и о колумбовой задаче можно прочитать в журналах: *Наука и жизнь*, 1968, №10, с. 77; *Квант*, 1977, №7, с. 10.

⁴ На тело, кроме силы тяжести, действует реакция опоры— сила со стороны вращающейся платформы. Век-

торная сумма этих сил сообщает телу центростремительное ускорение, и тело вращается с постоянной угловой скоростью вокруг оси. Если же мы находимся во вращающейся системе координат, например на вращающейся платформе, то вращение можно учесть, введя в рассмотрение фиктивную центробежную силу, как это сделано на рис. 33. Но и тогда при рассмотрении всех сил, действующих на тело, не следует забывать о реакции опоры, составляющей которой может быть сила трения. неподвижному наблюдателю (в инерциальной системе координат) не нужно привлекать фиктивную центробежную силу, чтобы объяснить вращение человека на платформе.

⁵ Чертеж на рис. 41 следует рассматривать как приближенный. В точках *B* и *C* положение центра тяжести велосипедиста с велосипедом оказывается не на одной и той же высоте.

⁶ См. гл. 1 в первой книге “Занимательная физика”.

К главе четвертой

¹ О том, что происходит в недрах нашей планеты, помогают узнать не только глубинное бурение, но и другие физические методы исследования, и прежде всего изучение распространения сейсмических волн в Земле, наблюдение смещения отдельных участков суши, лабораторные исследования свойств пород при сверхвысоких давлениях, методы гравиметрии. Подробнее об этих исследованиях и новых данных о строении Земли читатель может узнать из популярной брошюры: *Жарков В. Н.* Внутреннее строение Земли, Луны и планет.— М.: Знание.— (Космонавтика и астрономия), 1973.

² Золотой рудник в Боксбурге (Трансвааль, Южная Африка), причем устье ствола расположено за высоте 1,6 км над уровнем моря, т. е. глубина шахты от уровня моря 1,7 км. В настоящее время неоднократно сообщалось о проведении глубинного бурения в нашей стране, например на Кольском полуострове, до отметки, превышающей 10-километровый рубеж. Такие работы представляют не только чисто научный интерес, но и преследуют практические цели, являясь частью программы гео-

логических исследований по поиску полезных ископаемых.

³ Полный период качания тела $T = 2\pi\sqrt{R/g}$. Здесь R — радиус земного шара, g — ускорение свободного падения на земной поверхности, равное

$$g = G \frac{M}{R^2} = G \frac{4\pi R^3 \rho}{3R^2} = G \frac{4\pi}{3} R \rho,$$

$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2 / \text{кг}^2$ — гравитационная постоянная, $\rho = 5,5 \text{ г/см}^3$ — плотность Земли, которая считается постоянной. Таким образом,

$$T = \sqrt{\frac{3\pi}{\rho G}} \approx 84 \text{ мин.}$$

⁴ Современному читателю, знакомому с уравнениями движения гармонического маятника, т. е. такого маятника, для которого возвращающая сила F пропорциональна смещению от положения равновесия x ($F = kx$), нет надобности разыскивать этот старый журнал. Ведь нетрудно проверить, что и падение тела в шахте-колодце (рис. 44), и движение поезда в туннеле (рис. 45) описываются теми же уравнениями, что и обычный гармонический маятник, если, конечно, пренебречь сопротивлением воздуха. Предоставим читателю самостоятельно убедиться в этом.

К главе пятой

¹ Электромагнитные пушки, разработка которых осуществляется в настоящее время в ряде военных исследовательских центров на Западе, позволяют уже сейчас сообщать специальным снарядам скорость, соизмеримую с первой космической скоростью, т. е. значительно большую, чем артиллерийские орудия (см., например, журнал: *Physics Today*, 1980, № 12, p. 19).

² О том, что такое перегрузки, действующие на человека, и как решается проблема больших перегрузок в современной авиации и в космонавтике, за последнее время написано немало. Цитируем Ю.А. Гагарина: “Начали расти перегрузки. Я почувствовал, какая-то непреодолимая сила все больше вдавливают меня в кресло. И хотя оно было

расположено так, чтобы до предела сократить влияние огромной тяжести, наваливающейся за мое тело, было трудно пошевелить рукой и ногой... Перегрузки все возрастали... ”.

Интересующимся подробнее этим вопросом рекомендуем прочитать рассказ “Ускорение и перегрузки. Их влияние и преодоление” в книге: *Варваров Н. А.* Популярная космонавтика. — М.: Машиностроение, 1981.

К главе шестой

¹ Некоторые истории о необыкновенно большой солёности этого залива читатель может узнать из повести: *Паустовский К.* Кара-Бугаз. — Собр. соч. — М.: Художественная литература, 1967, т. 1, с. 401.

² Отдельные типы судов, например немецкие корабли, плавающие во внутренних водах Балтийского бассейна, снабжаются тремя различными грузовыми марками, отчетливо нанесенными на бортах середины судна, а именно: *FW* — высота палубы в пресной воде, *S* и *W* — летняя и зимняя высоты палубы в морской воде (см.: *Дитрих Г., Калле К.* Общее мореведение: Введение в океанографию. — Л.: Гидрометеиздат, 1961).

³ Тяжелая вода широко применяется в атомной технике, в частности в атомных реакторах. Она добывается из обычной воды промышленным способом в больших количествах.

Говоря о семнадцати разновидностях тяжелой воды, Я. И. Перельман имел в виду соединения типа H_2O , составленные из различных изотопов водорода и кислорода, а именно, обычного водорода H , дейтерия D или трития T и изотопов природного кислорода с массовыми числами 16, 17 или 18. Химическая формула этих соединений может иметь следующий вид: H_2O , D_2O , T_2O , HDO , HTO или DTO с любым из трех изотопов кислорода O . Все эти соединения, кроме обычной воды H_2O с преобладающим на Земле легким изотопом ^{16}O , и являются, по Перельману, разновидностями тяжелой воды, а точнее, разными жидкостями. Число их семнадцать. Добавление искусственных изотопов кислорода, например тяжелого ^{19}O или легких ^{14}O

и ¹⁵O, увеличивает и без того длинный список жидкостей, которые принято относить к воде.

⁴ Молодой читатель — наш современник, знакомясь с этой статьей, вероятно, вспомнит о недавнем знаменитом рейсе атомного ледокола “Арктика” к Северному полюсу. Этот факт как нельзя лучше иллюстрирует стремительный прогресс техники XX века и мощь ледокольного флота нашей страны.

⁵ Скорость современных атомных подводных лодок превосходит 50 узлов. Эти корабли могут двигаться под водой со скоростью курьерского поезда. Подводное судно, снабженное атомным двигателем, делает человека свободным в выборе путей в малоизведанных глубинах морей и океанов. Неисчерпаемые запасы энергии на борту подводного корабля позволяют, не всплывая на поверхность, проделывать огромные переходы. Так, в 1958 г. (с 22 июля по 5 августа) американская подводная лодка с атомным двигателем “Наутилус” прошла в погруженном состоянии в районе Северного полюса, совершив поход из Берингова моря в Гренландское.

⁶ Глубина погружения атомных подводных лодок не превышает несколько сот метров.

⁷ Позднее во Франции под руководством инженера Вильма и в Италии по проекту швейцарского ученого Пиккара были созданы специальные аппараты для глубоководных исследований — батискафы. Их важнейшее отличие от батисфер состоит в том, что они могут двигаться, плавать на больших глубинах, тогда как батисферы беспомощно висят на тросах. Сначала Пиккар опустился в батискафе более чем на 3 км, потом французы Гийом и Вильм достигли глубины 4050 м. Ноябрь 1959 г. — батискаф на глубине 5670 м, но и это еще не предел. 9 января 1960 г. Пиккар опустился на глубину 7300 м, а 23 января его батискаф достиг дна Марианской впадины на глубине 11,5 км! По современным данным это самое глубокое место в мире.

⁸ О развитии работ по подъему затонувших судов и о поисково-спасательных операциях при авариях подводных лодок, надводных судов и самолетов заинтересованные читатели могут прочесть в книге: *Юрнев А. П., Саха-*

ров Б. Д., Сытин А. В. Аварии под водой.— Л.: Судостроение, 1981. В этой книге приводится обширный список литературы, посвященной указанным вопросам.

⁹ Чтобы определить скорость вытекания жидкости из сосуда, надо, казалось бы, умножить скорость жидкости $v = \sqrt{2gh}$ на площадь отверстия крана. Однако это вовсе не так, в чем можно убедиться на опыте. Дело в том, что скорости разных частиц жидкости на выходе струи не параллельны друг другу, а имеют составляющую, направленную к центру потока. Этот парадокс разбирается подробно в книге: Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Физика сплошных сред.— М.: Мир.— (Фейнмановские лекции по физике, т. VII), 1966, гл. 40, §3.

¹⁰ С точки зрения физика (точнее, специалиста по вакуумной технике) такое утверждение является спорным. По-видимому, в межсуставном пространстве воздух все-таки есть, и его давление примерно равно атмосферному. Но воздуха там мало, так как мал объем замкнутого пространства. При перемещении костей относительно друг друга объем пространства может увеличиваться, и при этом из-за атмосферного давления возникнет сила, прижимающая кости. Это явление легко промоделировать в опыте с велосипедным насосом.

¹¹ Задача рассматривается без учета сил поверхностного натяжения.

¹² В опыте, показанном на рис. 70, с изменением зазора между дисками изменяется сила, действующая на верхний диск и трубку. Если, например, трубку с отверстием укрепить на пружинке над некоторой поверхностью, продуть трубку газом и измерять с помощью чувствительного датчика силу, действующую на трубку, т. е. силу натяжения пружинки, то таким способом можно определить расстояние от конца трубки до поверхности. Перемещение трубки вдоль некоторой заданной кривой позволяет измерить профиль поверхности. На этом принципе построены: метрологические приборы, с помощью которых в технике с высокой точностью измеряют формы поверхностей изготавливаемых деталей.

¹³ Эти очень интересные и действительно трудные вопросы разбираются в книге: Кадомцев Б. Б., Рыдник В. И.

Волны вокруг вас. — М.: Знание, 1981. Рекомендуем читателям познакомиться с этой книгой.

¹⁴ В мелких кровеносных сосудах течение крови ламинарное, и преобладающими являются диффузионные процессы переноса.

¹⁵ Считается, что температура воздуха постоянна.

¹⁶ Данные плотности воздуха приведены в относительных единицах (по отношению к плотности воздуха при нормальных условиях).

К главе седьмой

¹ Кроме всего прочего, одно из назначений высоких заводских труб — выбрасывать побочные технологические продукты выше в атмосферу для того, чтобы в дальнейшем проходило их рассеивание на большей площади. Это обстоятельство в какой-то степени приводит к уменьшению плотности загрязнений на местности вблизи предприятий, однако не устраняет их полностью. Для предотвращения выброса вредных веществ в атмосферу должна проводиться эффективная фильтрация дыма, например с помощью пылеуловителей.

² О том, что такое невесомая кухня космонавтов, читатели могут узнать из книги: *Варваров Н. А.* Популярная космонавтика. — М.: Машиностроение, 1981, гл. 5.

³ Этот прибор называется также термобарометром. Отметим, что при давлении вблизи атмосферного изменение температуры кипения чистой воды на $0,1^\circ\text{C}$ соответствует изменению атмосферного давления на $2,5\text{—}3$ мм рт. ст. (или эквивалентному изменению высоты местности примерно на 30 м). Шкала современного термобарометра разделена на сотые доли градуса или соответствующие единицы давления в мм рт. ст. В состав прибора, кроме термометра со шкалой, входит кипятильник — металлический сосуд с чистой водой и нагреватель. Несмотря на свою простоту, термобарометр является удобным и точным прибором, годным для использования в экспедиционных условиях.

⁴ Атмосферное давление у поверхности Марса такое же, как на Земле на высоте 30—35 км, т. е. менее 10 мм рт. ст., однако состав атмосфер этих планет разный.

⁵ Следует иметь в виду, что при резком уменьшении давления воздуха над поверхностью воды, кроме водяных паров, из воды выделяются растворимые в ней газы. Некоторой аналогией этого явления служит выделение пузырьков углекислого газа в бутылке с минеральной водой в тот момент, когда ее открывают.

К главе восьмой

¹ Название “магнит”, как утверждал Платон (V век до нашей эры), было дано магнетиту Еврипидом, называвшим его в своих драмах “камнем из Магнезии” (Греция). Магнетит, или иначе магнитный железняк (химический состав: 31% FeO и 69% Fe₂O₃), — это встречающиеся в природе намагниченные каменные кусочки, всегда достигающие сравнительно больших размеров (до нескольких килограмм). Другие легенды о происхождении слова “магнит”, а также много интересного о магнитах и магнетизме вообще можно узнать из книги: *Карцев В. П. Магнит за три тысячелетия.* — М.: Атомиздат, 1978.

² Надо, строго говоря, рассматривать не отдельные атомы в куске стали, а домены — образования, состоящие из огромного числа атомов и видимые иногда невооруженным глазом. Атомы в домене ориентированы в одном направлении, однако ненамагниченное тело из стали в целом магнитным моментом не обладает, так как домены в теле расположены хаотично. Лишь при намагничивании стали часть доменов ориентируется уже выборочно вдоль направления внешнего поля и остается в таком положении после намагничивания.

³ Исключением является случай, когда по раскаленному металлу течет сильный ток. При этом возникает магнитное поле тока, способное взаимодействовать с внешним магнитным полем.

⁴ До революции в России “Общество конно-железных дорог и омнибусов” применяло магниты для очистки овса от железных гвоздей, спасая тем самым лошадей от возможных тяжелых травм в момент приема корма. Известен еще целый ряд примеров, старых и сравнительно новых, использования магнитов для разделения (или, как иногда

говорят, сепарации) предметов или веществ, например при обогащении железных руд с помощью магнитов. Магниты или электромагниты (соленоиды) в современных физических приборах сортируют атомы и ионы, заставляют заряженные частицы двигаться по кругу в вакуумной камере ускорителя, препятствуют охлаждению горячей плазмы и т. д.

⁵ Экспериментально реализован и используется иногда в лабораторной практике так называемый диамагнитный подвес — тело, свободно парящее в неоднородном магнитном поле определенной конфигурации.

⁶ Об опытах с электромагнитной пушкой, способной “выстреливать” снарядом со скоростью, соизмеримой с первой космической, мы уже сообщали (см. примечание¹ к гл. 5).

⁷ Идеи использования магнитных сил на железной дороге. получили в наше время дальнейшее развитие, а некоторые из них реализованы на практике. Существует даже термин “поезд на магнитной подушке”. Успехи в этой области техники связаны с изобретением и конструированием новых типов электродвигателей, например линейного синхронного мотора, и соленоидов со сверхпроводящей обмоткой. Интересующимся этими вопросами рекомендуем обратиться к дополнительной литературе. См., например, книгу: *Дмитриенко И. М.* В мире сверхпроводимости. — Киев: Наукова думка, 1981.

⁸ В работах по программе Международного Геофизического Года в 1957—1958 гг. от Советского Союза участвовал корабль (шхуна “Заря”), не подверженный действию магнитных сил; во всех его креплениях, в двигателе, в якорях сталь и железо заменены медью, бронзой, алюминием и другими немагнитными металлами.

⁹ Между тем существует сравнительно простой способ размагнитить испорченные в сильном магнитном поле часы. Как вы думаете, в чем он состоит?

¹⁰ Бывают и более длительные молнии, до сотых и десятых долей секунды. Наблюдаются также многократные молнии — несколько (иногда десятки) молний, следующих одна за другой по пути (каналу), “пробитому”

первым разрядом; общая длительность такой многократной молнии достигает иногда 1,5 секунды. Информацию о том, каковы физические свойства этого интереснейшего природного объекта, и о том, как ученые исследуют молнию, можно получить, познакомившись с книгой Юман М. Молния.— М.: Мир, 1972.

¹¹ В этой статье описываются опыты, проведенные впервые английским физиком лордом Рэлеем. Я. И. Перельман дает лишь упрощенное объяснение поведения струи жидкости в электрическом поле. В частности, он ничего не говорит о том, что при дальнейшем росте напряженности поля струя, наоборот, более легко дробится на капли. Опыты Рэлея через 70 лет повторял вместе со своими сотрудниками советский физик Я. И. Френкель. Он же предложил теорию, объясняющую результаты этих опытов. Подробнее эта любопытная история изложена в книге: Гегузин Я. Е. Капля.— М.: Наука, 1973.

¹² На современных промышленных предприятиях проблеме статического электричества часто решают с помощью радиоактивных изотопов. Радиоактивный препарат, излучающий заряженные частицы с малой длиной пробега в воздухе, устанавливается вблизи трущейся диэлектрической поверхности, например рулона ткани. Повышенная электропроводность воздуха, возникающая вследствие облучения препаратом, препятствует накоплению значительного электростатического заряда на трущейся поверхности. Тем самым ликвидируется угроза пожара.

К главе девятой

¹ Рассматриваемый способ получения многократных снимков имеет много общего с принципом действия старой игрушки—калейдоскопа, о котором Я. И. Перельман рассказал в первой книге “Занимательная физика”. Описание забавных экспериментов с многократным отражением световых лучей читатель найдет также в книге Толанский С. Удивительные свойства света.— М.: Мир, 1969, гл. II. Отметим, что при произвольном угле между зеркалами и разном положении объекта относительно зеркал сосчитать число получающихся изображений не

так просто. Об этом идет речь в задаче 5. 15 из книги: *Уокер Дж. Физический фейерверк.*— М.: Мир, 1979.

² В настоящее время такой же коэффициент полезного действия имеют прямые преобразователи солнечной энергии в электрическую, а именно, кремниевые фотоэлементы, батареи из которых уже сейчас находят применение на Земле и в космосе. Правда, стоимость таких фотопреобразователей пока сравнительно высока.

³ В настоящее время считается, что солнечное излучение по своим ресурсам способно почти полностью удовлетворить энергетические потребности человечества в будущем. В то же время использование солнечной энергии не связано с загрязнением окружающей среды и нарушением теплового баланса нашей планеты. Вот почему энергетическим программам в технике использования солнечной энергии (пли, другими словами, гелиотехнике) придается большое значение. Благодаря использованию современных научных знаний в различных областях физики, химии, электротехнике, применению новых технологий и веществ за последние десятилетия достигнуты большие успехи в этом направлении. Но еще большее предстоит сделать. Полезную информацию об этих работах и о задачах гелиотехники можно получить из научно-популярной книги: *Бринкворт Б. Дж. Солнечная энергия для человечества.*— М.: Мир, 1976. Об использовании энергии Солнца, а также ветра, океана и других источников можно узнать из брошюры: *Марочек В. И., Соловьев С. П. Пасынки энергетики.*— М.: Знание.— (Техника), 1981.

⁴ В наше время с помощью солнечных установок плавят не только серу: в специальных солнечных печах доводят температуру до нескольких тысяч градусов, что позволяет получать некоторые сверхчистые тугоплавкие металлы. Таким образом, с полным основанием можно утверждать, что сейчас развивается новое направление использования солнечной энергии— солнечная металлургия.

⁵ Возможна реализация “почти невидимого” устройства, поглощающего лишь малую долю светового потока, падающего на фоточувствительный приемник (искусственный глаз). Принципиально похожие устройства используются в лазерной технике при диагностике мощных световых пуч-

ков. Но в животном мире, где очень важным является вопрос о предельной чувствительности глаза в условиях малой освещенности, т. е. когда, образно говоря, борьба идет за каждый квант света, подобная идея не реализуется. Вот почему на поверхности моря можно наблюдать совсем прозрачных животных, у которых, однако, черные глаза (поглощающие свет!). Вопрос о том, каков должен быть показатель преломления глаза у “человека-невидимки”, рассматривается в задаче 5. 2 из книги: *Уокер Дж.* Физический фейерверк.— М.: Мир, 1979.

⁶ Маскировка в животном мире достигается в основном тремя различными способами, которые называют мимикрией (слияние с фоном или подражание другому животному), деформирующим рисунком и противотеневой окраской. Примеры маскировки живых существ рассматриваются подробно в книге: *Толанский С.* Оптические иллюзии.— М.: Мир, 1967.

⁷ Здесь речь идет о видимом свете. Вообще говоря, показатель преломления воды, как и других веществ, зависит от длины волны (это явление называется дисперсией). Как следствие этого предельный угол, при котором наступает полное внутреннее отражение, не один и тот же для разных длин волн, но для видимого света при отражении на границе вода—воздух этот угол изменяется меньше чем на 1° .

⁸ Существенным разделом “рыбьей” оптики было бы учение о большом кругозоре рыб вне воды, т. е. широком поле зрения в воздухе, облегчающем рыбам наблюдать все пространство вне воды. Об этой особенности зрения рыб следует помнить любителям рыбной ловли.

⁹ Подробнее о цвете в морских глубинах см. книгу: *Шулейкин В.В.* Очерки по физике моря.— М.: Изд-во АН СССР, 1949, очерк восьмой.

¹⁰ Подробнее этот и другие смежные вопросы обсуждаются в книгах: *Миннарт М.*, Свет и цвет в природе.— М.: Физматгиз, 1959, с. 119—120; *Толанский С.* Оптические иллюзии.— М.: Мир, 1967, с. 78—95.

¹¹ В последние годы исследования планет и их спутников проводились также с помощью межпланетных автоматических станций. Эти исследования дали мно-

жество интересных результатов, в частности, показали отсутствие на Марсе каких бы то ни было каналов. Интересующимся можно рекомендовать книгу: *Бакулин П. И., Кононович И. В., Мороз В. И.* Курс общей астрономии.— М.: Наука, 1974.

В распоряжении ученых сейчас имеются подробные снимки поверхности Луны, Венеры, Марса. Продолжаются исследования больших планет Юпитера и Сатурна, а также их спутников. Например, в 1979 г. информация, собранная американской станцией Вояджер-1, позволила даже выявить на Ио, спутнике Юпитера, первый внеземной действующий вулкан. В 1982 г. советская автоматическая станция, совершившая мягкую посадку на Венере, передала на Землю уникальные цветные изображения поверхности Венеры и провела анализ грунта планеты. Это направление исследований (физика планет) в наше время интенсивно развивается.

О непосредственном изучении планет и их спутников с помощью космических аппаратов рассказывается в книге: *Кауфман У. Дж.* Планеты и Луна: Пер. с англ.— М.: Мир, 1982.

¹² Большую роль в микроскопии играет также способ освещения объекта исследования, позволяющий увеличивать контраст малоразличимых деталей. Для более подробного знакомства с микроскопом и методами микроскопии можно обратиться к книгам: *Рыдник В. И.* Увидеть невидимое.— М.: Энергоиздат, 1981; *Суворов А. Л.* Микроскопия в науке и технике.— М.: Наука, 1981.

¹³ О зрительных самообманах см. в книге: *Толанский С.* Оптические иллюзии.— М.: Мир, 1967. В этой книге автор рассматривает не только те иллюзии, о которых сообщает Я. И. Перельман, но и некоторые другие малоизвестные читателю.

¹⁴ О том, какие принципы должны соблюдать модельеры при подготовке новых фасонов одежды для полных или, наоборот, худых людей, сообщается в той же книге С. Толанского (см. рассказ “Иллюзия полноты”). Автор оптимистически считает, что оптика может во многом помочь “несчастливым толстушкам” (с. 36).

¹⁵ Рассматриваемые здесь примеры относятся к известным иллюзиям, которые вызваны колебаниями внимания: так называемая лестница Шредера (см. рис. 133), колеблющийся куб (см. рис. 134). Подобного рода иллюзии важно учитывать в научной практике (например, при обработке информации, полученной с помощью фотографий, при анализе стереопар, изображающих рельеф поверхности и т. д.).

¹⁶ В книге С. Толанского "Оптические иллюзии" подробно разбираются эти иллюзии зрения: иллюзия стрелок Мюллера—Лиера, иллюзия пересечения линий (иллюзия Поггендорфа). Достаточно подробно рассматривается также механизм действия этих иллюзий.

¹⁷ Прием, разобранный Я. И. Перельманом в статье "Микроскоп времени" в технике", лежит в основе применяемых на практике приборов— стробоскопов, с помощью которых определяют частоту некоторых быстропеременных процессов. Поскольку электронные методы контроля частоты колебаний относятся к наиболее точным физическим методам измерений, то стробоскопы обеспечивают исключительно высокую точность результатов измерений.

¹⁸ Впервые в 1920 г. принципиально таким же методом была определена средняя скорость испаряющихся в вакууме атомов серебра (опыт Штерна).

¹⁹ Диск, предложенный инженером Нипковым в 1884 г., нашел применение в 20—30-х годах XX века, в так называемом механическом телевидении для развертки и восстановления изображения. Сейчас для этих целей используют системы с электронным лучом. Отметим, что современный телевизор в нашей квартире— это удобный прибор для наблюдения стробоскопического эффекта. О том, как поставить такие опыты, сообщается в книге: *Уокер Дж. Физический фейерверк.*— М.: Мир, 1979, с. 138, 139.

²⁰ При недостаточном освещении наш глаз не только перестает различать окраску предметов, но и теряет способность улавливать резкие контуры предметов. Это явление называют иногда ночной близорукостью. По этой

же причине при плохом освещении объекта очень трудно сфокусировать микроскоп.

К главе десятой

¹ Утверждение о том, что для любого звука, каким бы громким он ни был, скорость распространения в воздухе всегда около 340 м/с, строго говоря, не соответствует действительности: скорость звука в воздухе вблизи очень громких источников, таких как взрыв, выстрел, канал молнии и т. д., превышает (иногда в несколько раз) обычное значение. У таких звуков есть специальное название: ударные волны в воздухе. По мере удаления от источника скорость звука (ударной волны) быстро падает, приближаясь к нормальной. На скорость звука влияет, правда незначительно, состояние атмосферы: влажность воздуха, температура и некоторые другие факторы. При повышении температуры воздуха на 1 °С скорость звука увеличивается почти на 0,6 м/с. Иногда роль изменения температуры может быть существенной, например, в скоростной авиации. Так, на высотах, больших чем 20 км, т. е. в стратосфере, где температура воздуха достигает — 60 °С, скорость звука чуть больше 1000 км/ч, в то время как на уровне моря при температуре воздуха 15 °С звук распространяется со скоростью 1216 км/ч.

² Автор не учитывает затухание звуковых колебаний с расстоянием, что в действительности мешает вам вести разговор, так как на другом конце такой трубы вас не услышат. Кроме того, не во всяких трубах скорость звука такая же, как в свободном воздушном пространстве.

³ Подробно история вопроса о воздушном эхе рассказывается в книге *Тиндаль Д.* Звук: Пер. с англ.— М.: Государственное издательство, 1922. Правда, эта книга является сейчас библиографической редкостью. Читатель, если ему удастся достать книгу Тиндаля, познакомится с интересными наблюдениями и опытами по атмосферной акустике, которые проводил сам Тиндаль и которые оказались в свое время очень важными для мореходства.

⁴ В настоящее время верхняя граница используемого в науке и технике ультразвука гораздо выше. Область ульт-

тразвуковых частот сейчас принято подразделять на три диапазона: низкие ультразвуковые частоты ($1,5 \times 10^4$ — 10^5 Гц), средние (10^5 — 10^7 Гц) и высокие (10^7 — 10^9 Гц). Упругие волны с частотами 10^9 — 10^{13} Гц называют гиперзвуком. Каждая из указанных областей имеет свои специфические особенности излучения, приема и распространения звука. Верхняя граница ультразвуковых частот обусловлена физической природой упругих волн в среде. Так, в газах граничная частота определяется из условия приблизительного равенства длины звуковой волны и длины свободного пробега молекул. При атмосферном давлении она порядка 10^9 Гц. Для гиперзвука минимальная длина волны соответствует межатомному расстоянию в твердом теле, т. е. около 10^{-10} м, а граничная частота достигает 10^{12} — 10^{13} Гц.

⁵ Кристаллы кварца являются сравнительно дорогими и маломощными источниками ультразвука и применяются обычно в лаборатории. Технические применения нашли искусственные синтетические материалы, например керамика титаната бария. Кроме пьезоэлектрических преобразователей, для возбуждения ультразвука используются часто более мощные магнитострикционные излучатели.

⁶ Метод ультразвуковой дефектоскопии был предложен в 1928 г. советским ученым С. Я. Соколовым. Сейчас применяются специальные приемники ультразвуковых колебаний, которые заменяют масло и делают измерения более простыми. Работы в области фокусировки и визуализации звуковых полей, а также развитие мощных математических методов обработки сигнала при построении изображения с помощью ЭВМ привели к созданию целого класса новых ультразвуковых приборов, так называемых звуковизоров, которые применяются сейчас в различных системах звуковидения, например в медицине при рассматривании неоднородностей в мягких тканях. Об этом см. подробнее в книге: Ультразвук / Под ред. Голяминой И. П.— М.: Советская энциклопедия.— (Маленькая энциклопедия), 1979.

⁷ Интересно отметить, что ультразвук встречается и в природе. В шуме ветра и морского прибоя есть частоты, соответствующие области ультразвука. Способностью

излучать и принимать ультразвук обладают многие живые существа: бабочки, цикады и другие. Летучие мыши пользуются ультразвуком в полете, узнавая по отраженным сигналам о препятствиях на своем пути. Тонкий свист, испускаемый летучими мышами, — своеобразные “звуковые прожекторы”, которые позволяют мышам свободно ориентироваться во время полета в полной темноте. Там, где много водится летучих мышей, женщины нередко боятся этих животных, говорят, что они впиваются в волосы. Действительно, голова, покрытая густыми волосами, является “звуковой ямой”, от которой не отражается ультразвук. Желая вылететь из замкнутого помещения, потревоженная летучая мышь устремляется на голову, которую “на слух” воспринимает как люк. О звуках в природе и природных локаторах можно прочесть в книгах: *Брэгг У.* Мир света. Мир звука: Пер. с англ. / Под ред. Обреимова И. В. — М.: Наука, 1967; *Литенецкий И. Б.* Бионика. — М.: Просвещение, 1976.

⁸ О скорости звезд см., например, книгу: *Струве О., Линде Б., Пилланс Э.* Элементарная астрономия: Пер. с англ. / Под ред. Каплана С. А. — М.: Наука, 1967, а также книгу: *Физика космоса* / Под ред. Пикельнера С. Б. — М.: Советская энциклопедия. — (Маленькая энциклопедия), 1976.

⁹ Примерно такое же устройство — деревянную трость, но с чашечкой на конце, используют опытные механики для определения “на слух” неисправностей вращающихся узлов двигателей и других устройств, например подшипников.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ФИЗИКУ?*

1. Из вопросов знаменитой Эдисоновой викторины**: “Если бы вас высадили на один из тропических островов Тихого океана без всяких орудий, как сдвинули бы вы там с места трехтонный груз — скалу, имеющую 100 футов в горизонтальном протяжении и 15 футов в вертикальном?” (1 фут = 30,48 см.)

2. Сколько примерно должна была бы весить паутинная нить длиной от Земли до Луны? Можно ли такой груз удержать в руках? А увезти на телеге? Нить паутины имеет в диаметре 200-ю долю миллиметра; плотность ее вещества около 1 г/см.³

3. В знаменитых опытах с “магдебургскими полушариями” Отто Герике впрягал с каждой стороны по 8 лошадей. Не лучше ли было бы прикрепить одно полушарие к стене, а к другому припрячь 16 лошадей? Получилась бы в этом случае более сильная тяга?

4. Одно время большую популярность на Западе, особенно в Америке, приобрела занимательная игрушка, называвшаяся там “йо-йо”. Это — катушка, которая спускается на разматывающейся ленте и сама затем поднимается. Игрушка — не была новостью: ею развлекались еще солдаты наполеоновских армий и даже, по разысканиям сведущих людей, герои Гомера.

С точки зрения механики “йо-йо” — не что иное, как видоизменение общеизвестного маятника Максвелла: небольшой маховичок падает, разматывая навитые на его ось нити, и приобретает постепенно столь значительную энергию вращения, что, развернув нити до конца, продолжает вращаться, вновь наматывая их и, следовательно, поднимаясь вверх. При подъеме, вследствие превращения кинетической энергии в потенциальную, маховик замедляет вращение, наконец, останавливается и опять начинает падение с вращением. Опускание и подъем маховичка повторяют-

* Ниже приведены некоторые вопросы и задачи по тематике “Занимательной физики”, заимствованные из книги: *Перельман Я. И. Знаете ли вы физику? — М.: ОНТИ, 1935. (Прим. ред.)*

** За два года до смерти американский изобретатель пожелал поощрить стипендией наиболее сметливого юношу Соединенных Штатов. С разных концов республики направлены были к нему одареннейшие школьники, по одному из каждого штата, и Эдисон во главе особой учрежденной им комиссии подверг молодых людей испытанию, предложив ответить письменно на 57 вопросов по физике, химии, математике и общего характера. Победителем в состязании оказался 16-летний Вильбер Хастон из Детройта.

ся много раз, пока первоначальный запас энергии не рассеется в виде теплоты, возникающей при трении.

Прибор Максвелла описан здесь для того, чтобы предложить следующий вопрос. Нити маятника Максвелла прикреплены к пружинным весам. Что должно происходить с указателем весов в то время, когда маховичок исполняет свой танец вверх и вниз? Останется ли указатель в покое? Если будет двигаться, то в какую сторону?

5. а) Переноса в комнате с места на место горящую свечу, мы замечаем, что пламя в начале движения отклоняется назад. Куда отклонится оно, если переносить свечу в закрытом фонаре?

б) Куда отклонится пламя свечи в фонаре, если равномерно вращать фонарь около себя вытянутой рукой?

6. С какой силой надо натягивать веревку, закрепленную другим концом, чтобы она не провисала?

7. Принято считать, что все отвесы близ земной поверхности направлены к центру Земли (если пренебречь незначительным отклонением, обусловленным вращением земного шара). Известно, однако, что земные тела притягиваются не только Землей, но и Луной. Поэтому тела должны, казалось бы, падать по направлению не к центру Земли, а к общему центру масс Земли и Луны. Этот общий центр масс далеко не совпадает с геометрическим центром земного шара, а отстоит от него, как легко вычислить, на 4800 км. (Действительно, Луна обладает массой, в 80 раз меньшей, чем Земля; следовательно, общий центр их масс в 80 раз ближе к центру Земли, чем к центру Луны. Расстояние между центрами обоих тел 60 земных радиусов; поэтому общий центр масс отстоит от центра Земли на три четверти земного радиуса.)

Если так, то направление отвесов на земном шаре должно значительно отличаться от направления к центру Земли. Почему же подобные отклонения нигде в действительности не наблюдаются?

8. Легендарный рассказ о задаче Архимеда с золотой короной передается в различных вариантах. Древнеримский архитектор Витрувий (I век до нашей эры) сообщает об этом следующее:

“Когда Гиерон*, достигший царской власти, пожелал в благодарность за счастливые деяния пожертвовать в какой-либо из храмов золотую корону, он повелел изготовить ее и передал мастеру необходимый материал. В назначенный срок тот принес изготовленную корону. Гиерон был доволен; вес короны соответствовал количеству материала. Но позже стали доходить слухи, что мастер похитил некоторое количество золота, подменив его серебром. Гиерон, рассерженный обманом, просил Архимеда придумать способ обнаружить подмену.

* Сиракузский правитель, по преданию — родственник Архимеда.

... Занятый этим вопросом, Архимед пришел случайно в баню и, войдя в ванну, заметил, что вода вылилась через край из ванны в количестве, отвечающем глубине погружения тела. Сообразив причину явления, он не остался в ванне, а радостно выскочил и нагой побежал домой, крича на бегу по-гречески: "эврика, эврика!"

... Затем, исходя из своего открытия, он взял два куска того же веса, как корона, — один из золота, другой из серебра. Наполнив глубокий сосуд доверху водой, он погрузил в него серебряный кусок. Вода вытекла в количестве, отвечающем объему куска. Вынув кусок, он дополнил сосуд тем количеством воды, какое из него вылилось, измеряя приливаемую воду, пока сосуд вновь наполнился до краев. Отсюда он нашел, какой вес серебра соответствовал определенному объему воды. После того он опустил подобным же образом в наполненный сосуд кусок золота и, когда пополнил вытекшую воду, нашел измерением, что вытекло ее меньше — настолько, насколько кусок золота имеет меньший объем, чем кусок серебра того же веса. Когда затем он еще раз наполнил сосуд и погрузил в него корону, он нашел, что вытекло воды больше, чем при погружении куска золота, и с помощью этого избытка вычислил примесь серебра к золоту, обнаружив таким образом обман мастера".

Можно ли было по описанному здесь методу Архимеда вычислить количество золота, подмененное в короне серебром?

9. Применим ли закон Архимеда к телам сыпучим? Как глубоко может погрузиться в сухой песок деревянный шар, положенный на его поверхность? Может ли человек утонуть с головой в сыпучем песке?

10. а) Как высоко должна подняться вода в стеклянной трубке с просветом в один микрометр?

б) Какая жидкость поднялась бы в такой трубке всего выше?

в) Какая вода поднимается в капиллярных трубках выше — холодная или горячая?

11. Опораживая ванну, мы замечаем близ выпускного отверстия водяной вихрь. В какую сторону он вращается: по часовой стрелке или против нее?

12. Почемугибаются гребни морских волн, набегающих на пологий берег?

13. Общеизвестен опыт с листком бумаги, который не отпадает от краев опрокинутого стакана с водой. Объяснение обычно дается такое: снизу на бумажку давит извне воздух с силой одной атмосферы, изнутри же напирает на бумажку сверху только вода с силой, во много раз меньшей (во столько раз, во сколько 10-метровый водяной столб, соответствующий атмосферному давлению, выше стакана); избыток давления и прижимает бумажку к краям стакана.

Если такое объяснение верно, то бумажка должна придавливаться к стакану с силой почти целой атмосферы (0,99 ат). При

диаметре отверстия стакана $7\frac{1}{4}$ см на бумажку должна действовать сила приблизительно $(\frac{1}{4} \pi) 7^2 = 38$ кгс. Известно, однако, что для отрывания бумажного листка такой силы не требуется, а достаточно самого незначительного усилия. Пластика металлическая или стеклянная, имеющая массу несколько десятков граммов, вовсе не удерживается у краев стакана, — она отпадет под действием силы тяжести. Очевидно, обычное объяснение опыта несостоятельно.

Каково же правильное объяснение?

14. Какой воздух богаче кислородом — тот, которым мы дышим, или тот, которым дышат рыбы?

15. Слон может оставаться под водой, дыша через хобот, выступающий над ней. Когда же пробовали подражать слону люди, “заменяя хобот трубкой”, плотно прилегающей ко рту, то наблюдалось кровотечение из рта, носа, ушей, кончавшееся тяжелым заболеванием или даже гибелью водолаза. Почему?

16. Верхний конец трубки чашечного барометра прикреплен к одной чашке весов; на другую чашку положены для равновесия гири. Нарушится ли равновесие, если изменится барометрическое давление?

17. Может ли сифон действовать в вакууме?

18. Можно ли сифоном переливать газ?

19. Кипяток гасит огонь быстрее, чем холодная вода, так как сразу отнимает от пламени теплоту парообразования и окружает огонь слоем водяного пара, затрудняющего доступ воздуха. Ввиду этого не следует ли пожарным являться с бочками кипящей воды и из насосов поливать ею горящее здание?

20. Если бы у дна океана на глубине 8 км появился пузырек воздуха, мог бы он всплыть на поверхность воды?

21. Как объясните вы существование земной атмосферы? Молекулы воздуха либо подвержены силе тяжести, либо ей не подвержены. Если не подвержены, то почему они не рассеиваются в безвоздушном пространстве вокруг Земли? Если же они силе тяжести подвержены, то почему не падают на поверхность Земли, а держатся над ней?

22. Может ли газ занимать только часть резервуара, оставляя другую часть пустой?

23. В брошюре Карпентера “Современная наука”, переведенной на русский язык Л. Н. Толстым, имеется следующий довод против правильности устройства наших термометров:

“Градус не есть одно и то же в начале и в конце лестницы температуры. Уже одно то, что градусы термометра суть равные пространственные деления, доказывает, что отношение их ко всему объему жидкости, расширяющейся от одного конца трубки до другого, не может оставаться постоянным”.

Карпентер желает сказать, что если, например, длина шкалы градуса 1 мм, то миллиметровый цилиндр ртути при 0°C составляет более крупную долю объема всей ртути, чем такой же

цилиндр при 100°C , когда общий объем ртути увеличился; значит, заключает критик, нельзя считать соответствующие интервалы температуры равными.

Справедлив ли этот упрек и подрывает ли он доверие к измерению температуры с помощью термометров с жидкостями и газами?

24. Посреди квадратного железного листа со стороной 1 м имеется дырочка диаметром 0,1 мм. Как должна измениться температура листа, чтобы дырочка в нем совершенно закрылась?

25. Можно ли механической силой помешать тепловому расширению металлического бруса или ртутного столба?

26. Длина пузырька в трубке плотнического уровня меняется при колебаниях температуры. Когда же пузырек больше: в теплую погоду или в холодную?

27. Теплота способна переходить только от тела, более нагретого, к телу, менее нагретому. Температура нашего тела выше температуры воздуха в нагретой комнате. Почему же нам в такой комнате тепло?

28. Что требует больше времени: нагревание воды на примусе от 10 до 20°C или от 90 до 100°C ?

29. Какова приблизительно температура пламени стеариновой свечи?

30. Почему гвозди на свечке не плавятся?

31. Почему рушатся при пожаре стальные конструкции, хотя сталь не горит и в огне пожара не плавится?

32. Скользкость льда объясняют понижением точки таяния льда при повышении давления. Известно, что для понижения точки таяния льда на 1°C требуется давление в 130 ат. Поэтому, чтобы кататься на коньках при морозе, например, в 5°C , конькобежец должен оказывать на лед давление $5 \times 130 = 650$ ат. Однако поверхность, по которой лезвие конька соприкасается со льдом, не меньше нескольких квадратных сантиметров, так что на 1 см^2 приходится не более 10—20 кгс веса конькобежца. Следовательно, давление конькобежца на лед во много раз меньше того, какое необходимо для понижения точки таяния льда на 5°C . Как же объяснить возможность кататься на коньках при морозе в 5°C и более?

33. Какого цвета водяной пар?

34. Укажите физическую несообразность в следующих строках старинного (1799 г.) стихотворения “Эхо”:

Я чаю, эхо, ты мне в роще отвечаешь? — Чаешь.

Конечно, ты вело меня с полей сюда? — Да!

Мне долго говорить с тобою невозможно. — Можно!

Нет, нет. Пойду искать овечку я к ручью. — Чью?

35. Хорошо известно, что дерево проводит звук лучше, нежели воздух: вспомните опыт с постукиванием по торцу длинного бревна — звуки эти можно услышать, приложив ухо к другому

концу бревна. Почему же разговор, происходящий в соседней комнате, заглушается, когда дверь в комнату закрыта?

36. Если звучащий камертон поставить на деревянный ящик, звук заметно усиливается. Откуда берется избыточная энергия?

37. 1) Свет пробегает от Солнца до Земли не мгновенно, а за 8 минут с небольшим. Как сказывается это на моменте восхода Солнца? Рассмотрите вопрос для двух точек зрения: а) Земля вращается вокруг своей оси при неподвижном Солнце; б) Солнце обращается за 24-часовой период вокруг неподвижной Земли.

2) Как изменилось бы действие глаза и оптических приборов при мгновенном распространении света?

38. Почему в солнечный день на мостовой отчетливо видна тень от уличного фонаря, но тень проводов, на которых он подвешен, видна слабо?

39. Можно ли при свете полной луны читать книгу?

40. Что освещает сильнее: звезда первой величины или свеча с расстояния 500 м?

41. Луну мы видим белой; в телескоп поверхность ее кажется, словно гипсовой. Астрономы утверждают, однако, что поверхность ее темно-серая. Как примирить эти противоречия?

42. Почему снег белый, хотя составлен из прозрачных ледяных кристалликов?

43. а) Некто утверждал, что в полдень видел в Москве радугу на небе. Возможно ли это?

б) Автор старинного сочинения о радуге (парижский аббат де-ла-Плюш, 1781 г.) сообщал, что ему случилось видеть радугу, находясь в Париже у одного ее конца, в то время как другой ее конец упирался в предместье города. При каких условиях это могло наблюдаться?

44. Почему ситец, лиловый при дневном освещении, кажется черным при вечернем электрическом свете?

45. Почему в железнодорожной практике для сигнала остановки выбран красный цвет?

46. Из вопросов Эдисоновой викторины:

“Показатель преломления одного стекла 1,5, другого 1,7. Из того и другого выточено по двояковыпуклой линзе. Обе линзы геометрически одинаковы. В чем разнятся они оптически?”

... Какое действие каждая из них произведет на луч, параллельный оптической оси, если их погрузить в прозрачную жидкость с показателем преломления 1,6? ““.

47. Луна близ горизонта видна более крупной, чем высоко в небе. Почему же не замечаем мы новых подробностей?

48. Почему проколотый листок тонкого картона действует подобно лупе?

49. “Солнечной постоянной” называется количество энергии, в единицу времени доставляемой солнечными лучами единице

поверхности, выставленной на наружной границе земной атмосферы перпендикулярно к лучам Солнца. Где солнечная постоянная больше: зимой на тропике или летом на полярном круге?

50. Существует ли металл, намагничивающийся сильнее железа?

51. Намагниченная спица разломана на мелкие части. Какой из полученных обломков окажется намагниченным сильнее — находившийся ближе к концам спицы или ближе к середине?

52. На чувствительных весах уравновешены железный цилиндр и медная гири. Учитывая действие земного магнетизма, можно ли признать массы куска железа и гири строго равными?

53. а) Легкий бузинный шарик притягивается палочкой. Значит ли это, что палочка была первоначально наэлектризована? А если бузинный шарик от палочки отталкивается?

б) Железная палочка притягивает стальную иглу. Значит ли это, что палочка была первоначально намагничена? А если иголка от палочки отталкивается?

54. Как велика электрическая емкость человеческого тела?

55. Электрическое сопротивление нити накала в нагретом состоянии иное, чем в холодном. Как велика эта разница для 50-ваттной вакуумной лампочки?

56. Проводит ли стекло электрический ток?

57. Для некоторых электрических лампочек вредно частое выключение. Почему?

58. Нити накала электрической лампочки, когда она не под током, настолько тонки, что едва различаются невооруженным глазом. Почему же заметно утолщаются они под током?

59. Какой примерно длины молния?

60. Отрезок был измерен дважды. В первый раз для его длины было получено значение 42,27 мм, во второй 42,29 мм. Какова истинная длина отрезка?

61. Эскалатор Московского метрополитена на станции Кировская поднимается от уровня станции до входа в течение 1 мин 20 с. Пассажир, взбираясь по ступеням неподвижного эскалатора, может пройти тот же путь за 4 мин. За какое время поднимется от станции до входа пассажир, если будет взбираться по ступеням поднимающегося эскалатора?

62. Из вопросов Эдисоновой викторины:

“Два города, расположенные на разных берегах реки в миле (1,6 км) друг от друга, остались после стихийного бедствия без взаимного сообщения. Как вы установили бы связь между этими городами, не пользуясь услугами электричества? Переправиться через эту реку для человека невозможно”.

63. На глубине 1 км затонула в море незакупоренная бутылка. Как изменится вместимость бутылки под давлением воды — увеличится или уменьшится?

64. Вот заимствованное из иностранного детского журнала описание простого опыта, цель которого — демонстрировать атмосферное давление:

“Торящий огарок свечи укрепляют на дне стеклянной банки и, когда пламя погорит некоторое время, накрывают банку крышкой, проложив между ними увлажненное резиновое кольцо. Пламя тускнеет и вскоре гаснет. Попробуйте тогда оторвать крышку от банки — это удастся вам лишь при значительном усилии.

... Причину явления легко понять. Пламя потребляет кислород, запас которого в герметически закрытой банке ограничен. Когда он израсходуется весь, пламя гаснет. Оставшаяся часть воздуха, заняв больший объем, разрежается и давит слабее. Избыток наружного давления и прижимает так сильно крышку к банке”.

Находите ли вы это объяснение правильным?

65. Из научно-популярной книги:

“На основании некоторых измерений ученые узнали, что плотность всего земного шара равна приблизительно $5,5 \text{ г/см}^3$, объем же его известен, так как измерен его диаметр. Умножая этот объем на $5,5 \text{ г/см}^3$, ученые нашли, чему равна масса Земли”.

Правильно ли указан здесь путь определения массы Земли?

66. В одном из сборников задач имеется следующая:

“Астрономы считают, что наша Солнечная система летит со скоростью около 17 км/с по направлению к созвездию Лиры. Какие явления можно было бы заметить на Земле, если бы это движение было не равномерным, а ускоренным или замедленным?”

Дайте ответ.

67. После прочтения мною докладов о будущих ракетных полетах в мировом пространстве, один астроном возразил мне:

“Вы упускаете из виду существенное обстоятельство, делающее достижение Луны в ракетном корабле совершенно безнадежным предприятием. Масса ракеты — по сравнению с массой небесных тел — исчезающе мала, а ничтожные массы получают огромные ускорения под действием сравнительно малых сил, которыми при других условиях можно было бы пренебречь. Я имею в виду притяжение планет — Венеры, Марса, Юпитера. Оно, конечно, крайне невелико, но ведь масса ракеты практически равна нулю, и для такой ничтожной массы действие даже небольших сил должно быть чрезвычайно ощутимо. Они породят огромные ускорения — ракета будет метаться в мировом пространстве по самым фантастическим путям, откликаясь на притяжение каждого сколько-нибудь массивного тела, и в своем блуждании никогда на Луну не набредет”.

Ваше мнение, читатель?

68. Вот еще одно возражение против осуществимости межпланетных перелетов. Астроном, разбирая (в сборнике “Успехи и достижения современной науки и техники”) условия пребывания человека в среде без тяжести, высказал следующее соображение:

“Наш организм очень чутко реагирует на всякое нарушение в этом отношении. Попробуйте побывать некоторое время с опущенной головой или с поднятыми вверх ногами. Наступающие расстройства кровообращения бывают очень серьезны. Если так действует изменение направления силы тяжести, то как же должно действовать ее отсутствие?”

Что скажете вы о логической силе этого довода?

69. Укажите основания, дающие право рассматривать живой человеческий организм как тепловую машину.

70. Почему светятся метеоры?

71. В фабрично-заводских районах туманы бывают чаще, чем в окружающих лесистых или сельскохозяйственных местностях. Лондонские туманы вошли в поговорку. Чем это объяснить?

72. Какая разница между туманом, дымом и пылью?

73. Существует народное поверье, что легкие облака тают в лучах Луны. Летом это поверье часто оправдывается. Как объяснить подобное действие лунного света?

74. Где молекулы обладают большей кинетической энергией: в водяном паре при 0°C , в жидкой воде при 0°C , или во льду при 0°C ?

75. Какова приблизительно скорость теплового движения молекул водорода при -273°C ?

76. Достижим ли абсолютный нуль?

77. Можно ли видеть невооруженным глазом одну 10-миллионную долю грамма вещества?

78. Если взять какое-либо вещество в количестве одного моля, т. е. такое число его граммов, которое равно молекулярной массе этого вещества (например, 2 г водорода или 32 г кислорода), то во взятой порции всегда окажется одно и то же число молекул, именно 60×10^{22} нулями (60×10^{22} моль $^{-1}$). Число это носит в физике название “постоянной Авогадро”. Вообразите, что имеется такое число не молекул, а булавочных головок. Вы желаете заказать ящик для вмещения этой огромной кучи головок. Высота ящика предполагается равной 1 км. Каковы приблизительно будут размеры его основания? Поместился бы такой ящик в пределах Москвы или Ленинграда?

79. Если в океан вылить литр спирта, то молекулы спирта распределятся через некоторое время равномерно по всей водной массе мирового океана. Сколько приблизительно понадобится зачерпнуть в океане литров воды, чтобы выловить одну молекулу спирта?

80. Во сколько приблизительно раз среднее расстояние между молекулами водорода при 0°C и нормальном давлении больше диаметра газовой молекулы?

81. Какой приблизительно размер имели бы молекулы, если бы все тела на Земле увеличились линейно в миллион раз?

82. Чему приблизительно равен x в пропорции

$$\frac{\text{диаметр электрона}}{x} = \frac{x}{\text{диаметр Солнца}} ?$$

83. а) Если бы мельчайшая бактерия увеличилась до размеров земного шара, какой приблизительно размер имели бы электрон и протон?

б) Если бы электрон сделался толщиной с волос, какой толщины оказался бы волос?

в) Если бы диаметр орбиты Нептуна был уменьшен до диаметра Земли, какой диаметр имела бы Земля?

г) Если бы диаметр Земли уменьшился до 1 мм, как велико оказалось бы (при пропорциональном уменьшении) расстояние до Сириуса?

д) Если бы вся Солнечная система уменьшилась в диаметре до толщины волоса, каково оказалось бы в соответствующем уменьшении расстояние до туманности Андромеды?

*Научно-популярное издание
Для среднего и старшего возраста*

Яков Исидорович ПЕРЕЛЬМАН

Занимательная физика

В двух книгах

Под редакцией А.В. Митрофанова

Оформление З.Яриной

Ответственный редактор *Ю.Стальская*

ISBN 5-7459-0003-2

ЛР №063236 от 04.01.94

Подписано в печать с оригинал-макета 08.07.94

Формат 84 × 108 1/32. Бумага типографская. Печать высокая.

Усл.печ. 28,88 л. Уч.-изд. 25,5 л. Тираж 35000 экз.

Заказ №308 С 03.

АО "СТОЛЕТИЕ", Москва, Перовская, 39, к.1

Текст отпечатан с оригинал-макета во Владимирской типографии
Комитета Российской Федерации по печати.
600000, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.7

